의약품 품목변경허가 보고서

접수일자	2024.03.18.		접수번호	20240055874
변경신청사항	효능효과, 사용상의 주의사항			
신 청 인 (회사명)	한국엠에스디(주)			
제 품 명	키트루다주(펨브롤리주맙,유전자재조합)			
주성분명 (원료의약품등록 번호)	펨브롤리주맙			
제조/수입 품목	□ 제조 ■ 수입		전문/일반	■ 전문 □ 일반
제형/함량	1 바이알 (4.0 ㎖ 중) 펨브롤리주맙 100.0밀리그램			
기 허가 사항	허가일자	2015-03-20		
	효능·효과	흑색종 1. 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종 환자의 치료 2. 완전 절제술을 받은 IIB기, IIC기 또는 III기 흑색종 환자의 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료 비소세포폐암 1. EGFR 또는 ALK 변이가 없는 전이성 비편평 비소세포폐암 환자에서의 1차 치료로서 페메트렉시드 및 백금 화학요법과의 병용 요법 2. 전이성 편평 비소세포폐암 환자에서의 1차 치료로서 카보플라틴 및 파클리탁셀(혹은 알부민 결합 파클리탁셀)과의 병용 요법 3. PD-L1 발현 양성(Tumor Proportion Score(TPS)≥50%)으로서, EGFR 또는 ALK 변이가 없는 진행성 비소세포폐암 환자에서의 1차 치료 4. PD-L1 발현 양성(TPS≥1%)으로서, 백금 기반 화학요법제 치료 도중 또는 이후에 진행이 확인된 진행성 비소세포폐암의 치료. 다만 EGFR 또는 ALK 변이가 확인된 환자는 이 약을 투여하기 전에 이러한 변이에 대한 승인된 치료제를 투여한 후에도 질병의 진행이 확인된 경우여야 한다. 5. 절제 가능한(종양 크기 4 cm 이상 또는 양성 림프절) 비소세포폐암 환자의 치료로서 수술 전 보조요법(neoadjuvant)으로 백금 기반 항암화학요법과 병용 요법, 그리고 이어서 수술 후 보조요법(adjuvant)으로 단독 요법 두경부암 1. 전이성 또는 수술이 불가능한 재발성 두경부 편평상피세포암 환자에서의 1차 치료로서 • PD-L1 발현 양성(CPS≥1)인 환자에서의 단독 요법 • 백금 및 플루오로우라실(5-FU) 화학요법과의 병용 요법 2. PD-L1 발현 양성(TPS≥50%)으로서, 백금 기반 화학요법제 치료 도중 또는 이		

		후에 진행이 확인된 전이성 또는 수술이 불가능한 재발성 두경부 편평상피세포암의 치료로서 단독 요법 전형적 호지킨 림프종 자가조혈모세포이식에 실패하거나, 자가조혈모세포이식이 치료 옵션이 아닌 경우 최소 두 가지 이상의 이전 요법에 실패한 재발성 또는 불응성인 전형적 호지킨 림프종 성인 및 2세 이상의 소아 환자의 치료 요로상피암 1. 백금기반 항암화학요법이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암의 치료 2. 백금 기반 화학요법제 치료 도중 또는 이후에 진행이 확인되거나, 백금기반의 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 또는 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료 12개월 이내에 진행이 확인된 국소 진행성 또는 전이성인 요로상피암의 치료 3. 방광 절제술이 불가능하거나 시행을 선택하지 않았으며, 유두종 유무에 상관없이 상피내암을 동반한 BCG-불응 고위험 비근침습성 방광암의 치료 위암 1. PD-L1 발현 양성(CPS≥1)으로서, 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 HER2 양성 위 또는 위식도접합부 선암 환자에서의 1차 치료로서 트라스투주맙과 플루오로피리미딘 및 백금 화학요법과의 병용 요법 2. 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 HER2 음성 위 또는 위식도접합부 선암 환자에서의 1차 치료로서 플루오로피리미딘 및 백금 기반 화학요법과의 병용 요법 식도암 PD-L1 발현 양성(CPS≥10)으로서, 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 식도암이나 HER-2 음성인 위식도 접합부 선암(병변의 중심(epicenter)이 위식도 접합부 1-5cm위에 위치) 환자에서의 1차 치료로서 백금 및 플루오로피리미딘 기반 화학요법과의 병용 요법 신세포암 1. 진행성 신세포암 환자에서의 1차 치료로서 엑시티닙과의 병용 요법 2. 진행성 신세포암 환자에서의 1차 치료로서 렌바티닙과의 병용 요법 3. 신장 절제술 이후 재발 위험이 중등-고위험 또는 고위험이거나 신장 절제술 및 전이 병변 절제 이후인 신세포암 환자의 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료로서 단독 요법 (사용상의 주의사항 14. 임상시험 정보항 참고) 자궁내막암 이전의 전신 요법 이후 진행이 확인되고 수술적 치료 또는 방사선 치료가 부적합한, 고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H, microsatellite instability high) 또는 불일치 복구 결함(dMMR, mismatch repair deficient)이 없는 진행성 자궁내막암 치료로서 렌바티닙과의 병용 요법

		고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 암 이전의 치료를 받은 후 진행하였고 만족스러운 대체 치료 옵션이 없는, 고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 또는 불일치 복구 결함(dMMR)을 나타내며 수술이 불가능하거나 전이성인 자궁내막암, 위암, 소장암, 난소암, 췌장암, 담도암 환자의 치료 고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 직결장암 고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 또는 불일치 복구 결함(dMMR)을 나타내며 수술이 불가능하거나 전이성인 직결장암 환자의 치료 삼중음성 유방암 1.고위험 조기 삼중음성 유방암 환자의 치료로서 수술 전 보조요법(neoadjuvant)으로 항암화학요법과 병용 요법, 그리고 이어서 수술 후 보조요법(adjuvant)으로 단독 요법 2. PD-L1 발현 양성(CPS≥10)이며, 수술이 불가능한 국소 재발성 또는 전이성 삼중음성 유방암 환자의 치료로서 항암화학요법과의 병용 요법 자궁경부암 PD-L1 발현 양성(CPS≥1)이며 지속성, 재발성 또는 전이성 자궁경부암 환자의 치료로서 베바시주맙을 포함하거나 포함하지 않는 항암화학요법과의 병용 요법
	용법·용량	환자선택 이 약을 다음의 환자에게 투여하고자 하는 경우, PD-L1 발현이 양성인 경우에만 투여한다. 단독 요법 •진행성 비소세포폐암 •전이성 또는 수술이 불가능한 재발성 두경부 편평상피세포암 병용요법 •수술이 불가능한 국소 재발성 또는 전이성 삼중음성 유방암 •수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 HER2 양성 위 또는 위식도접합부 선암 •수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 식도암이나 HER-2 음성인 위식도 접합부 선암(병변의 중심(epicenter)이 위식도 접합부 1-5cm위에 위치) •지속성, 재발성 또는 전이성 자궁경부암 PD-L1 양성 진단 시험은 식품의약품안전처에서 동 의약품의 사용에 적합하게 허가된 체외진단용 의료기기를 사용하여 평가한다. 이 약을 다음의 환자에게 투여하고자 하는 경우, 고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H, microsatellite instability high) 또는 불일치 복구 결함(dMMR, mismatch repair deficient) 종양 상태인 경우에만 투여한다(14. 임상시험 정보 항 참고). •이전의 치료를 받은 후 진행한 암(자궁내막암, 위암, 소장암, 난소암, 췌장암 및 담도암) •수술이 불가능하거나 전이성인 직결장암

		권장용량 이 약을 30분에 걸쳐 정맥 점적주입한다. 이 약의 성인 권장용량은 다음 중 하나를 따른다. •200 mg을 매 3주마다 투여 또는 •400 mg을 매 6주마다 투여 전형적 호지킨 림프종 소아 환자에서 이 약의 권장용량은 2 mg/kg (최대 200 mg)이며, 매 3주마다 30분 동안 정맥 점적주입한다. 병용요법으로 투여하기 위해서는 해당 병용 약제의 처방정보를 참고한다. (사용상의 주의사항 14. 임상시험 정보 항 참고) 이 약을 정맥주사용 화학요법제와 병용하여 투여하는 경우 이 약이 먼저 투여되어야 한다. 이 약과 엑시티닙을 병용 투여하는 신세포암 환자는 엑시티닙의 용법용량과 관련된 허가사항을 참고한다. 이 약과 병용하여 사용될 때, 엑시티닙은 6주 이상의 간격으로 초기 투여용량인 5 mg을 초과하는 용량으로의 증량이 고려될 수 있다. 이 약과 렌바티닙을 병용 투여하는 자궁내막암 및 신세포암환자에서 렌바티닙의 권장 투여 용량은 1일 1회 20mg 경구 투여이며, 렌바티닙의 권장 용량 정보는 렌바티닙의 허가사항을 참고한다. 이 약은 질환이 진행되거나 허용 불가능한 독성 발생 전까지 투여한다. 이 약은 긴급 상황에 대응 가능한 의료시설에서 항암치료요법에 대한 지식과 경험이 충분한 의사에 의해 투여되어야 한다. 흑색종 및 신세포암의 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료 시, 이 약은 최대 1년까지 혹은 질환이 재발하거나 허용 불가능한 독성 발생 전까지 투여한다. 절제 가능한 비소세포폐암의 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 및 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료 시, 수술 전 보조요법으로서 이 약을 항암화학요법과 병용하여 12주 동안 또는 근치적 수술을 불가능하게 하는 질병 진행이나 허용 불가능한 독성 발생 전까지 투여하고, 이어서 수술 후 보조요법으로서 이 약을 단독으로 39주 동안 또는 질병 재발이나 허용 불가능한 독성 발생 전까지 투여한다. 고위험 조기 삼중음성 유방암 수술 전 보조요법(neoadjuvant): 이 약을 항암화학요법과 병용하여 매 3주마다 200 mg 8회 또는 매 6주마다 400 mg 4회 투여한다. 수술 후 보조요법(adjuvant): 이 약을 단독으로 매 3주마다 200 mg 9회 또는 매 6주마다 400 mg 5회 투여한다. 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 및 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료 시, 질병의 진행 또는 이 약과 관련된 허용 불가능한 독성을 경험한 경우 이 약의투여를 중단한다. 용량조절 이 약의 용량감량은 권장되지 않는다. 표 1에 기재된 약물이상반응을 관리하기 위해서는 이 약을 보류하거나 중단한다. 표 1. 용량 조절 권장사항 (사용상의 주의사항 4. 일반적 주의 항 참고)

약물이상반응	중증도	용량 조절
면역-매개 폐염증	중등증(2등급)	이상사례가 0~1등급으로 회복될 때까지 이 약의 투여를 보류한다.*
	중증 또는 생명을 위협하는(3등급 또는 4등급), 또는 재발성 중등증(2등급)	이 약의 투여를 영구 중단한다.
면역-매개 결장염	중등증 또는 중증(2등급 또는 3등급)	이상사례가 0~1등급으로 회복될 때까지 이 약의 투여를 보류한다.*
	생명을 위협하는(4등급), 또는 재발성 중증(3등급)	이 약의 투여를 영구 중단한다.
면역-매개 신장염	중등증(2등급)	이상사례가 0~1등급으로 회복될 때까지 이 약의 투여를 보류한다.*
	중증 또는 생명을 위협하는(3등급 또는 4등급)	이 약의 투여를 영구 중단한다.
면역-매개 내분비병증	중증 또는 생명을 위협하는(3등급 또는 4등급)	이상사례가 0~1등급으로 회복될 때까지 이 약의 투여를 보류한다.* 2등급 이하로 개선되거나 호르몬 대체 요법으로 조절되는 중증(3등급) 또는 생명을 위협하는(4등급) 내분비병증의 경우, 이 약 투여를 지속하는 것을 고려할 수 있다.
면역-매개 간염 엑시티닙과의 병용요법으로 투여받는 신세포암 환자에서의 간 효소 상승의 경우, 표 아래쪽의 용량 조절 지침을 참고한다.	아스파라긴산 아미노전이효소(AST) 또는 알라닌 아미노전이효소(ALT)가 정상 상한치(ULN)의 3배 초과~5배로 상승하거나 총 빌리루빈이 정상 상한치의 1.5배 초과~3배로 상승하는 경우	이상사례가 0~1등급으로 회복될 때까지 이 약의 투여를 보류한다.*
	AST 또는 ALT가 정상 상한치의 5배를 초과하거나 총 빌리루빈이 정상 상한치의 3배를 초과하는 경우	이 약의 투여를 영구 중단한다.
	AST 또는 ALT의 중등도(2등급) 상승이 있는 상태에서 치료를 시작한 간 전이 환자에서 AST 또는 ALT 상승이 기저치 대비 50% 이상이고 지속 기간이 1주 이상인 경우	이 약의 투여를 영구 중단한다.
면역-매개 피부반응 또는 스티븐스-존슨 증후군(SJS) 또는 독성 표피괴사융해증 (TEN)	중증 피부반응(3등급)이 나타나거나 스티븐스-존슨 증후군(SJS) 또는 독성표피괴사융해증(TEN)이 의심되는 경우	이상사례가 0~1등급으로 회복될 때까지 이 약의 투여를 보류한다.*
	중증 피부반응(4등급)이 나타나거나 스티븐스-존슨 증후군(SJS) 또는 독성표피괴사융해증(TEN)이 확진된 경우	이 약의 투여를 영구 중단한다.
기타 면역-매개 약물이상반응	중증도와 이상사례의 유형에 따라 (2등급 또는 3등급)	이상사례가 0~1등급으로 회복될 때까지 이 약의 투여를 보류한다.*
	중증 또는 생명을 위협하는 (3등	이 약의 투여를 영구 중단한다.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>급 또는 4등급) 심근염, 뇌염, 또는 길랑-바레증후군</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>생명을 위협하거나(4등급) 재발성 중증(3등급)</td><td>이 약의 투여를 영구 중단한다.</td></tr>
<tr><td>주입 관련 반응</td><td>중증 또는 생명을 위협하는 (3등급 또는 4등급)</td><td>이 약의 투여를 영구 중단한다.</td></tr>
</table>
주의: 독성 등급은 NCI CTCAE v4.0(National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0)에 따른다.
*12주 이내에 코르티코스테로이드 용량을 프레드니손 해당량으로 1일 10 mg 이하로 감량할 수 없는 경우이거나 이 약 최종 투여 후 12주 이내에 치료-관련 독성이 0~1등급으로 회복되지 않는 경우에는 이 약의 투여를 영구 중단한다.
전형적 호지킨림프종 환자에서 4등급의 혈액학적 독성이 나타나는 경우, 이상사례가 0~1등급으로 회복될 때까지 이 약의 투여를 보류한다.
이 약과 엑시티닙의 병용 요법으로 투여받는 신세포암 환자:
・ALT 또는 AST가 정상 상한치의 3배 이상~10배 미만이면서 동시에 총 빌리루빈이 정상 상한치의 2배 이상으로 상승하지 않는 경우, 이상사례가 0~1등급으로 회복될 때까지 이 약과 엑시티닙의 투여를 모두 보류한다. 코르티코스테로이드 투여를 고려한다. 회복 후에는 한 가지 약으로 재투여하거나, 두 가지 약을 순차적으로 재투여하는 것을 고려한다. 엑시티닙을 재투여하는 경우, 엑시티닙의 허가사항에 따라 용량 감량을 고려한다.
・ALT 또는 AST가 정상 상한치의 10배 이상인 경우, 또는 정상 상한치의 3배 초과이면서 동시에 총 빌리루빈이 정상 상한치의 2배 이상으로 상승하는 경우, 이 약과 엑시티닙의 투여를 모두 영구 중단하고 코르티코스테로이드 투여를 고려한다.
이 약과 렌바티닙을 병용 투여하는 경우, 약물이상반응을 적절히 조절하기 위해 한 가지 또는 두 가지 약을 일시 중단하거나 렌바티닙의 용량을 감량하거나, 중단한다. 렌바티닙의 약물이상반응 조절을 위한 권장사항은 렌바티닙의 허가사항을 참고한다. 이 약의 용량감량은 권장되지 않는다.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">변경 허가 사항</td><td>변경허가일자</td><td colspan="3">2024.4.12.</td></tr>
<tr><td>효능·효과</td><td colspan="3">붙임 참조</td></tr>
<tr><td>용법·용량</td><td colspan="3">붙임 참조</td></tr>
<tr><td>사용상의 주의사항</td><td colspan="3">붙임 참조</td></tr>
<tr><td>허가조건</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">국외 허가현황</td><td colspan="3">미국(FDA) : 2014.09.04. 최초허가(자궁경부암 2024.1.12., 담도암 2023.10.31.)
유럽(EMA) : 2015.07.17. 최초허가(자궁경부암 검토중, 담도암 2023.11.9.)</td></tr>
<tr><td colspan="2">허가부서</td><td>첨단제품허가담당관</td><td>허가담당자</td><td>김미애 주무관, 이내리 연구관, 오정원 과장</td></tr>
<tr><td colspan="2">심사부서</td><td><사전검토>
유전자재조합의약품과</td><td>심사담당자</td><td>전설희 주무관, 진미령 연구관, 김호정 과장</td></tr>
<tr><td colspan="2">GMP* 평가부서</td><td>해당없음</td><td>GMP 담당자</td><td>해당없음</td></tr>
</table>

* 의약품 제조 및 품질관리 실시상황 평가에 필요한 자료

1. 허가·심사 개요 (「의약품등의 안전에 관한 규칙」 제4조제1항 관련)

1.1 안전성·유효성 심사결과 <붙임 1 참조>

1.2 최종 변경허가사항

○ 효능·효과

흑색종
1. 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종 환자의 치료
2. 완전 절제술을 받은 IIB기, IIC기 또는 III기 흑색종 환자의 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료

비소세포폐암
1. EGFR 또는 ALK 변이가 없는 전이성 비편평 비소세포폐암 환자에서의 1차 치료로서 페메트렉시드 및 백금 화학요법과의 병용 요법
2. 전이성 편평 비소세포폐암 환자에서의 1차 치료로서 카보플라틴 및 파클리탁셀(혹은 알부민 결합 파클리탁셀)과의 병용 요법
3. PD-L1 발현 양성(Tumor Proportion Score(TPS)≥50%)으로서, EGFR 또는 ALK 변이가 없는 진행성 비소세포폐암 환자에서의 1차 치료
4. PD-L1 발현 양성(TPS≥1%)으로서, 백금 기반 화학요법제 치료 도중 또는 이후에 진행이 확인된 진행성 비소세포폐암의 치료. 다만 EGFR 또는 ALK 변이가 확인된 환자는 이 약을 투여하기 전에 이러한 변이에 대한 승인된 치료제를 투여한 후에도 질병의 진행이 확인된 경우여야 한다.
5. 절제 가능한(종양 크기 4 cm 이상 또는 양성 림프절) 비소세포폐암 환자의 치료로서 수술 전 보조요법(neoadjuvant)으로 백금 기반 항암화학요법과 병용 요법, 그리고 이어서 수술 후 보조요법(adjuvant)으로 단독 요법

두경부암
1. 전이성 또는 수술이 불가능한 재발성 두경부 편평상피세포암 환자에서의 1차 치료로서
• PD-L1 발현 양성(CPS≥1)인 환자에서의 단독 요법
• 백금 및 플루오로우라실(5-FU) 화학요법과의 병용 요법
2. PD-L1 발현 양성(TPS≥50%)으로서, 백금 기반 화학요법제 치료 도중 또는 이후에 진행이 확인된 전이성 또는 수술이 불가능한 재발성 두경부 편평상피세포암의 치료로서 단독 요법

전형적 호지킨 림프종
자가조혈모세포이식에 실패하거나, 자가조혈모세포이식이 치료 옵션이 아닌 경우 최소 두 가지 이상의 이전 요법에 실패한 재발성 또는 불응성인 전형적 호지킨 림프종 성인 및 2세 이상의 소아 환자의 치료

요로상피암
1. 백금기반 항암화학요법이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암의 치료
2. 백금 기반 화학요법제 치료 도중 또는 이후에 진행이 확인되거나, 백금기반의 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 또는 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료 12개월 이내에 진행이 확인된 국소 진행성 또는 전이성인 요로상피암의 치료
3. 방광 절제술이 불가능하거나 시행을 선택하지 않았으며, 유두종 유무에 상관없이 상피내암을 동반한 BCG-불응 고위험 비근침습성 방광암의 치료

위암
1. PD-L1 발현 양성(CPS≥1)으로서, 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 HER2 양성 위 또는 위식도접합부 선암 환자에서의 1차 치료로서 트라스투주맙과 플루오로피리미딘 및 백금 화학요법과의 병용 요법
2. 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 HER2 음성 위 또는 위식도접합부 선암 환자에서의 1차 치료로서 플루오로피리미딘 및 백금 기반 화학요법과의 병용 요법

식도암
PD-L1 발현 양성(CPS≥10)으로서, 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 식도암이나 HER-2 음성인 위식도 접합부 선암(병변의 중심(epicenter)이 위식도 접합부 1-5cm위에 위치) 환자에서의 1차 치료로서 백금 및 플루오로피리미딘 기반 화학요법과의 병용 요법

신세포암
1. 진행성 신세포암 환자에서의 1차 치료로서 엑시티닙과의 병용 요법
2. 진행성 신세포암 환자에서의 1차 치료로서 렌바티닙과의 병용 요법
3. 신장 절제술 이후 재발 위험이 중등-고위험 또는 고위험이거나 신장 절제술 및 전이병변 절제 이후인 신세포암 환자의 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료로서 단독 요법 (사용상의 주의사항 14. 임상시험 정보항 참고)

자궁내막암
이전의 전신 요법 이후 진행이 확인되고 수술적 치료 또는 방사선 치료가 부적합한, 고

빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H, microsatellite instability high) 또는 불일치 복구 결함(dMMR, mismatch repair deficient)이 없는 진행성 자궁내막암 치료로서 렌바티닙과의 병용 요법

고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 암
이전의 치료를 받은 후 진행하였고 만족스러운 대체 치료 옵션이 없는, 고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 또는 불일치 복구 결함(dMMR)을 나타내며 수술이 불가능하거나 전이성인 자궁내막암, 위암, 소장암, 난소암, 췌장암, 담도암 환자의 치료

고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 직결장암
고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 또는 불일치 복구 결함(dMMR)을 나타내며 수술이 불가능하거나 전이성인 직결장암 환자의 치료

삼중음성 유방암
1.고위험 조기 삼중음성 유방암 환자의 치료로서 수술 전 보조요법(neoadjuvant)으로 항암화학요법과 병용 요법, 그리고 이어서 수술 후 보조요법(adjuvant)으로 단독 요법
2. PD-L1 발현 양성(CPS≥10)이며, 수술이 불가능한 국소 재발성 또는 전이성 삼중음성 유방암 환자의 치료로서 항암화학요법과의 병용 요법

자궁경부암
1. FIGO 2014 Ⅲ-ⅣA기 자궁경부암 환자의 치료로서 화학방사선요법과의 병용 요법
2. PD-L1 발현 양성(CPS≥1)이며 지속성, 재발성 또는 전이성 자궁경부암 환자의 치료로서 베바시주맙을 포함하거나 포함하지 않는 항암화학요법과의 병용 요법

담도암
수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 담도암 환자의 1차 치료로서 젬시타빈 및 시스플라틴과의 병용 요법

○ 용법·용량

- 기허가사항과 동일

○ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약 및 그 구성 성분에 과민증인 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
자가면역질환이 있거나 만성적 혹은 재발성 자가면역질환의 기왕력이 있는 환자

3. 이상사례
1) 임상시험에서 보고된 이상사례
대조 및 비대조 임상시험에서 총 2799명을 대상으로 이 약의 안전성을 분석하였다. 치료 기간의 중앙값은 4.2개월(범위 : 1일 ~ 30.4개월)이었고, 6개월 이상 치료받은 환자는 1153명, 1년 이상 치료 받은 환자는 600명이었다.
환자의 5%가 치료 관련 약물이상반응으로 이 약 투여를 중단하였다. 최종 투여 후 90일째까지 보고된 치료 관련 중대한 이상사례(SAE)는 이 약을 투여 받은 환자의 10%에서 발생하였다. 발생한 치료 관련 중대한 이상사례 중 가장 흔하게 발생한 이상사례는 다음과 같다; 폐염증, 결장염, 설사, 발열. 치료 관련 중대한 이상사례로 자가면역성 간염과 부신기능저하증도 보고되었다.
가. 흑색종
표 2는 KEYNOTE-006에서 흑색종 환자에게 이 약을 투여했을 때 10% 이상의 환자에서 보고된 이상사례를 요약한 것이다. 가장 흔한 이상사례(20% 이상의 환자에서 보고됨)는 피로와 설사였다.
표 2. 흑색종 환자에게 이 약을 투여했을 때 10% 이상의 환자에서 보고되고 이필리무맙 투여군 이상으로 발생한 이상사례 (KEYNOTE-006)

	이 약 10 mg/kg 매 2주 또는 3주에 1회 n=555		이필리무맙 3 mg/kg 매 3주에 1회 n=256	
이상사례	모든 등급[†] (%)	3-4등급 (%)	모든 등급 (%)	3-4등급 (%)
전신 장애 및 투여부위 상태				
피로	28	0.9	28	3.1
피부 및 피하조직 장애				
발진[‡]	24	0.2	23	1.2
백반증[§]	13	0	2	0
근골격계 및 결합조직 장애				
관절통	18	0.4	10	1.2
등허리 통증	12	0.9	7	0.8
호흡기, 흉부 및 종격동 장애				
기침	17	0	7	0.4
호흡곤란	11	0.9	7	0.8
대사 및 영양 장애				
식욕 감퇴	16	0.5	14	0.8
신경계 장애				
두통	14	0.2	14	0.8

[†]NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.
[‡]발진, 홍반성 발진, 수포성 발진, 전신발진, 황반성 발진, 반상-구진 발진, 구진성 발진, 소양성 발진, 박리성 발진을 포함한다.
[§]피부 저색소침착을 포함한다.

이 약을 투여 받은 환자 10% 이상에서 다른 임상적으로 중요한 이상사례로 보고된 것은 다음과 같다; 설사(26%), 오심(구역)(21%), 소양증(17%).

표 3. 이 약을 투여한 흑색종 환자의 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 중 이필리무맙군 이상으로 많이 발생한 이상 (KEYNOTE-006)

	이 약 10 mg/kg 매 2주 또는 3주에 1회		이필리무맙	
임상검사†	모든 등급 (%)‡	3-4등급 (%)	모든 등급 (%)	3-4등급 (%)
화학적 검사				
고혈당증	45	4.2	45	3.8
고중성지방혈증	43	2.6	31	1.1
저나트륨혈증	28	4.6	26	7
AST 증가	27	2.6	25	2.5
고콜레스테롤혈증	20	1.2	13	0
혈액학적 검사				
빈혈	35	3.8	33	4.0
림프구감소증	33	7	25	6

†시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약(520-546명) 및 이필리무맙(237-247명); 고중성지방혈증: 이 약 n=429, 이필리무맙 n=183; 고콜레스테롤혈증: 이 약 n=484, 이필리무맙 n=205.
‡NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.

이 약을 투여 받은 환자에서 20% 이상으로 보고된 다른 임상검사치 이상은 다음과 같다; 저알부민혈증 증가(모든 등급 27%, 3-4등급 2.4%), ALT 증가(모든 등급 23%, 3-4등급 3.1%), ALP 증가(모든 등급 21%, 3-4등급 2.0%).

표 4는 KEYNOTE-002에서 흑색종 환자에게 이 약을 투여했을 때 10% 이상의 환자에서 보고된 이상사례를 요약한 것이다. 가장 흔한 이상사례(20% 이상의 환자에서 보고됨)는 피로, 소양증, 발진, 변비, 오심, 설사, 식욕감퇴였다.

표 4. 흑색종 환자에게 이 약을 투여했을 때 10% 이상의 환자에서 보고되고 화학요법제 투여군 이상으로 발생한 이상사례 (KEYNOTE-002)

	이 약 2 mg/kg 또는 10mg/kg 매 3주에 1회 n=357		화학요법제† n=171	
이상사례	모든 등급‡ (%)	3-4 등급 (%)	모든 등급 (%)	3-4 등급 (%)
전신 장애 및 투여부위 상태				
발열	14	0.3	9	0.6
무력증	10	2.0	9	1.8
피부 및 피하조직 장애				
소양증	28	0	8	0
발진§	24	0.6	8	0
위장관 장애				
변비	22	0.3	20	2.3
설사	20	0.8	20	2.3
복통	13	1.7	8	1.2
호흡기, 흉부 및 종격동 장애				
기침	18	0	16	0
근골격계 및 결합조직 장애				
관절통	14	0.6	10	1.2

†화학요법제: 다카르바진, 테모졸로미드, 카보플라틴/파클리탁셀, 파클리탁셀 또는 카보플라틴

‡NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.
§발진, 홍반성 발진, 전신발진, 황반성 발진, 반상-구진 발진, 구진성 발진, 소양성 발진을 포함한다.

이 약을 투여 받은 환자에서 다른 임상적으로 중요한 이상사례로 보고된 것은 다음과 같다; 피로(43%), 오심(구역)(22%), 식욕 감퇴(20%), 구토(13%), 말초 신경 병증(1.7%).

표 5. 이 약을 투여한 흑색종 환자의 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 중 화학요법제 군 이상으로 많이 발생한 이상 (KEYNOTE-002)

	이 약 2 mg/kg 또는 10 mg/kg 매 3주에 1회		화학요법제	
임상검사†	모든 등급 (%)‡	3-4등급 (%)	모든 등급 (%)	3-4등급 (%)
화학적 검사				
고혈당증	49	6	44	6
저알부민혈증	37	1.9	33	0.6
저나트륨혈증	37	7	24	3.8
고중성지방혈증	33	0	32	0.9
ALP 증가	26	3.1	18	1.9
AST 증가	24	2.2	16	0.6
Bicarbonate 감소	22	0.4	13	0
저칼슘혈증	21	0.3	18	1.9
ALT 증가	21	1.8	16	0.6

†시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약 (320-325명) 및 화학요법제(154-161명); 고중성지방혈증: 이 약 n=247, 화학요법제 n=116; bicarbonate 감소: 이 약 n=263, 화학요법제 n=123.
‡NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.

이 약을 투여 받은 환자에서 20% 이상으로 보고된 다른 임상검사치 이상은 다음과 같다; 빈혈(모든 등급 44%, 3-4등급 10%), 림프구 감소증(모든 등급 40%, 3-4등급 9%).

전반적으로, 용량 및 이필리무맙 투여경험에 관계없이 안전성 프로파일은 유사하였다.

나. 절제술을 받은 흑색종

KEYNOTE-716에 참여한 절제술을 받은 흑색종 환자 969명 및 KEYNOTE-054에 참여한 절제술을 받은 흑색종 환자 1019명에서 발생한 이상사례는 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종 혹은 비소세포폐암 환자에서의 이상사례와 전반적으로 비슷하였다.

다. 비소세포폐암

병용 요법

표 6은 KEYNOTE-189에 참여해 이 약과 페메트렉시드 및 백금 화학요법제와의 병용 요법으로 치료받은 환자 중 10% 이상에서 보고된 이상사례를 정리한 것이다. KEYNOTE-407에 참여해 이 약과 카보플라틴 및 파클리탁셀 혹은 알부민 결합 파클리탁셀과의 병용 요법으로 치료받은 이전 치료 경험이 없는 비소세포폐암 환자에서 보고된 이상사례는 KEYNOTE-189에서 보고된 이상사례와 유사하였지만, 다음 이상사례는 예외적으로 KEYNOTE-407에서 발생률이 증가하였다 (이 약 + 화학요법제 vs. 위약+ 화학요법제); 탈모(46% vs. 36%), 관절통(21% vs. 14%), 말초신경병증 (21% vs. 16%), 근육통(13% vs. 13%), 말초 감각 신경병증(12% vs. 13%), 백혈구 수 감소(11% vs. 11%), 불면증(10% vs. 8%) 및 체중 감소(10% vs. 8%).

표 6. 이 약과 페메트렉시드 및 백금 화학요법제를 함께 투여받은 환자 중 10% 이상에서 발생한 이상사례 (KEYNOTE-189)

	이 약 +	위약 +

	페메트렉시드 + 백금 화학요법제 n=405		페메트렉시드 + 백금 화학요법제 n=202	
이상사례	모든 등급*(%)	3-4등급(%)	모든 등급(%)	3-4등급(%)
위장관 장애				
오심	56	3.5	52	3.5
변비	35	1.0	32	0.5
설사	31	5	21	3.0
구토	24	3.7	23	3.0
전신 장애				
피로†	56	12	58	6
발열	20	0.2	15	0
말초 부종	19	0.2	13	0
대사 및 영양장애				
식욕감퇴	28	1.5	30	0.5
피부 및 피하조직 장애				
발진‡	25	2.0	17	2.5
소양증	11	0	10	0
호흡기, 흉부 및 종격동 장애				
기침	21	0	28	0
호흡 곤란	21	3.7	26	5
눈 장애				
눈물분비 증가	17	0	11	0
근골격계 및 결합조직 장애				
등허리 통증	13	1.2	11	1.5
신경계 장애				
어지러움	12	0.7	9	0
두통	12	0	9	0
미각 이상	11	0.2	9	0
감염 및 감염증				
상기도감염	10	1.2	7	1.0
*NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다. †무력증 및 피로를 포함한다. ‡생식기 발진, 발진, 전신발진, 황반성 발진, 반상-구진 발진, 구진성 발진, 소양성 발진, 농포성 발진을 포함한다.				

표 7은 KEYNOTE-189에 참여해 이 약과 페메트렉시드 및 백금 화학요법제와의 병용 요법으로 치료받은 환자 중 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상을 정리한 것이다.

표 7. 이 약을 투여한 환자의 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 (KEYNOTE-189)

	이 약 + 페메트렉시드 + 백금 화학요법제		페메트렉시드 + 백금 화학요법제	
임상검사*	모든 등급 (%)†	3-4 등급 (%)	모든 등급 (%)	3-4 등급 (%)
화학적 검사				
고혈당증	63	9	60	7
ALT 증가	47	3.8	42	2.6

AST 증가	47	2.8	40	1.0
저알부민혈증	39	2.8	39	1.1
크레아티닌 증가	37	4.2	25	1.0
저나트륨혈증	32	7	23	6
저인산혈증	30	10	28	14
ALP 증가	26	1.8	29	2.1
저칼슘혈증	24	2.8	17	0.5
고칼륨혈증	24	2.8	19	3.1
저칼륨혈증	21	5	20	5
혈액학적 검사				
빈혈	85	17	81	18
림프구 감소증	64	22	64	25
호중구 감소증	48	20	41	19
혈소판 감소증	30	12	29	8

*시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약+페메트렉시드+백금 화학요법제(381-401명) 및 페메트렉시드+백금 화학요법제(184-197명).

†NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.

절제 가능한 비소세포폐암의 수술 전 보조요법 및 수술 후 보조요법

이전에 치료경험이 없고 AJCC 8판에 따른 절제 가능한 II, IIIA 또는 IIIB(N2)기 비소세포폐암 환자에 대해 수술 전 보조요법으로서 백금 기반 항암화학요법과 병용 투여 후 수술, 그리고 이어서 수술 후 보조요법으로서 단독 투여한 이 약의 안전성은 다기관, 무작위 배정(1:1), 이중 맹검, 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-671에서 평가되었다.

매 3주마다 이 약 200 mg에 대한 노출기간 중앙값은 10.9개월(범위: 1일-18.6개월)이었다.

이 약을 수술 전 보조요법으로서 백금 기반 항암화학요법과 병용하여 투여 받고, 이어서 수술 후 보조요법으로서 단독으로 투여 받은 절제 가능한 비소세포폐암 환자들에서 발생한 이상사례는, 이 약을 항암화학요법과 병용하여 투여 받은 종양 유형 관련 다른 임상시험들의 환자들에서와 전반적으로 비슷하였다.

KEYNOTE-671의 수술 전 보조요법 단계

총 396명의 환자가 수술 전 보조요법으로서 백금 기반 항암화학요법과 병용하여 이 약을 투여 받았으며, 총 399명의 환자가 수술 전 보조요법으로서 백금 기반 항암화학요법과 병용하여 위약을 투여 받았다.

중대한 이상사례는 수술 전 보조요법으로서 이 약을 백금 기반 항암화학요법과 병용하여 투여 받은 환자의 34%에서 발생하였다; 가장 빈번한(≥2%) 중대한 이상사례는 폐렴(4.8%), 정맥 혈전 색전증(3.3%), 그리고 빈혈(2%)이었다. 치명적인 이상사례는 환자의 1.3%에서 발생하였으며, 원인미상의 사망(0.8%), 패혈증(0.3%), 그리고 면역-매개 폐 질환(0.3%)을 포함하였다.

이상사례로 인한 영구적인 투여중단은 수술 전 보조요법으로서 이 약을 백금 기반 항암화학요법과 병용하여 투여 받은 환자의 18%에서 발생하였다; 영구적인 투여중단을 야기한 가장 빈번한(≥1%) 이상사례는 급성 신 손상(1.8%), 간질성 폐 질환(1.8%), 빈혈(1.5%), 중성구 감소증(1.5%), 그리고 폐렴(1.3%)이었다.

수술 전 보조요법으로서 이 약을 투여 받은 환자 396명 및 위약을 투여 받은 환자 399명 중 각각 6%(25명) 및 4.3%(17명)는 이상사례로 인해 수술을 받지 않았다. 이 약 투여군에서 수술 취소를 야기한 가장 빈번한(≥1%) 이상사례는 간질성 폐 질환(1%)이었다.

이 약을 투여 받은 환자 중 수술을 받은 325명의 환자 중에서, 3.1%(10명)는 이상사례로 인해 수술 지연(환자가 수술 전 보조요법을 4주기 미만으로 받은 경우 마지막 수술 전 보조요법 투여 후 8주

초과, 또는 환자가 수술 전 보조요법을 4주기 받은 경우 수술 전 보조요법의 첫 용법 후 20주 초과 후 수술)을 경험하였다. 위약을 투여 받은 환자 중 수술을 받은 317명의 환자 중에서, 2.5%(8명)는 이상사례로 인해 수술 지연을 경험하였다.

이 약을 투여 받은 환자 중 수술을 받은 325명의 환자 중에서, 7%(22명)는 이상사례로 인해 수술 후 보조요법을 받지 않았다. 위약을 투여 받은 환자 중 수술을 받은 317명의 환자 중에서, 3.2%(10명)는 이상사례로 인해 수술 후 보조요법을 받지 않았다.

KEYNOTE-671의 수술 후 보조요법 단계

이 약 투여군의 총 290명의 환자 및 위약군의 총 267명의 환자가 수술 후 보조요법을 투여 받았다.

수술 후 보조요법으로서 이 약을 단독 투여 받은 환자 중에서, 14%는 중대한 이상사례를 경험하였다; 가장 빈번한 중대한 이상사례는 폐렴(3.4%)이었다. 치명적인 이상사례는 폐출혈로써 한 건 발생하였다. 이상사례로 인한 수술 후 보조요법으로서 이 약의 영구적인 투여중단은 환자의 12%에서 발생하였다; 수술 후 보조요법으로서 이 약의 영구적인 투여중단을 야기한 가장 빈번한(≥1%) 이상사례는 설사(1.7%), 간질성 폐 질환(1.4%), AST 증가(1%), 그리고 근골격 통증(1%)이었다.

단독 요법

표 8은 KEYNOTE-010에 참여해 이 약을 투여 받은 이전 치료경험이 있는 비소세포폐암 환자 중 10% 이상에서 보고된 이상사례를 정리한 것이다. 가장 일반적인 이상사례(20% 이상의 환자에서 보고됨)는 식욕감퇴, 피로, 호흡곤란, 오심(구역)이었다. KEYNOTE-024에서 이 약을 투여 받은 이전 치료경험이 없는 비소세포폐암 환자들에서 보고된 이상사례는 일반적으로 KEYNOTE-010에서 보고된 것들과 유사하였다.

표 8. 이 약을 투여 받은 비소세포폐암 환자 중 10% 이상에서 보고되고 도세탁셀 투여군 이상으로 발생한 이상사례 (KEYNOTE-010)

	이 약 2 또는 10 mg/kg 매 3주에 1회 n=682		도세탁셀 75 mg/m^2 매 3주에 1회 n=309	
이상사례	모든 등급(%)†	3-4등급(%)	모든 등급(%)	3-4등급(%)
대사 및 영양 장애				
식욕감퇴	25	1.5	23	2.6
위장관 장애				
오심(구역)	20	1.3	18	0.6
변비	15	0.6	12	0.6
구토	13	0.9	10	0.6
호흡기, 흉부 및 종격동 장애				
호흡곤란	23	3.7	20	2.6
기침	19	0.6	14	0
근골격계 및 결합조직 장애				
관절통	11	1.0	9	0.3
등허리 통증	11	1.5	8	0.3
피부 및 피하조직 장애				
발진‡	17	0.4	8	0
소양증	11	0	3	0.3

†NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.

‡발진, 홍반성 발진, 황반성 발진, 반상-구진 발진, 구진성 발진, 소양성 발진을 포함한다.

이 약을 투여 받은 환자에서 다른 임상적으로 중요한 이상사례로 보고된 것은 다음과 같다; 피로(25%), 설사(14%), 무력증(11%), 발열(11%).

표 9. 이 약을 투여한 비소세포폐암 환자의 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 중 도세탁셀 군 이상으로 많이 발생한 이상 (KEYNOTE-010)

	이 약 2 또는 10 mg/kg 매 3주에 1회		도세탁셀 75 mg/m^2 매 3주에 1회	
임상검사[†]	모든 등급 (%)[‡]	3-4등급 (%)	모든 등급 (%)[‡]	3-4등급 (%)
화학적 검사				
저나트륨혈증	32	8	27	2.9
ALP 증가	28	3.0	16	0.7
AST 증가	26	1.6	12	0.7
ALT 증가	22	2.7	9	0.4
[†]시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약(631-638명) 및 도세탁셀(274-277명). [‡]NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.				

이 약을 투여 받은 환자에서 20% 이상으로 보고된 다른 임상검사치 이상은 다음과 같다; 고혈당증(모든 등급 44%, 3-4등급 4.1%), 빈혈(모든 등급 37%, 3-4등급 3.8%), 고중성지방혈증(모든 등급 36%, 3-4등급 1.8%), 림프구 감소증(모든 등급 35%, 3-4등급 9%), 저알부민혈증(모든 등급 34%, 3-4등급 1.6%), 고콜레스테롤혈증(모든 등급 20%, 3-4등급 0.7%).

라. 두경부암

이 약을 단독 요법으로 치료받은 두경부암 환자에서 발생한 이상사례는 흑색종이나 비소세포폐암 환자에서의 이상사례와 전반적으로 비슷하였다.

이 약과 화학요법제(백금 및 5-FU)를 병용 투여로 치료받은 두경부암 환자에서 세툭시맙과 화학요법제(백금 및 5-FU) 병용 투여와의 발생률 차이가 2% 이상인 중증 이상(3-4등급) 약물이상반응은 다음과 같다: 피로 (7% vs. 4.9%), 점막 염증 (10% vs. 5%), 구내염 (8% vs. 3.5%).

표 10 및 표 11은 KEYNOTE-048에 참여해 이 약으로 치료 받은 환자에서의 약물이상반응과 임상검사치 이상을 요약한 것이다.

표 10. 이 약을 투여받은 환자 중 10% 이상의 환자에서 발생한 약물이상반응 (KEYNOTE-048)

이상사례	이 약 200mg 매 3주에 1회 n=300		이 약 200mg 매 3주에 1회 + 백금 + 플루오로우라실 n=276		세툭시맙 + 백금 + 플루오로우라실 n=287	
	모든 등급* (%)	3-4 등급 (%)	모든 등급* (%)	3-4 등급 (%)	모든 등급* (%)	3-4 등급 (%)
전신 장애						
피로[†]	33	4	49	11	48	8
발열	13	0.7	16	0.7	12	0
점막 염증	4.3	1.3	31	10	28	5
위장관 장애						
변비	20	0.3	37	0	33	1.4
오심	17	0	51	6	51	6
설사[‡]	16	0.7	29	3.3	35	3.1
구토	11	0.3	32	3.6	28	2.8
연하 곤란	8	2.3	12	2.9	10	2.1

구내염	3	0	26	8	28	3.5
피부 장애						
발진[§]	20	2.3	17	0.7	70	8
소양증	11	0	8	0	10	0.3
호흡기, 흉부 및 종격동 장애						
기침[¶]	18	0.3	22	0	15	0
호흡 곤란[#]	14	2.0	10	1.8	8	1.0
내분비 장애						
갑상선 저하증	18	0	15	0	6	0
대사 및 영양 장애						
식욕 감소	15	1.0	29	4.7	30	3.5
체중 감소	15	2	16	2.9	21	1.4
감염						
폐렴[Þ]	12	7	19	11	13	6
신경계 장애						
두통	12	0.3	11	0.7	8	0.3
어지러움	5	0.3	10	0.4	13	0.3
말초 감각 신경 병증[β]	1	0	14	1.1	7	1
근골격계 장애						
근육통[à]	12	1.0	13	0.4	11	0.3
경부 통증	6	0.7	10	1.1	7	0.7
정신의학적 장애						
불면	7	0.7	10	0	8	0

*NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.

[†]피로, 무력증을 포함한다.

[‡]설사, 결장염, 출혈성 설사, 현미경적 결장염을 포함한다.

[§]피부염, 여드름양 피부염, 알레르기성 피부염, 수포성 피부염, 접촉 피부염, 탈락 피부염, 약물 발진, 홍반, 다형성 홍반, 발진, 홍반성 발진, 전신 발진, 반상 발진, 반상-구진 발진, 소양성 발진, 지루성 피부염을 포함한다.

[¶]기침, 습성 기침을 포함한다.

[#]호흡 곤란, 노작성 호흡 곤란을 포함한다.

[Þ]폐렴, 비정형 폐렴, 세균성 폐렴, 포도상 구균 폐렴, 흡인성 폐렴, 하기도 감염, 폐 감염, 슈도모나스 폐 감염을 포함한다.

[β]말초 감각 신경 병증, 말초 신경 병증, 감각 저하, 이상 감각을 포함한다.

[à]등허리 통증, 근골격성 흉부 통증, 근골격 통증, 근육통을 포함한다.

표 11. 이 약을 투여 받은 환자 중 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 (KEYNOTE-048)

임상검사*	이 약 200mg 매 3주에 1회		이 약 200mg 매 3주에 1회 + 백금 + 플루오로우라실		세툭시맙 + 백금 + 플루오로우라실	
	모든 등급[†] (%)	3-4 등급 (%)	모든 등급[†] (%)	3-4 등급 (%)	모든 등급[†] (%)	3-4 등급 (%)
혈액학적 검사						

림프구 감소증	54	25	69	35	74	45
빈혈	52	7	89	28	78	19
혈소판 감소증	12	3.8	73	18	76	18
중성구 감소증	7	1.4	67	35	71	42
화학적 검사						
고혈당증	47	3.8	55	6	66	4.7
저나트륨 혈증	46	17	56	20	59	20
저알부민 혈증	44	3.2	47	4.0	49	1.1
AST 증가	28	3.1	24	2.0	37	3.6
ALT 증가	25	2.1	22	1.6	38	1.8
알칼리 인산 분해 효소 증가	25	2.1	27	1.2	33	1.1
고칼슘 혈증	22	4.6	16	4.3	13	2.6
저칼슘 혈증	22	1.1	32	4	58	7
고칼륨 혈증	21	2.8	27	4.3	29	4.3
저인산 혈증	20	5	35	12	48	19
저칼륨 혈증	19	5	34	12	47	15
크레아티닌 증가	18	1.1	36	2.3	27	2.2
저마그네슘 혈증	16	0.4	42	1.7	76	6
*시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약+화학요법제(235-266명), 이 약(241-288명) 및 세툭시맙+화학요법제(249-282명). †NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.						

마. 기타 암종

단독 요법

전형적 호지킨림프종, 요로상피암, MSI-H암, 직결장암 또는 신세포암의 수술 후 보조요법(adjuvant) 환자에서 발생한 이상사례는 흑색종이나 비소세포폐암 환자에서의 이상사례와 전반적으로 비슷하였다.

BCG-불응 고위험 비근침습성 방광암

이 약의 안전성은 고위험 비근침습성 방광암 환자 148명을 등록한 다기관, 공개라벨, 단일군 시험인 KEYNOTE-057에서 조사되었으며, 이 중 96명은 유두종 유무에 상관없이 상피내암을 동반한 BCG-불응이었다. 환자는 허용 불가능한 독성, 지속적 또는 재발성 고위험 비근침습성 방광암이거나 진행성 질환, 또는 질환의 진행 없이 최대 24개월까지 이 약 200mg을 매 3주 투약하였다. 이 약의 노출 기간 중앙값은 4.3개월(범위: 1일 ~ 25.6개월)이었다. 환자의 11%가 약물이상반응으로 이 약 투여를 중단하였다. 이 약의 영구 중단으로 이어진 가장 빈번한 약물이상반응 (>1%)은 폐염증(1.4%)이었다. 이 약의 일시 중단으로 이어진 약물이상반응은 환자의 22%에서 발생하였다; 2% 이상에서 보고된 가장 빈번한 약물이상반응은 설사(4%), 요로 감염(2%)이었다. 중대한 약물이상반응은 이 약을 투여 받은 환자의 28%에서 발생하였다. 이 약을 치료받은 환자에서 2% 이상으로 가장 빈번하게 보고된 중대한 약물이상반응은 폐렴(3%), 심허혈(2%), 결장염(2%), 폐 색전증(2%), 패혈증(2%), 그리고 요로 감염(2%)이었다. 표 12 및 13은 KEYNOTE-057에 참여해 이 약으로 치료받은 환자에서 발생한 약물이상반응 및 임상검사치 이상을 요약한 것이다.

표 12. 이 약을 투여받은 환자 중 10% 이상에서 발생한 약물이상반응 (KEYNOTE-057)

약물이상반응	이 약 200mg 매 3주에 1회 n=148	
	모든 등급* (%)	3-4등급 (%)
전신 장애		
피로†	29	0.7
말초 부종‡	11	0
위장관 장애		
설사§	24	2.0
오심	13	0
변비	12	0
피부 및 피하조직 장애		
발진¶	24	0.7
소양증	19	0.7
근골격계 및 결합조직 장애		
근골격 통증#	19	0
관절통	14	1.4
신장 및 요로계 장애		
혈뇨	19	1.4
호흡기, 흉부 및 종격동 장애		
기침Þ	19	0
감염		
요로 감염	12	2.0
비인두염	10	0
내분비 장애		
갑상선 저하증	11	0

*NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.

†무력증, 피로, 병감(권태)을포함한다.

‡말초 부종 및 말초 종창을 포함한다.

§설사, 위장염, 결장염을 포함한다.

¶반상-구진 발진, 발진, 홍반성 발진, 소양성 발진, 농포성 발진, 홍반, 습진, 건조 습진, 태선형 각화증, 두드러기, 피부염을 포함한다.

#등허리 통증, 근육통, 근골격 통증, 사지 통증, 근골격성 흉부 통증, 경부 통증을 포함한다.

Þ기침, 습성 기침을 포함한다.

표 13. 이 약을 투여받은 BCG-불응 비근침습성 방광암 환자 중 20% 이상에서 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 (KEYNOTE-057)

임상 검사*	이 약 200mg 매 3주에 1회	
	모든 등급† (%)	3-4 등급 (%)
화학적 검사		
고혈당증	59	8
ALT 증가	25	3.4
저나트륨 혈증	24	7
저인산 혈증	24	6

저알부민 혈증	24	2.1
고칼륨 혈증	23	1.4
저칼슘 혈증	22	0.7
AST 증가	20	3.4
크레아티닌 증가	20	0.7
혈액학적 검사		
빈혈	35	1.4
림프구 감소증	29	1.6
*시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약(124-147명) †NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.		

병용 요법

위암

HER2 양성 위암

이 약과 트라스투주맙 및 항암화학요법(플루오로피리미딘 및 백금)의 병용 요법으로 치료 받은 위암 환자 중 최소 20% 이상에서 보고되고, 위약과 트라스투주맙 및 항암화학요법(플루오로피리미딘 및 백금)의 병용 요법과의 발생률 차이가 2% 이상인 3-4등급 이상사례는 피로(4.6% vs. 2.6%)였다 (KEYNOTE-811).

표 14. 이 약을 투여받은 환자 중 20% 이상의 환자에서 발생한 이상사례 (KEYNOTE-811)

이상사례	이 약 200 mg 매 3주에 1회 + 트라스투주맙 + 플루오로피리미딘 및 백금 화학요법제 n=350		위약 + 트라스투주맙 + 플루오로피리미딘 및 백금 화학요법제 n=346	
	모든 등급*(%)	3-4등급(%)	모든 등급*(%)	3-4등급(%)
위장관 장애				
설사	52	10	46	8
오심	48	4.0	48	5
구토	32	4.9	29	3.2
대사 및 영양장애				
식욕 감소	31	3.7	32	4.0
신경계 장애				
말초 감각 신경 병증	24	3.7	21	2.0
전신 장애				
피로	23	4.6	22	2.6
피부 및 피하조직 장애				
손바닥-발바닥 홍반성 감각이상 증후군	23	1.4	22	1.4
임상검사				
체중 감소	21	2.0	17	1.2
*NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.				

표 15. 이 약을 투여 받은 환자 중 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 (KEYNOTE-811)

임상검사*	이 약 200 mg 매 3주에 1회 + 트라스투주맙 + 플루오로피리미딘 및 백금 화학요법제 n=350		위약 + 트라스투주맙 + 플루오로피리미딘 및 백금 화학요법제 n=346	
	모든 등급 (%)†	3-4 등급 (%)	모든 등급 (%)†	3-4 등급 (%)
혈액학적 검사				
빈혈	71	17	66	14
중성구 감소증	64	20	59	18
혈소판 수 감소	65	13	63	11
백혈구 수 감소	59	7	54	7
림프구 감소증	58	19	51	16
화학적 검사				
저알부민 혈증	56	2.9	52	3.9
고혈당증	51	7	56	6
AST 증가	52	4.9	51	3.0
저칼슘 혈증	55	3.5	45	2.4
ALT 증가	40	3.5	36	1.8
저칼륨 혈증	40	13	35	12
알칼리 인산 분해 효소 증가	39	2.9	39	4.2
저인산 혈증	33	10	34	10
저마그네슘 혈증	29	1.2	29	0.6
저나트륨 혈증	32	8	32	10
혈액 빌리루빈 증가	31	4.1	25	2.7
크레아티닌 증가	26	3.2	17	2.1

*시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약+트라스투주맙+플루오로피리미딘 및 백금 화학요법제(범위: 342-347명) 및 위약+트라스투주맙+플루오로피리미딘 및 백금 화학요법제(범위: 333-340명).
†NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.

HER2 음성 위암

이 약과 화학요법제(플루오로피리미딘 및 백금)를 병용 투여 받은 위암 환자 중 최소 20%에서 보고되고, 위약과 화학요법제(플루오로피리미딘 및 백금)의 병용 투여와 비교하였을 때 발생률 차이가 2% 이상인 3-4등급 이상사례는 다음과 같다: 빈혈(12% vs. 10%), 혈소판 수 감소(7% vs. 5%)(KEYNOTE-859).

식도암

이 약과 화학요법제(시스플라틴 및 5-FU)를 병용 투여로 치료받은 식도암 환자에서, 위약과 화학요법제(시스플라틴 및 5-FU) 병용 투여와 비교하였을 때 20% 이상의 환자에서 발생하고 2% 이상의 높은 발생율을 보인 3-5등급 약물이상반응은 다음과 같다: 구토 (7% vs. 5%), 구내염 (6% vs. 3.8%), 중성구 수 감소 (24.1% vs 17.3%), 백혈구 수 감소 (9.2% vs. 4.9%).

표 16 및 표 17은KEYNOTE-590에 참여해 이 약으로 치료 받은 환자에서의 약물이상반응과 임상검사치 이상을 요약한 것이다.

표 16. 이 약을 투여받은 환자 중 20% 이상의 환자에서 발생한 약물이상반응 (KEYNOTE-590)

약물이상반응	이 약 200 mg 매 3주에 1회 + 시스플라틴 + 플루오로우라실 n=370		위약 + 시스플라틴 + 플루오로우라실 n=370	
	모든 등급* (%)	3-4 등급† (%)	모든 등급* (%)	3-4 등급† (%)
위장관 장애				
오심	67	7	63	7
변비	40	0	40	0
설사	36	4.1	33	3
구토	34	7	32	5
구내염	27	6	26	3.8
전신 장애				
피로‡	57	12	46	9
대사 및 영양 장애				
식욕 감소	44	4.1	38	5
임상 검사				
체중 감소	24	3.0	24	5
*NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다. †각 투여군에서 설사가 치명적인 사례로 1건씩 보고되었다. ‡무력증, 피로를 포함한다.				

표 17. 이 약을 투여 받은 식도암 환자 중 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 (KEYNOTE-590)

임상검사*	이 약 200 mg 매 3주에 1회 + 시스플라틴 + 플루오로우라실		화학요법제 (시스플라틴 + 플루오로우라실)	
	모든 등급† (%)	3-4 등급 (%)	모든 등급† (%)	3-4 등급 (%)
혈액학적 검사				
빈혈	83	21	86	24
중성구 감소증	74	43	71	41
백혈구 감소증	72	21	73	17
림프구 감소증	55	22	53	18
혈소판 감소증	43	5	46	8
화학적 검사				
고혈당증	56	7	55	6
저나트륨 혈증	53	19	54	19
저알부민 혈증	52	2.8	52	2.3
크레아티닌 증가	45	2.5	42	2.5
저칼슘 혈증	44	3.9	38	2
저인산 혈증	37	9	31	10
저칼륨 혈증	30	12	34	15
알칼리 인산 분해 효소 증가	29	1.9	29	1.7
고칼륨 혈증	28	3.6	27	2.6
AST 증가	25	4.4	22	2.8
ALT 증가	23	3.6	18	1.7

*시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약+시스플라틴+플루오로우라실(345-365명) 및 위약+시스플라틴+플루오로우라실 (330-358명).
†NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.

신세포암

엑시티닙과의 병용 요법(KEYNOTE-426)

KEYNOTE-426에서 이 약과 엑시티닙의 병용 요법으로 치료받은 이전 치료 경험이 없는 신세포암 환자 중 20% 이상에서 보고된 가장 일반적인 이상사례는 설사, 피로/무력증, 고혈압, 갑상선 저하증, 식욕 감퇴, 간독성, 손바닥-발바닥 홍반 감각이상증, 오심, 구내염/점막 염증, 발성 장애, 발진, 기침, 변비였다.

표 18 및 19는KEYNOTE-426에 참여해 이 약과 엑시티닙 병용 요법으로 치료받은 환자 중 20% 이상에서 발생한 이상 사례 및 임상검사치 이상을 요약한 것이다.

표 18. 이 약과 엑시티닙을 함께 투여받은 환자 중 20% 이상에서 발생한 이상사례 (KEYNOTE-426)

	이 약 + 엑시티닙 n=429		수니티닙 n=425	
이상사례	모든 등급* (%)	3-4등급 (%)	모든 등급 (%)	3-4등급 (%)
위장관 장애				
설사†	56	11	45	5
오심	28	0.9	32	0.9
변비	21	0	15	0.2
전신 장애				
피로/무력증	52	5	51	10
심혈관 장애				
고혈압‡	48	24	48	20
간 장애				
간독성§	39	20	25	4.9
내분비 장애				
갑상선 저하증	35	0.2	32	0.2
대사 및 영양 장애				
식욕 감퇴	30	2.8	29	0.7
피부 및 피하조직 장애				
손바닥-발바닥 홍반 감각이상증	28	5	40	3.8
구내염/점막 염증	27	1.6	41	4
발진¶	25	1.4	21	0.7
호흡기, 흉부 및 종격동 장애				
발성 장애	25	0.2	3.3	0
기침	21	0.2	14	0.5

*NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.
†설사, 결장염, 장결장염, 위장염, 장염, 출혈성 장결장염을 포함한다.
‡고혈압, 혈압 상승, 고혈압성 위기, 불안정 고혈압을 포함한다.
§ALT증가, AST 증가, 자가면역성 간염, 혈중 빌리루빈 증가, 약물 유발성 간 손상, 간효소 증가, 간기능 이상, 간염, 전격성 간염, 간세포성 손상, 간독성, 고빌리루빈혈증, 면역-매개 간염, 간기능검사치 증가, 간 손상, 아미노전이효소 증가를 포함한다.
¶발진, 나비모양 발진, 피부염, 여드름양 피부염, 아토피피부염, 수포성 피부염, 접촉성 피부염,

박리성 피부염, 생식기 발진, 홍반성 발진, 전신발진, 황반성 발진, 반구진발진, 구진성 발진, 소양성 발진, 지루성 피부염, 피부 탈락, 피부 박리, 회음부 발진을 포함한다.

표 19. 이 약과 엑시티닙을 함께 투여받은 환자 중 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 (KEYNOTE-426)

	이 약 + 엑시티닙		수니티닙	
임상검사*	모든 등급† (%)	3-4 등급 (%)	모든 등급 (%)	3-4 등급 (%)
화학적 검사				
고혈당증	62	9	54	3.2
ALT 증가	60	20	44	5
AST 증가	57	13	56	5
크레아티닌 증가	43	4.3	40	2.4
저나트륨혈증	35	8	29	8
고칼륨혈증	34	6	22	1.7
저알부민혈증	32	0.5	34	1.7
고칼슘혈증	27	0.7	15	1.9
저인산혈증	26	6	49	17
ALP 증가	26	1.7	30	2.7
저칼슘혈증‡	22	0.2	29	0.7
혈중 빌리루빈 증가	22	2.1	21	1.9
활성화된 부분 트롬보플라스틴 시간 (aPTT) 연장§	22	1.2	14	0
혈액학적 검사				
림프구 감소증	33	11	46	8
빈혈	29	2.1	65	8
혈소판 감소증	27	1.4	78	14

*시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약+엑시티닙(342-425명) 및 수니티닙(345-422명).

†NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.

‡알부민으로 보정되었다.

§상승된 활성화된 부분 트롬보플라스틴 시간(aPTT) 연장을 보인 두 명의 3등급 환자에서 간독성 이상사례가 함께 보고되었다.

렌바티닙과의 병용 요법(KEYNOTE-581)

표 20은 KEYNOTE-581에 참여해 이 약과 렌바티닙 병용 요법으로 치료 받은 환자 중 20% 이상에서 발생한 이상사례를 요약한 것이다.

표 20. 이 약과 렌바티닙 병용 요법으로 치료 받은 환자 중 20% 이상에서 보고되고, 수니티닙 투여군 이상으로 많이 발생한 이상 사례

(두 군간 차이는 모든 등급에서 5% 이상 또는 3-4등급에서 2% 이상) (KEYNOTE-581)

	이 약 + 렌바티닙 n=352		수니티닙 n=340	
이상사례	모든 등급*(%)	3-4등급(%)	모든 등급*(%)	3-4등급(%)
위장관 장애				
설사	61	10	49	5
오심	36	2.6	33	0.6

구토	26	3.4	20	1.5
변비	25	0.9	19	0
복통	21	2.0	8	0.9
심혈관 장애				
고혈압	55	28	41	19
내분비 장애				
갑상선 저하증	47	1.4	26	0
대사 및 영양 장애				
식욕 감소	40	4.0	31	1.5
호흡기, 흉부 및 종격동 장애				
발성 장애	30	0	4.1	0
임상 검사				
체중 감소	30	8	9	0.3
신장 및 요로계 장애				
단백뇨	30	8	13	2.9
피부 및 피하조직 장애				
발진	27	3.7	14	0.6
근골격계 및 결합조직 장애				
관절통	28	1.4	15	0.3
신경계 장애				
두통	23	0.6	16	0.9

*NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.

자궁내막암

표 21과 표 22는 KEYNOTE-775에 참여해 이 약과 렌바티닙 병용 요법으로 치료받은 MSI-H 또는 dMMR이 없는 자궁내막암 환자 중 20%이상에서 발생한 이상사례와 임상검사치 이상을 요약한 것이다. KEYNOTE-146에서 이 약과 렌바티닙의 병용요법으로 치료받은 자궁내막암 환자들에서 보고된 이상사례는 일반적으로 KEYNOTE-775에서 보고된 것들과 유사하였다.

치명적인 약물이상반응은 이 약과 렌바티닙 병용요법군에서 4.7% 발생하였고 이는 폐렴 2건 및 급성 신 손상, 급성 심근 경색, 결장염, 식욕 감소, 장 천공, 하부 위장관 출혈, 악성 위장관 폐쇄, 다발성 장기 기능 부전 증후군, 골수 형성 이상 증후군, 폐 색전증, 우심실 기능 장애 1건이었다.

이 약과 렌바티닙을 병용 투여한 환자의 50%에서 중대한 약물이상반응이 발생하였다. 중대한 약물이상반응(3% 이상)은 고혈압(4.4%)과 요로감염(3.2%)이었다.

약물이상반응으로 인한 이 약의 투여 중단은 15%의 환자에게서 발생하였다. 이 약의 투여 중단으로 이어진 가장 흔한 약물이상반응(1% 이상)은 ALT 증가(1.2%)였다.

약물이상반응으로 인한 이 약의 투약 일시 중단은 48%의 환자에게서 발생하였다. 이 약의 투약 일시 중단을 초래한 가장 흔한 약물이상반응(3% 이상)은 설사(8%), ALT 증가(4.4%), AST 증가(3.8%), 고혈압(3.5%)이었다.

표 21. KEYNOTE-775의 자궁내막암 환자 중 20% 이상에서 보고된 약물이상반응

	MSI-H 또는 dMMR이 없는 자궁내막암			
약물이상반응	매 3주마다 이 약 200mg + 렌바티닙 n=342		독소루비신 또는 파클리탁셀 n=325	
	모든 등급* (%)	3-4 등급(%)	모든 등급* (%)	3-4 등급(%)
내분비 장애				
갑상선 저하증†	67	0.9	0.9	0

혈관 장애				
고혈압‡	67	39	6	2.5
출혈성 이상반응§	25	2.6	15	0.9
전신 장애				
피로¶	58	11	54	6
위장관 장애				
설사#	55	8	20	2.8
오심	49	2.9	47	1.5
구토	37	2.3	21	2.2
구내염Þ	35	2.6	26	1.2
복통ß	34	2.6	21	1.2
변비	27	0	25	0.6
근골격계 및 결합조직 장애				
근골격 장애à	53	5	27	0.6
대사 및 영양 장애				
식욕 감소è	44	7	21	0
임상 검사				
체중 감소	34	10	6	0.3
신장 및 요로계 장애				
단백뇨ð	29	6	3.4	0.3
감염				
요로감염ø	31	5	13	1.2
신경계 장애				
두통	26	0.6	9	0.3
호흡기, 흉부 및 종격동 장애				
발성 장애	22	0	0.6	0
피부 및 피하조직 장애				
손바닥-발바닥 홍반성 감각이상 증후군ý	23	2.9	0.9	0
발진£	20	2.3	4.9	0

*NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.

†갑상선 저하증, 혈액 갑상선 자극 호르몬 증가, 갑상선염, 이차 갑상선 저하증 포함

‡고혈압, 혈압 증가, 이차 고혈압, 혈압 이상, 고혈압 뇌 병증, 혈압 변동 포함

§비출혈, 질 출혈, 혈뇨, 치은 출혈, 부정 자궁 출혈, 직장 출혈, 타박상, 혈변 배설, 뇌출혈, 결막 출혈, 위장관 출혈, 객혈, 요로관 출혈, 하부 위장관 출혈, 입 출혈, 점상 출혈, 자궁 출혈, 항문 출혈, 혈액 수포, 눈 출혈, 혈종, 두 개 내 출혈, 출혈성 뇌졸중, 흑색변, 스토마 부위 출혈, 상부 위장관 출혈, 상처 출혈, 혈뇨 존재, 반상 출혈, 토혈, 피하 출혈, 간 혈종, 주사 부위 타박상, 장의 출혈, 후두 출혈, 폐출혈, 경막하 혈종, 제대에서의 출혈, 혈관 천자 부위 타박상 포함

¶피로, 무력증, 병감(권태), 기면 포함

#설사, 위장염 포함

Þ구내염, 점막 염증, 구인두 통증, 아프타성 궤양, 입 궤양 형성, 입술염, 구강 점막 홍반, 혀 궤양 형성 포함

ß복통, 상복부 통증, 하복부 통증, 복부 불편감, 위장관 통증, 복부 압통, 상복부의 불편감 포함

à관절통, 근육통, 등허리 통증, 사지 통증, 골 통증, 경부 통증, 근골격 통증, 관절염, 근골격성 흉부 통증, 근골격 경직, 비-심장성 흉통, 턱 통증

è식욕 감소, 조기 포만감 포함

ð단백뇨, 요단백 존재, 헤모글로빈뇨 포함

[ø]요로감염, 방광염, 신우신염 포함

[ÿ]손바닥-발바닥 홍반성 감각 이상 증후군, 손바닥 홍반, 발바닥 홍반 포함

[£]발진, 반상-구진 발진, 소양성 발진, 홍반성 발진, 반상 발진, 농포성 발진, 구진 발진, 소수포성 발진, 적용부위 발진포함

표 22. KEYNOTE-775의 자궁내막암 환자 중 20% 이상(모든 등급) 또는 3% 이상(3-4등급)에서 보고되고, 기저치*보다 악화된 임상검사치 이상

	MSI-H 또는 dMMR이 없는 자궁내막암			
임상검사[†]	매 3주마다 이 약 200mg + 렌바티닙 n=342		독소루비신 또는 파클리탁셀 n=325	
	모든 등급[‡] (%)	3-4 등급(%)	모든 등급[‡] (%)	3-4 등급(%)
화학적 검사				
고중성지방 혈증	70	6	45	1.7
저알부민 혈증	60	2.7	42	1.6
아스파르트산 아미노 전이 효소 증가	58	9	23	1.6
고혈당증	58	8	45	4.4
저마그네슘 혈증	53	6	32	3.8
알라닌 아미노 전이효소 증가	55	9	21	1.2
고콜레스테롤 혈증	53	3.2	23	0.7
저나트륨 혈증	46	15	28	7
알칼리 인산 분해 효소 증가	43	4.7	18	0.9
저칼슘 혈증	40	4.7	21	1.9
리파아제 증가	36	14	13	3.9
크레아티닌 증가	35	4.7	18	1.9
저칼륨 혈증	34	10	24	5
저인산 혈증	26	8	17	3.2
아밀라아제 증가	25	7	8	1
고칼륨 혈증	23	2.4	12	1.2
크레아틴 활성 효소 증가	19	3.7	7	0
빌리루빈 증가	18	3.6	6	1.6
혈액학적 검사				
림프구 감소증	50	16	65	20
혈소판 감소증	50	8	30	4.7
빈혈	49	8	84	14
백혈구 감소증	43	3.5	83	43
중성구 감소증	31	6	76	58

*기저치보다 적어도 1등급 이상 증가된 경우

[†]시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약/렌바티닙(범위:263-340명), 독소루비신 또는 파클리탁셀(범위:240-322명)

[‡]NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.

삼중음성 유방암

KEYNOTE-522: 고위험 조기 삼중음성 유방암 환자 대상의 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 및 수술 후 보조요법(adjuvant) 대조 임상시험

이 약을 투여받은 환자의 0.9%에서 다발성 장기 기능 부전, 심근 경색, 쇼크 및 원인 불명의 사망과 관련이 있는 자가 면역 뇌염, 폐렴, 폐염증, 폐 색전증, 그리고 패혈증을 포함한 치명적인 약물이상반

응이 발생하였다. 이 약을 투여받은 환자의 44%에서 중대한 약물이상반응이 발생하였으며, 2% 이상에서 발생한 중대한 약물이상반응은 발열성 중성구 감소증(15%), 발열(3.7%), 빈혈(2.6%), 그리고 중성구 감소증(2.2%)이다. 이 약의 일시 중단으로 이어진 가장 빈번한 약물이상반응(≥2%)은 중성구 감소증(26%), 혈소판 감소증(6%), ALT 증가(6%), AST 증가(3.7%), 빈혈(3.5%), 발진(3.2%), 발열성 중성구 감소증(2.8%), 백혈구 감소증(2.8%), 상기도 감염(2.6%), 발열(2.2%), 그리고 피로(2.1%)였다.

표 23 및 표 24는 KEYNOTE-522에 참여해 이 약으로 치료받은 환자에서 발생한 약물이상반응 및 임상검사치 이상을 각각 요약한 것이다.

표 23. 이 약을 투여 받은 환자 중 20% 이상의 환자에서 발생한 약물이상반응 (KEYNOTE-522)

약물이상반응	화학요법*과 병용하여 이 약 200 mg 매 3주에 1회 / 이 약 n=778		화학요법*과 병용하여 위약 / 위약 n=389	
	모든 등급†(%)	3-4 등급 (%)	모든 등급†(%)	3-4 등급 (%)
전신 장애				
피로‡	70	8	66	3.9
발열	28	1.3	19	0.3
위장관 장애				
오심	67	3.7	66	1.8
변비	42	0	39	0.3
설사	41	3.2	34	1.8
구내염§	34	2.7	29	1
구토	31	2.7	28	1.5
복통¶	24	0.5	23	0.8
피부 및 피하 조직 장애				
탈모	61	0	58	0
발진#	52	5	41	0.5
신경계 장애				
말초 신경 병증Þ	41	3.3	42	2.3
두통	30	0.5	29	1
근골격 및 결합 조직 장애				
관절통	29	0.5	31	0.3
근육통	20	0.5	19	0
호흡기, 흉곽 및 종격 장애				
기침β	26	0.1	24	0
대사 및 영양 장애				
식욕 감소	23	0.9	17	0.3
정신 장애				
불면	21	0.5	19	0

*화학요법: 카보플라틴 및 파클리탁셀에 이어 독소루비신 또는 에피루비신 및 사이클로포스파마이드

†NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.

‡무력증, 피로를 포함한다.

§아프타성 궤양, 입술염, 입술 통증, 입술 궤양 형성, 입 궤양 형성, 점막 염증, 구강 점막 발진, 구강 통증, 구내염, 혀 물집 형성, 혀 궤양 형성을 포함한다.

¶복부 불편감, 복통, 하복부 통증, 상복부 통증, 복부 압통을 포함한다.

#피부염, 여드름양 피부염, 알레르기성 피부염, 수포성 피부염, 전신 탈락 피부염, 약물 발진, 습

진, 절개 부위 발진, 주사 부위 발진, 발진, 홍반성 발진, 모낭성 발진, 반상 발진, 반상-구진 발진, 홍역양 발진, 구진 발진, 소양성 발진, 농포성 발진, 풍진양 발진, 피부 탈락, 피부 독성, 독성 피부 발진, 두드러기, 혈관염성 발진, 바이러스 발진을 포함한다.

[þ]말초 신경 병증, 운동 말초 신경 병증, 감각 운동 말초 신경 병증, 말초 감각 신경 병증을 포함한다.

[ß]기침, 습성 기침, 상-기도 기침 증후군을 포함한다.

표 24. 이 약을 투여 받은 환자 중 20% 이상의 환자에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 (KEYNOTE-522)

임상 검사*	화학요법†과 병용하여 이 약 200 mg 매 3주에 1회 / 이 약		화학요법†과 병용하여 위약 / 위약	
	모든 등급‡(%)	3-4 등급 (%)	모든 등급‡(%)	3-4 등급 (%)
혈액학적 검사				
빈혈	97	22	96	19
백혈구 감소증	93	41	91	32
중성구 감소증	88	62	89	62
림프구 감소증	80	28	74	22
혈소판 감소증	58	11	57	9
화학적 검사				
ALT 증가	71	9	69	4.6
AST 증가	66	6	58	1.8
고혈당증	65	5	62	2.8
알칼리 인산 분해 효소 증가	41	1	37	0.8
저나트륨 혈증	38	9	28	6
저알부민 혈증	36	1.2	30	1.5
저칼슘 혈증	32	3.2	29	4.4
저칼륨 혈증	32	6	24	2.8
저인산 혈증	23	6	18	4.5
고칼슘 혈증	21	3	24	3.4

*시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약과 화학요법 병용투여 후 이 약 단독투여 (범위: 759-777명), 위약과 화학요법 병용투여 후 위약 (범위: 378-389명).

†화학요법: 카보플라틴 및 파클리탁셀에 이어 독소루비신 또는 에피루비신 및 사이클로포스파마이드

‡NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.

KEYNOTE-355: 수술이 불가능한 국소 재발성 또는 전이성 삼중음성 유방암 환자 대상의 병용요법 대조 임상시험

이 약의 안전성은 전이 단계에서 이전에 화학요법을 받지 않은 수술이 불가능한 국소 재발성 또는 전이성 삼중음성 유방암 환자를 등록한 다기관, 이중맹검, 무작위화(2:1), 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-355에서 파클리탁셀, 알부민결합 파클리탁셀 또는 젬시타빈 및 카보플라틴과의 병용요법으로 조사되었다(14.임상시험 정보 항 참고). 총 596명의 환자(안전성 준비기간 내 34명 포함)는 파클리탁셀, 알부민결합 파클리탁셀 또는 젬시타빈 및 카보플라틴과의 병용요법으로 이 약 200mg을 매 3주 투약하였다.

심폐-정지(0.7%)와 패혈성 쇼크(0.3%)를 포함하는 치명적 약물이상반응은 이 약과 화학요법제를 병용한 환자의 2.5%에서 발생하였다.

중대한 약물이상반응은 이 약과 파클리탁셀, 알부민결합 파클리탁셀 또는 젬시타빈 및 카보플라틴을

병용한 환자의 30%에서 발생하였다. 환자의 2% 이상 발생한 중대한 약물이상반응은 폐렴 (2.9%), 빈혈 (2.2%), 그리고 혈소판 감소증 (2%)이었다.

환자의 11%가 약물이상반응으로 이 약 투여를 중단하였다. 이 약의 영구 중단으로 이어진 가장 빈번한 약물이상반응 (≥1%)은 ALT 증가 (2.2%), AST 증가 (1.5%), 그리고 폐염증 (1.2%)이었다. 이 약의 일시 중단으로 이어진 약물이상반응은 환자의 50%에서 발생하였다. 이 약의 일시 중단으로 이어진 가장 빈번한 약물이상반응(≥2%)은 중성구 감소증 (22%), 혈소판 감소증 (14%), 빈혈 (7%), ALT 증가 (6%), 백혈구 감소증 (5%), AST 증가 (5%), 백혈구 수 감소 (3.9%), 그리고 설사(2%)였다.

표 25 및 26은KEYNOTE-355에 참여해 이 약으로 치료받은 환자에서 발생한 약물이상반응 및 임상검사치 이상을 요약한 것이다.

표 25. 이 약과 화학요법제를 투여받은 환자 중 20% 이상의 환자에서 발생한 약물이상반응 (KEYNOTE-355)

약물이상반응	이 약 200mg 매 3주에 1회 + 화학요법제 n=596		위약 매 3주에 1회 + 화학요법제 n=281	
	모든 등급* (%)	3-4 등급(%)	모든 등급* (%)	3-4 등급(%)
전신 장애				
피로†	48	5	49	4.3
위장관 장애				
오심	44	1.7	47	1.8
설사	28	1.8	23	1.8
변비	28	0.5	27	0.4
구토	26	2.7	22	3.2
피부 및 피하 조직 장애				
탈모증	34	0.8	35	1.1
발진‡	26	2	16	0
호흡기, 흉곽 및 종격 장애				
기침§	23	0	20	0.4
대사 및 영양 장애				
식욕 감소	21	0.8	14	0.4
신경계 장애				
두통¶	20	0.7	23	0.7

*NCI CTCAE v4.03 에 따라 등급을 매겼다.

†피로, 무력증을 포함한다.

‡발진, 반상-구진 발진, 소양성 발진, 농포성 발진, 반상 발진, 구진 발진, 나비 모양 발진, 홍반성 발진, 눈꺼풀 발진을 포함한다

§기침, 습성 기침, 상-기도 기침 증후군을 포함한다.

¶두통, 편두통, 긴장성 두통을 포함한다.

표 26. 이 약과 화학요법제를 투여 받은 환자 중 20% 이상에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 (KEYNOTE-355)

임상 검사	이 약 200mg 매 3주에 1회 + 화학요법제	위 약 매 3주에 1회 + 화학요법제

	모든 등급† %	3-4 등급 %	모든 등급† %	3-4 등급 %
혈액학적 검사				
빈혈	90	20	85	19
백혈구 감소증	85	39	86	39
중성구 감소증	76	49	77	52
림프구 감소증	70	26	70	19
혈소판 감소증	54	19	53	21
화학적 검사				
ALT 증가	60	11	58	8
AST 증가	57	9	55	6
고혈당증	52	4.4	51	2.2
저알부민 혈증	37	2.2	32	2.2
알칼리 인산 분해 효소 증가	35	3.9	39	2.2
저칼슘 혈증	29	3.3	27	1.8
저나트륨 혈증	28	5	26	6
저인산 혈증	21	7	18	4.8
저칼륨 혈증	20	4.4	18	4.0

*시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약+화학요법제 (범위: 566 - 592 명), 위약 + 화학요법제 (범위: 269 -280명).

†NCI CTCAE v4.03에 따라 등급을 매겼다.

자궁경부암

화학방사선요법(CRT)(시스플라틴 및 외부 빔 방사선 요법[EBRT] 후 근접치료[BT])과 병용한 이 약의 안전성은 FIGO 2014 Ⅲ-IVA기 자궁경부암 환자 594명을 포함한 임상시험인 위약 대조, 무작위(1:1), 다기관, 이중 맹검 임상시험 KEYNOTE-A18에서 조사되었다. 총 292명의 환자가 이 약을 화학방사선요법과 병용하여 투여받았으며 총 302명의 환자가 위약을 화학방사선요법과 병용하여 투여받았다.

이 약의 노출 중앙값은 12.1개월(범위: 1일-27개월)이었다.

치명적인 이상사례는 이 약과 화학방사선요법을 병용하여 투여받은 환자의 1.4%에서 발생하였고, 대장 천공, 요로성 패혈증, 패혈증 및 질 출혈 각각 1건씩(0.3%)을 포함하였다.

중대한 이상사례는 이 약과 화학방사선요법을 병용하여 투여받은 환자의 30%에서 발생하였다. 환자의 1% 이상에서 발생한 중대한 이상사례는 요로 감염(2.7%), 요로성 패혈증(1.4%) 및 패혈증(1%)을 포함하였다.

이상사례로 인한 이 약의 투여중단은 환자의 7%에서 발생하였다. 영구적인 투여중단을 야기한 가장 빈번한 이상사례(≥1%)는 설사(1%)이었다.

이상사례로 인한 이 약의 일시 중단은 환자의 43%에서 발생하였다; 일시적인 투여중단을 야기한 가장 빈번한 이상사례 (≥2%)는 빈혈(8%), COVID-19(6%), SARS-CoV-2 시험 양성(3.1%), 중성구 수 감소(2.7%), 설사(2.7%), 요로 감염(2.7%) 및 ALT 증가(2.4%)이었다.

표 27 및 표 28은 KEYNOTE-A18에서 이 약으로 치료받은 환자에서 발생한 이상사례와 임상검사치 이상을 각각 요약한 것이다.

표 27. 이 약을 투여받은 FIGO 2014 Ⅲ-IVA기 자궁경부암 환자 중 10% 이상의 환자에서 발생한 이상사례(KEYNOTE-A18)

이상사례	화학방사선요법과 이 약 매 3주마다 200 mg 병용 및 이 약 매 6주마다 400 mg	화학방사선요법과 위약

	n=292		n=302	
	모든 등급* (%)	3-4등급(%)	모든 등급* (%)	3-4등급(%)
위장관 장애				
오심	56	0	61	2.3
설사	50	3.8	50	4.3
구토	33	1	34	1.7
변비	18	0	18	0.7
복통	12	0.7	12	1.7
감염				
요로 감염†	32	4.1	31	4.6
전신 장애				
피로‡	26	1	27	1.3
발열	12	0.3	13	0
내분비 장애				
갑상선 저하증§	20	0.7	5	0
갑상선 항진증	11	0.3	2.6	0
대사 및 영양 장애				
식욕 감소	17	0.7	17	0.3
임상 검사				
체중 감소	17	1.4	18	1
신장 및 요로계 장애				
배뇨 곤란	11	0.3	12	0
피부 및 피하조직 장애				
발진¶	11	0.7	7	0.3
생식계 장애				
골반 통증	10	1	13	1.3

* NCI CTCAE v5.0에 따라 등급을 매겼다.

† 요로 감염, 슈도모나스 요로 감염, 급성 신우신염, 방광염, 대장균 요로 감염을 포함한다.

‡ 피로, 무력증을 포함한다.

§ 갑상선 저하증, 자가 면역성 갑상선 저하증을 포함한다.

¶ 다형성 홍반, 피부염, 약물 발진, 습진, 발진, 피부 탈락, 수포성 피부염, 반상-구진 발진, 편평 태선, 발한 이상 습진, 여드름양 피부염을 포함한다.

표 28. 이 약을 투여받은 FIGO 2014 Ⅲ-IVA기 자궁경부암 환자 중 20% 이상의 환자에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상(KEYNOTE-A18)

임상검사*	화학방사선요법과 이 약 매 3주마다 200 mg 병용 및 이 약 매 6주마다 400 mg n=292		화학방사선요법과 위약 n=302	
	모든 등급† (%)	3-4등급(%)	모든 등급† (%)	3-4등급(%)
혈액학적 검사				
림프구 감소증	99	96	99	92
백혈구 감소증	96	46	94	49
빈혈	88	31	81	25
중성구 감소증	75	32	74	33

혈소판 감소증	65	8	61	6
화학적 검사				
저마그네슘 혈증	59	4.2	63	3.4
저나트륨 혈증	54	3.8	47	4
AST 증가	45	1	39	1.7
ALT 증가	44	2.1	44	1
저칼슘 혈증	43	4.8	40	4.3
저칼륨 혈증	42	14	38	10
크레아티닌 증가	41	6	43	6
저알부민 혈증	37	0.7	35	1.7
알칼리 인산 분해 효소 증가	34	0.3	33	0.3

* 각 항목에 대해 시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 기저치 이후 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약+화학방사선요법 (범위: 286-291명), 위약+화학방사선요법 (범위: 298-300명).

† NCI CTCAE v5.0에 따라 등급을 매겼다.

이전에 항암화학요법 치료 경험이 없는 지속성, 재발성 또는 전이성 자궁경부암 환자를 대상으로 이 약 또는 위약을 베바시주맙을 포함하거나 포함하지 않은 항암화학요법과 병용한 다기관, 이중 맹검, 무작위 배정(1:1) 임상시험인 KEYNOTE-826에서 조사되었다. 총 616명의 환자가 이 약 200mg과 항암화학요법(n=307) 또는 위약과 항암화학요법(n=309)을 매 3주마다 투여 받았다.

치명적인 약물이상반응은 이 약과 베바시주맙을 포함하거나 포함하지 않는 항암화학요법의 병용요법군에서 4.6% 발생하였고 이는 출혈 3건, 패혈증 2건, 원인 불명 2건을 포함하여, 급성 심근 경색, 자가 면역 뇌염, 심정지, 뇌혈관 사고, 수술 후 폐 색전을 동반한 대퇴골 골절, 장 천공 및 골반 감염 각 1건씩이었다.

중대한 약물이상반응은 이 약과 베바시주맙을 포함하거나 포함하지 않는 항암화학요법의 병용요법군에서 50% 발생하였다. 환자의 3% 이상에서 발생한 중대한 약물이상반응은 발열성 중성구 감소증(6.8%), 요로 감염(5.2%), 빈혈(4.6%), 급성 신 손상(3.3%) 및 패혈증(3.3%)이었다. 표 29 및 30은 KEYNOTE-826에서 이 약으로 치료받은 환자에서 발생한 약물이상반응 및 임상검사치 이상을 요약한 것이다.

표 29. 이 약을 투여받은 환자 중 20% 이상의 환자에서 발생한 약물이상반응(KEYNOTE-826)

약물이상반응	매 3주마다 이 약 200mg + 항암화학요법* (±베바시주맙) n=307		위약 + 항암화학요법* (±베바시주맙) n=309	
	모든 등급† (%)	3-4등급 (%)	모든 등급† (%)	3-4등급 (%)
신경계 장애				
말초 신경 병증‡	58	4.2	57	6
피부 및 피하 조직 장애				
탈모	56	0	58	0
발진§	22	3.6	15	0.3
전신 장애				
피로¶	47	7	46	6

위장관 장애				
오심	40	2	44	1.6
설사	36	2	30	2.6
변비	28	0.3	33	1
구토	26	2.6	27	1.9
근골격 및 결합 조직 장애				
관절통	27	0.7	26	1.3
혈관 장애				
고혈압	24	9	23	11
감염				
요로 감염	24	9	26	8

*항암화학요법(파클리탁셀과 시스플라틴 또는 파클리탁셀과 카보플라틴)

†NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.

‡말초 신경 병증, 말초 감각 신경 병증, 말초 운동 신경 병증, 감각 운동 말초 신경 병증, 지각 이상을 포함한다.

§발진, 반상-구진 발진, 홍반성 발진, 반상 발진, 구진 발진, 소양성 발진, 농포성 발진을 포함한다

¶피로, 무력증을 포함한다.

표 30. 이 약을 투여받은 환자 중 20% 이상의 환자에서 발생한 기저치보다 악화된 임상검사치 이상 (KEYNOTE-826)

임상검사*	매 3주마다 이 약 200mg + 항암화학요법†(±베바시주맙) n=307		위약 + 항암화학요법†(±베바시주맙) n=309	
	모든 등급‡ (%)	3-4등급 (%)	모든 등급‡ (%)	3-4등급 (%)
혈액학적 검사				
빈혈	80	35	77	33
백혈구 감소증	76	27	69	19
중성구 감소증	66	39	58	31
림프구 감소증	61	33	56	33
혈소판 감소증	57	19	53	15
화학적 검사				
고혈당증	51	4.7	46	2.3
저알부민 혈증	46	1.3	38	5
저나트륨 혈증	40	14	38	11
ALT 증가	40	7	38	6
AST 증가	40	6	36	3.0
알칼린 인산 분해 효소 증가	38	3.4	40	2.3
저칼슘 혈증	37	4.0	31	5
크레아티닌 증가	34	5	32	6
저칼륨 혈증	29	7	26	7
고칼륨 혈증	23	3.7	27	4.7
고칼슘 혈증	21	1.0	20	1.3

*시험 기저치가 확인되고 최소 1회 이상 임상검사치 측정이 가능했던 환자에 대해 각 시험별 발생률을 계산하였다: 이 약+항암화학요법 (범위: 297 - 301 명), 위약 + 항암화학요법 (범위: 299 -302명).

†항암화학요법(파클리탁셀과 시스플라틴 또는 파클리탁셀과 카보플라틴)

‡NCI CTCAE v4.0에 따라 등급을 매겼다.

담도암

이 약과 젬시타빈 및 시스플라틴과의 병용요법에 대한 안전성은 이전에 진행성 질환에 대한 전신 치료 경험이 없는 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 담도암 환자를 대상으로 한 다기관, 이중맹검, 무작위 배정, 위약 대조연구 임상시험인 KEYNOTE-966에서 조사되었다. 총 1,063명의 환자가 이 약 200mg과 젬시타빈 및 시스플라틴(n=529) 또는 위약과 젬시타빈 및 시스플라틴(n=534)을 매 3주마다 투여 받았다. 이 약에 대한 노출기간 중앙값은 6개월(범위: 1일-28개월)이었다.

약물이상반응으로 인한 이 약의 투여중단은 환자의 15%에서 발생하였다. 영구적인 투여중단을 야기한 가장 빈번한(≥1%) 약물이상반응은 폐염증(1.3%) 이었다. 약물이상반응으로 인한 이 약의 일시 중단은 환자의 55%에서 발생하였다. 일시적인 투여중단을 야기한 가장 빈번한(≥2%) 약물이상반응 또는 임상검사치 이상은 호중구 수 감소(18%), 혈소판 수 감소(10%), 빈혈(6%), 백혈구 수 감소(4%), 발열(3.8%), 피로(3.0%), 담관염(2.8%). ALT 증가(2.6%), AST 증가(2.5%), 및 담도 폐쇄(2.3%)였다.

이 약과 항암화학요법의 병용투여와 위약과 항암화학요법의 병용 투여를 비교하였을 때, 이 약 투여 환자와 위약 투여 환자 간에 5% 이상의 발생률 차이를 보인 약물이상반응은 발열 (26% vs. 20%), 발진 (21% vs. 13%), 소양증 (15% vs. 10%) 및 갑상선 저하증 (9% vs. 2.6%)였다. 두 군 간에 3-4등급 독성의 발생률에는 임상적으로 의미 있는 차이가 확인되지 않았다. 이 약과 항암화학요법 병용 투여 환자와 위약과 항암화학요법 병용 투여 환자 간에 5% 이상의 발생률 차이를 보인 임상검사치 이상은 림프구 감소(69% vs. 61%)였다. 두 군 간에 3-4등급 독성의 발생률에는 임상적으로 의미 있는 차이가 확인되지 않았다.

2) 시판 후 이상사례

이 약의 시판 후 사용 동안 아래와 같은 이상사례가 확인되었다. 이러한 이상사례는 불특정한 인구에서 자발적으로 보고되었기 때문에 발생빈도를 확실히 추정하거나 이 약 노출과의 상관관계를 확립하기 어렵다.

- 눈 장애: 보그트-고야나기-하라다 증후군
- 면역계 장애: 혈구 탐식성 림프 조직구증
- 신경계 장애: 시신경염

3) 면역-매개 약물이상반응

흑색종 및 비소세포폐암 환자 2799명에 대한 면역-매개 약물이상반응을 제시하였다. 두 암종 간 안전성 프로파일은 유사하였다. 표 31에 이 약을 투여한 환자에서 확인된 면역-매개 약물이상반응을 등급에 따라 정리하였다.

표 31. 면역-매개 약물이상반응

	이 약 2 mg/kg 매 3주에 1회 또는 10 mg/kg 매 2주 또는 3주에 1회 n=2799				
약물이상반응	모든 등급(%)	2등급(%)	3등급(%)	4등급(%)	5등급(%)
갑상선 저하증*	8.5	6.2	0.1	0	0
갑상선기능항진증†	3.4	0.8	0.1	0	0
폐염증‡	3.4	1.3	0.9	0.3	0.1
결장염	1.7	0.4	1.1	<0.1	0
부신 부전	0.8	0.3	0.3	<0.1	0
간염	0.7	0.1	0.4	<0.1	0
뇌하수체염	0.6	0.2	0.3	<0.1	0

신장염§	0.3	0.1	0.1	<0.1	0
제 1형 당뇨병	0.2	<0.1	0.1	0.1	0

*이 약을 단독 요법으로 투여받은 두경부 편평상피세포암 환자(n=909)에 대한 개별 연구에서 갑상선 저하증의 발생률은 16.1%(모든 등급)였으며, 3등급의 발생률은 0.3%였다. 이 약을 백금 및 5-FU화학요법제와 병용 요법으로 투여받은 두경부 편평상피세포암 환자(n=276)에서 갑상선 저하증의 발생률은 15.2%(1등급 또는 2등급)였다. 전형적 호지킨림프종 환자(n=389)에서 갑상선 저하증의 발생률은 17%(1등급 또는 2등급)였다. 이 약을 단독 요법으로 투여받은 절제술을 시행한 신세포암 환자(n=488)에 대한 보조요법 연구에서 갑상선 저하증의 발생률은 21%(모든 등급)였으며, 3등급의 발생률은 0.2%였다.

†이 약을 단독 요법으로 투여받은 절제술을 시행한 신세포암 환자(n=488)에 대한 보조요법 연구에서 갑상선기능항진증의 발생률은 12%(모든 등급)였으며, 3등급의 발생률은 0.2%였다.

‡이 약을 단독으로 투여받은 전형적 호지킨 림프종 환자에서 폐염증(모든 등급)의 발생률은 KEYNOTE-087(n=210)과 KEYNOTE-204(n=148)에서 각각 5.2%~10.8%의 범위를 나타냈다.

§이 약 200mg과 페메트렉시드 및 백금 화학요법제를 병용하여 투여받은 비편평 비소세포폐암 환자(n=405)에서 신장염의 발생률은 1.7%(모든 등급)였으며, 3등급의 발생률은 1.0%, 4등급의 발생률은 0.5%였다.

내분비병증

부신 부전이 발병하는 시간의 중앙값은 5.3개월(범위: 26일 ~ 16.6개월)이었다. 지속기간의 중앙값은 아직 도달하지 않았다(범위: 4일 ~ 1.9+년). 부신 부전으로 인해 이 약을 중단한 환자는 1명(<0.1%)이었다. 5명의 환자는 부신 부전 증상으로부터 회복하였다. 뇌하수체염이 발병하는 시간의 중앙값은 3.7개월(범위 : 1일 ~ 11.9개월)이었다. 지속기간의 중앙값은 4.7개월(범위 : 8+일 ~ 12.7+개월)이었다. 뇌하수체염으로 인해 이 약을 중단한 환자는 4명(0.1%)이었다. 7명의 환자는 뇌하수체염 증상으로부터 회복하였다. 갑상선기능항진증이 발병하는 시간의 중앙값은 2.1개월(범위: 3일 ~ 15.0+개월)이었다. 지속기간의 중앙값은 1.8개월(범위: 1일 ~ 12.8개월)이었다.

갑상선기능항진증으로 인해 이 약을 중단한 환자는 2명(<0.1%)이었다. 71명의 환자는 갑상선기능항진증 증상으로부터 회복하였다. 갑상선 저하증이 발병하는 시간의 중앙값은 3.5개월(범위: 1일 ~ 18.9개월)이었다. 지속기간의 중앙값은 아직 도달하지 않았다(범위: 2일 ~ 27.7+개월). 갑상선 저하증으로 이 약을 중단한 환자는 1명(<0.1%)이었다.

폐염증

폐염증이 발병하는 시간의 중앙값은 3.3개월(범위: 2일 ~ 19.3개월)이었다. 지속기간의 중앙값은 1.5개월(범위: 1일 ~ 17.2+개월)이었다. 폐염증으로 인해 이 약을 중단한 환자는 36명(1.3%)이었다. 55명의 환자는 폐염증 증상으로부터 회복하였다.

결장염

결장염이 발병하는 시간의 중앙값은 3.5개월(범위: 10일 ~ 16.2개월)이었다. 지속기간의 중앙값은 1.3개월(범위: 1일 ~ 8.7+개월)이었다. 결장염으로 인해 이 약을 중단한 환자는 15명(0.5%)이었다. 41명의 환자는 결장염 증상으로부터 회복하였다.

간염

간염이 발병하는 시간의 중앙값은 1.3개월(범위: 8일 ~ 21.4개월)이었다. 지속기간의 중앙값은 1.8 개월(범위: 8일 ~ 20.9+개월)이었다. 간염으로 인해 이 약을 중단한 환자는 6명(0.2%)이었다. 15명의 환자는 간염 증상으로부터 회복하였다.

신장염

신장염이 발병하는 시간의 중앙값은 5.1개월(범위: 12일 ~ 12.8개월)이었다. 지속기간의 중앙값은 3.3개월(범위: 12일 ~ 8.9+개월)이었다. 신장염으로 인해 이 약을 중단한 환자는 3명(0.1 %)이었다. 5명의

환자는 신장염 증상으로부터 회복하였다.

4) 면역원성

이 약 2 mg/kg을 매 3주마다 투여하거나 200 mg을 매 3주마다 투여하거나 10 mg/kg을 매 2주 또는 3주마다 투여한 임상시험에 참여한 환자 중에서 이 약 치료 중 항약물항체 존재 여부를 평가한 2034명의 환자 중 36명(1.8%)에게서 양성이 보고되었고, 이 중 9명(0.4%)의 환자에서는 펨브롤리주맙에 대한 중화 항체가 양성이었다. 항-펨브롤리주맙 결합 또는 중화 항체 발생에 따라 약동학 또는 안전성 프로파일이 변경된다는 증거는 확인되지 않았다.

5) 재심사에 따른 국내 시판 후 조사결과

국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 흑색종, 비소세포폐암, 두경부암, 전형적 호지킨 림프종(성인 및 2세 이상 소아), 요로상피암, 신세포암(렌바티닙과의 병용요법 제외). 고빈도-현미부수체 불안정성 암(직결장암 포함), 삼중음성유방암, 식도암 환자 1,563명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 51.06%(798/1,563명, 총 1,774건)로 보고되었다. 이 중 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 및 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였다.

		중대한 약물이상반응 16.06% (251/1,563명, 327건)	예상하지 못한 약물이상반응 14.33% (224/1,563명, 302건)
드물게 (0.1% 미만)	감염 및 기생충 감염	인플루엔자, 비정형 폐렴, 간균 감염, 모세기관지염, 클로스트리듐 디피실레 감염, 위장 감염, 클레브시엘라 감염, 대장 감염, 결핵 수막염. 미코박테리움 아비움 복합체 감염, 식도 칸디다증, 안와 주위 농양, 복막염, 사람 폐포자충 폐렴, 난관염, 요로 감염, 바이러스 감염	인플루엔자, 족 백선, 무증상 세균뇨, 간균 감염, 모세기관지염, 칸디다 감염, 간흡충증, 클로스트리듐 디피실레 감염, 위장 감염, 치은염, 단순 포진, 클레브시엘라 감염, 대장 감염, 결핵 수막염, 미코박테리움 아비움 복합체 감염, 고막염, 식도 칸디다증, 중이염, 안와 주위 농양, 복막염, 사람 폐포자충 폐렴, 난관염, 바이러스 혈증
	호흡기, 흉곽 및 종격 장애	흉막 삼출, 만성 폐쇄성 폐 질환, 기흉, 천식, 가래 잔류, 상기도 폐쇄	만성 폐쇄성 폐 질환, 기흉, 천식, 가래 잔류, 상기도 폐쇄
	대사 및 영양 장애	섭식 저하, 당뇨성 케톤산증, 악액질, 저나트륨 혈증	악액질, 통풍
	각종 위장관 장애	복통, 변비, 하복부 통증, 연하 곤란, 위궤양, 면역-매개 소장 결장염, 장 천공	입 건조, 위 궤양, 설통, 면역-매개 소장 결장염, 입술 통증, 식도 통증, 직장염, 혀 부종
	전신 장애 및 투여 부위 병태	사망, 다발성 장기 기능 부전 증후군, 오한, 전신 건강 상태 악화, 자기-관리 장애, 말초 부종, 통증, 종창	전신 건강 상태 악화, 오한, 사망, 염발음(비빔 소리), 열감, 자기-관리 장애, 주입 부위 정맥염, 종창, 갈증
	각종 신경계 장애	반신 불완전 마비, 벨 마비, 뇌부종, 뇌혈관 사고, 치매, 어지러움, 두개 내압 증가, 실신	반신 불완전 마비, 벨 마비, 뇌부종, 뇌혈관 사고, 치매, 두개 내압 증가, 신경통, 감각 장애, 실신
	각종 심장 장애	심정지, 심인성 쇼크, 심근염, 심장막염	방실 차단, 심정지, 심인성 쇼크, 심장막염, 심실 위 빈맥
	근골격 및 결합 조직 장애	근육통,	옆구리 통증, 근육 쇠약, 회전 근개 증후군, 서혜부 통증, 척추 내 추간판 돌출, 요추 척추관 협착, 근막 통증 증후군, 골다공증, 발바닥 근막염, 척추관 협착

	간담도 장애	담관염, 담낭염, 담석증	담관염, 담낭염, 담석증
	신장 및 요로 장애	질소 혈증, 출혈성 방광염, 신장염, 요관 결석증	질소 혈증, 출혈성 방광염, 독성 신장 병증, 야간뇨, 요관 결석증
	혈액 및 림프계 장애	중성구 감소증, 혈구 감소증, 혈소판 감소증	백혈구증, 혈구 감소증
	손상, 중독 및 시술 합병증	대퇴골경 골절, 척추 압박 골절, 경추 골절	대퇴골경 골절, 척추 압박 골절, 경추 골절, 쇄골 골절
	양성, 악성 및 상세 불명의 신생물(낭종 및 용종 포함)	급성 골수 단핵구성 백혈병, 유방암, 유두양 갑상선암	급성 골수 단핵구성 백혈병, 유방암, 지방종, 유두양 갑상선암, 지루 각화
	각종 눈 장애	백내장, 맥락 망막 병증, 시신경 유두 부종	백내장, 시각 장애, 안검염, 맥락 망막 병증, 각막 미란, 눈 장애, 눈 부종, 눈 통증, 시신경 유두 부종, 유리체 부유물
	피부 및 피하 조직 장애	수포성 출혈성 피부병, 피부염, 수포성 피부염, 소양증	피부 궤양, 수포성 출혈성 피부병, 손 피부염, 다한증, 색소 침착 장애, 딱지, 피부 병변, 피부 독성
	각종 정신 장애	섬망, 정신 상태 변화	섬망, 혼돈 상태, 적응 장애, 눈맞춤 감소, 정신 상태 변화
	임상 검사	혈액 빌리루빈 증가, 혈압 증가	혈액 갑상선 자극 호르몬 감소, 혈액 요소 증가, 체액 균형 양성, 림프구 백분율 증가, 산소 포화도 감소
	각종 혈관 장애	심부 정맥 혈전증, 말초 동맥 폐색성 질환	심부 정맥 혈전증, 저혈압, 말초 동맥 폐색성 질환, 정맥염
	귀 및 미로 장애		귀지떡, 외이 염증, 청각 저하
	각종 내분비 장애	애디슨병, 뇌하수체염, 이차 부신 피질부전, 갑상선염	애디슨병
때때로 (0.1~ 5% 미만)	감염 및 기생충 감염	폐렴, 흡인성 폐렴, 패혈성 쇼크, 연조직염, 충수염	대상 포진, 구강 칸디다증, 기관지염, 치주염, 연조직염, 충수염, 손발톱 진균증, 손발톱 주위염, 바이러스 감염
	호흡기, 흉곽 및 종격 장애	간질성 폐 질환, 호흡 곤란, 폐염증, 폐색전증, 객혈, 급성 호흡 곤란 증후군, 면역-매개 폐 질환, 기질성 폐렴	흉막 삼출, 간질성 폐 질환, 콧물, 딸꾹질, 급성 호흡 곤란 증후군, 기질성 폐렴
	대사 및 영양 장애	1형 및 2형 당뇨병, 저칼륨 혈증, 고칼륨 혈증, 식욕 감소	섭식 저하, 2형 당뇨병, 이상 지질 혈증
	각종 위장관 장애	설사, 장폐색증, 구토, 오심, 급성 췌장염	소화 불량, 위 식도 역류 질환, 위염, 복부 팽창, 장폐색증, 비감염성 타액선염, 구강 통증, 급성 췌장염
	전신 장애 및 투여 부위 병태	무력증, 발열, 피로	흉통, 전신 부종, 안면 부종, 통증, 한랭감
	각종 신경계 장애	말초 신경 병증, 뇌경색, 두통	지각 이상, 뇌경색
	각종 심장 장애	심방세동, 심장막 삼출	심방세동, 심장막 삼출
	근골격 및 결	사지 통증, 근육염, 횡문근 융해	골관절염, 횡문근 융해

	합 조직 장애		
	간담도 장애	간염, 급성 담낭염	급성 담낭염
	신장 및 요로 장애	급성 신 손상, 신부전	배뇨 곤란, 빈뇨, 신부전
	혈액 및 림프계 장애	빈혈	
	피부 및 피하 조직 장애		건성 피부
	각종 정신 장애		불안, 우울증, 불안 장애
	임상 검사		C-반응 단백질 증가, 백혈구 수 증가, 혈소판 수 감소
	귀 및 미로 장애		체위성 현훈
	각종 내분비 장애	갑상선 저하증, 부신 부전, 갑상선 항진증	
	생식계 및 유방장애		양성 전립선 과형성

6) 국내 시판 후 수집된 중대한 이상사례 분석 · 평가 결과 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
감염 : 폐렴(pneumonia)
근골격 및 결합조직계 : 횡문근 융해(가로무늬근 융해)

4. 일반적 주의
1) 면역-매개 약물이상반응
이 약 투여 환자에서 중증인 사례와 치명적인 사례를 포함한 면역-매개 약물이상반응이 발생한 바 있다. 면역-매개 약물이상반응은 치료를 중단한 이후에도 발생할 수 있다. 임상 연구들에서는 면역-매개 약물이상반응의 대부분이 가역적이고 이 약 투여 일시 중단, 코르티코스테로이드 투여 및/또는 보조 치료 투여로 관리 가능했다. 하나 이상의 조직에 영향을 미치는 면역-매개 약물이상반응이 동시에 발생할 수 있다.
의심되는 면역-매개 약물이상반응에 대해서는 적절한 평가를 통해 병인을 확인하고 약물이상반응의 중증도를 토대로 이 약 투여를 보류하고 코르티코스테로이드 투여를 고려한다. 1등급 이하로 개선되면 코르티코스테로이드를 최소 1개월 이상의 기간을 두고 점감 절차를 시작해야 한다. 면역 관련 약물이상반응이 코르티코스테로이드 사용으로 조절이 되지 않는 환자의 경우 다른 전신 면역억제제의 투여를 고려할 수 있다. 코르티코스테로이드 점감 절차를 실시한 이후에 약물이상반응이 1등급 이하에 머무르면 이 약 투여를 재개한다. 중증 약물이상반응 사례가 다시 발생하면, 이 약 투여를 영구 중단한다. (용법용량 및 3. 이상사례, 1) 임상시험에서 보고된 이상사례 항 참고)
① 면역-매개 폐염증
이 약 투여 환자에서 치명적인 사례를 포함한 폐염증이 보고되었다. 폐염증의 징후와 증상에 대해 환자를 모니터링해야 한다. 폐염증이 의심되면 방사선영상 검사를 실시한다. 중등증(2등급) 이상의 폐염증의 경우 코르티코스테로이드를 투여(프레드니손으로 초회 용량 1-2 mg/kg/day 또는 이에 상응하는 양을 투여하고 이후 점감)한다. 중등증(2등급) 폐염증의 경우 이 약 투여를 보류하며, 중증(3등급), 생명을 위협하는(4등급) 폐염증 또는 재발성 중등증(2등급) 폐염증의 경우에는 이 약 투여를 영구 중단한다.
② 면역-매개 결장염

이 약 투여 환자에서 결장염이 보고되었다. 결장염의 징후와 증상에 대해 환자를 모니터링해야 한다. 중등증(2등급) 이상의 결장염의 경우 코르티코스테로이드를 투여(프레드니손으로 초회 용량 1-2 mg/kg/day 또는 이에 상응하는 양을 투여하고 이후 점감)한다. 중등증(2등급) 또는 중증(3등급)의 결장염의 경우 이 약 투여를 보류하며, 생명을 위협하는(4등급) 결장염의 경우 이 약 투여를 영구 중단한다.

③ 면역-매개 간염 (이 약) 및 간독성 (이 약과 엑시티닙 병용 요법)

면역-매개 간염

이 약 투여 환자에서 간염이 보고되었다. 간 기능의 변화(치료 시작 시점, 치료 기간 중에는 정기적으로 실시 및 임상 평가를 토대로 필요한 경우 실시)와 간염의 증상에 대해 환자를 모니터링해야 한다. 코르티코스테로이드를 투여(프레드니손으로 초회 용량을 2등급 간염의 경우 0.5-1 mg/kg/day, 3등급 이상의 간염의 경우 1-2 mg/kg/day 또는 이에 상응하는 양을 투여하고 이후 점감)하고 간 효소 상승의 중증도에 따라 이 약 투여를 보류 또는 중단한다.

엑시티닙과의 병용 시 간독성

이 약의 단독투여 시와 비교하여 이 약과 엑시티닙의 병용 투여 시에는 예상되었던 발생률보다 높은 빈도의 3등급 및 4등급의 ALT 및 AST 상승과 같은 간독성이 발생할 수 있다. 치료를 시작하기 전과 치료하는 동안 정기적으로 간 효소를 모니터링해야 한다. 단독요법으로 사용될 때에 비해 간 효소를 더 자주 모니터링할 것을 고려한다. 간 효소 상승 시 이 약 및 엑시티닙의 투여를 일시 중단하고, 필요 시 코르티코스테로이드의 투여를 고려한다 (용법용량 참고).

이 약과 엑시티닙의 병용 투여 시 3등급 및 4등급의 ALT 증가(20%) 및 AST 증가(13%)가 보고되었다. ALT 증가가 발병하는 시간의 중앙값은 2.3개월(범위: 7일 ~ 19.8개월) 이었다. ALT 증가인 환자들 중 59%는 전신 코르티코스테로이드를 투여받았다. ALT가 정상 상한치의 3배 이상인 환자들(2~4등급, n=116) 중 94%에서 ALT가 0~1등급으로 회복되었다. 이 약(3%) 또는 엑시티닙(31%) 단독요법, 또는 두 약의 병용요법(50%)으로 재투여한 92명의 환자들 중 55%는 ALT가 정상 상한치의 3배 초과로 상승하는 재발을 보이지 않았다.

④ 면역-매개 신장염

이 약 투여 환자에서 신장염이 보고되었다. 신기능의 변화에 대해 환자를 모니터링한다. 중등증(2등급) 이상의 신장염의 경우 코르티코스테로이드를 투여(프레드니손으로 초회 용량 1-2 mg/kg/day 또는 이에 상응하는 양을 투여하고 이후 점감)한다. 중등증(2등급) 신장염의 경우 이 약 투여를 보류하며, 중증(3등급) 내지 생명을 위협하는(4등급) 신장염의 경우 이 약 투여를 영구 중단한다.

⑤ 면역-매개 내분비병증

이 약 투여 환자에서 부신 부전(원발성 및 속발성)이 보고되었다.

이 약 투여 환자에서 뇌하수체염도 보고되었다. 부신 부전 및 뇌하수체염 (뇌하수체기능저하증 포함)의 징후와 증상에 대해 환자를 모니터링한다. 코르티코스테로이드를 투여하고 임상적으로 필요한 경우 다른 호르몬 대체요법을 실시한다. 중등증(2등급) 부신 부전 또는 뇌하수체염의 경우 이 약 투여를 보류하며, 중증(3등급) 내지 생명을 위협하는(4등급) 부신 부전 또는 뇌하수체염의 경우 이 약 투여를 보류 또는 중단한다.

이 약 투여 환자에서 당뇨병성 케토산증을 포함하는 제1형 당뇨병이 보고되었다. 고혈당증 또는 다른 당뇨병의 징후와 증상에 대해 환자를 모니터링해야 한다. 제1형 당뇨병의 경우 인슐린을 투여하고 중증의 고혈당증의 경우 대사조절에 도달할 때까지 이 약 투여를 보류한다.

이 약 투여 환자에서 갑상선기능항진증, 갑상선 저하증 및 갑상선염을 포함하는 갑상선 장애가 보고되었으며 치료 중 언제라도 발생할 수 있다. 그러므로 갑상선 기능의 변화(치료 시작 시점, 치료 기간 중에는 정기적으로 모니터링 및 임상 평가를 토대로 필요한 경우 모니터링)와 갑상선 장애의 임상적 징후와 증상에 대해 모니터링해야 한다. 갑상선 저하증의 경우 호르몬 대체요법을 실시한다. 갑

상선기능항진증은 티오나마이드 및 베타 차단제로 적절히 관리한다. 중증(3등급) 또는 생명을 위협하는(4등급) 갑상선기능항진증의 경우 투여를 일시 또는 영구 중단한다.
⑥ 중증의 피부반응
이 약 투여 환자에서 면역-매개의 중증의 피부반응이 보고되었다. 중증의 피부반응이 의심되면 환자를 모니터링하고 다른 원인들을 배제한다. 약물이상반응의 중증도에 따라 이 약 투여를 보류 또는 영구 중단하고 코르티코스테로이드를 투여한다(용법용량 참고).
이 약 투여 환자에서 스티븐스-존슨 증후군(SJS)과 독성표피괴사융해증(TEN)이 보고되었으며, 일부는 치명적인 경과를 보였다. 스티븐스-존슨 증후군 또는 독성표피괴사융해증의 징후 또는 증상이 있으면, 이 약 투여를 보류하고 보다 전문적인 평가와 치료를 위한 기관에 위탁한다. 만약 스티븐스-존슨 증후군 또는 독성표피괴사융해증이 확진되면, 이 약 투여를 영구 중단한다(용법용량 참고).
⑦ 기타 면역-매개 약물이상반응
이 약을 투여받은 환자 2799명 중 1% 미만(별도의 표시가 없는 경우)에서 다음의 임상적으로 중요한 면역관련 약물이상반응이 확인되었다: 관절염(1.5%), 포도막염, 근염, 길랑-바레증후군, 중증근무력증(악화 포함), 혈관염, 췌장염, 용혈성 빈혈, 사르코이드증, 뇌염, 척수염, 부갑상선 저하증. 다음은 이 약의 다른 임상시험 또는 시판 후 사용에서 보고되었다: 심근염, 경화성 담관염, 췌장 외분비선 기능부전.
면역-매개 약물이상반응 중 일부는 중증이었으며 임상시험 중 또는 시판 후 사용에서 보고되었다.
⑧ 이식 관련 약물이상반응
시판 후 사용에서 이 약을 투여받은 환자에서 고형 장기 이식 거부가 보고되었다. 이 약은 고형 장기 이식 거부의 위험성을 증가시킬 수 있다. 이러한 환자에게 투여할 경우, 이 약 투여에 따른 유익성 대비 이식 거부 가능성에 따른 위험성을 고려해야 한다.
이 약을 투여받은 동종이형 조혈모세포이식수술(HSCT) 이력이 있는 환자에서 치명적인 이식편대숙주질환(GVHD)을 포함한 급성 이식편대숙주질환이 보고되었다. 이식 수술 후 이식편대숙주질환을 경험한 환자들은 이 약 투여 이후 이식편대숙주질환의 위험이 증가할 수 있다. 동종이형 조혈모세포이식수술 이력이 있는 환자에서는 이 약 투여에 따른 유익성 대비 이식편대숙주질환의 위험성을 고려해야 한다.
2) 다발성 골수종 환자에게 이 약을 탈리도마이드 유사체와 덱사메타손 병용 요법에 추가 시 사망률 증가
다발성 골수종 환자에 대한 무작위배정 임상시험 2건에서 이 약을 탈리도마이드 유사체와 덱사메타손 병용 요법에 추가했을 때 사망률이 증가하였고, 이러한 병용요법에 대해 이 약의 사용이 허가되어 있지 않다. 다발성 골수종 환자에게 탈리도마이드 유사체와 덱사메타손 병용요법에 이 약을 추가하는 요법은 적절하지 않다.
3) 주입 관련 반응
KEYNOTE-001, 002, 006, 010에서 이 약을 투여 받은 2799명의 환자 중 6명(0.2%)에서 과민증과 아나필락시스를 포함하는 중증의 주입 관련 반응이 보고되었다. 중증 또는 생명을 위협하는 주입 관련 반응의 경우, 주입을 멈추고 이 약의 투여를 영구 중단한다(용법용량 참고). 경증 또는 중등증의 주입 관련 반응의 경우, 면밀히 모니터링 하며 이 약의 투여를 계속할 수 있다; 해열제와 항히스타민제로 전치료하는 것을 고려할 수 있다.

5. 상호작용
이 약에 대해 공식적인 약동학적 약물 상호작용 연구는 수행된 바 없다. 펨브롤리주맙은 혈액에서 이화작용을 통해 소실되므로 대사적 약물-약물 상호작용은 예상되지 않는다.
이 약의 약력학적 활성 및 유효성이 저해될 가능성이 있으므로 이 약 투여를 시작하기 전에 전신 코

르티코스테로이드 또는 면역억제제의 사용을 피해야 한다. 하지만 이 약 투여를 시작한 이후에 면역-매개 약물이상반응의 치료를 위해서는 전신 코르티코스테로이드 또는 면역억제제를 사용할 수 있다. 이 약을 화학요법제와 병용하여 투여할 때, 예방적 항구토제 및/또는 화학요법제와 관련된 약물이상반응 완화의 목적으로 코르티코스테로이드를 전치료로 사용할 수 있다.

6. 임부, 수유부, 가임여성에 대한 투여
1) 임부 및 가임여성: 이 약의 임신 중 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않는다. 임부에 대한 이 약의 사용에 관한 자료는 없다. 이 약에 대한 비임상 생식독성시험은 수행되지 않았지만 설치류 임신 모델 연구에서는 PD-L1 신호전달을 차단하면 태아의 내성이 저해되어 태아 소실이 증가하는 것으로 증명되었다. 이는 작용기전에 의하여 임신 중 이 약 투여 시 태아 소실 또는 사산의 발생률 증가를 포함하여 태아 손상의 위험 가능성이 있음을 시사한다. 인간 IgG4는 태반 장벽을 통과하는 것으로 알려져 있으며 이 약은 IgG4의 일종이므로 산모로부터 태아에게 이행될 가능성이 있다. 가임 여성은 이 약 치료 중 및 이 약 최종 투여 후 최소 4개월 동안 효과적인 피임법을 사용해야 한다.
2) 수유부: 이 약이 사람 모유로 분비되는지 여부는 알려지지 않았다. 인간 IgG는 모유 중으로 이행되므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 중단하도록 한다.

7. 소아 등에 대한 투여
KEYNOTE-051에서 진행성 흑색종, 림프종 또는 PD-L1 양성인 진행성, 재발성 또는 불응성 고형암을 지닌 소아 환자 161명(6개월부터 12세 미만 어린이 62명, 12세부터 17세 청소년 99명)에게 이 약 2 mg/kg를 매 3주마다 투여하였다. 이 중 재발성 또는 불응성인 전형적 호지킨 림프종 소아 환자는 22명(11-17세)이었다. 이 약을 투여받은 환자의 투여 횟수 중앙값은 4회(범위: 1-35회)였고, 138명(86%)의 환자들은 이 약을 2회 이상 투여받았다. 매 3주마다 2 mg/kg로 투여한 소아 환자에서의 이 약의 혈중 농도는 동일 요법으로 투여한 성인 환자에서와 유사하였다.
소아 환자에서 이 약의 안전성 프로파일은 성인에서와 유사하였다. 가장 빈번한 약물이상반응(적어도 20%의 소아 환자에서 보고됨)은 발열, 구토, 두통, 복통, 빈혈, 기침 그리고 변비였다.

8. 고령자에 대한 투여
전반적으로 고령자(65세 이상)와 65세 미만 성인 간에 안전성 또는 유효성의 차이는 보고되지 않았다. 이 환자군에서 용량 조절은 필요하지 않다.

9. 신장애 환자에 대한 투여
경증 또는 중등증 신장애 환자에게는 용량 조절이 필요하지 않다. 중증 신장애 환자를 대상으로 한 이 약에 대한 연구는 수행된 바 없다.

10. 간장애 환자에 대한 투여
경증 간장애 환자에게는 용량 조절이 필요하지 않다. 중등증 또는 중증 간장애 환자를 대상으로 한 이 약에 대한 연구는 수행된 바 없다.

11. 과량투여 시의 처치
이 약 과량투여에 대한 정보는 없다. 과량투여 시, 약물이상반응의 징후나 증상에 대해 면밀히 모니터링하고, 적절한 대증치료를 실시해야 한다.

12. 적용상의 주의

1) 조제 및 투여방법

- 차광보관한다. 얼리지 않는다. 제품을 흔들지 않는다.
- 이 약 바이알을 실온에 도달하게 한다.
- 이 약 바이알은 희석하기 전 최대 24시간까지 냉장고 밖(25℃ 이하)에서 보관할 수 있다.
- 투여 전에 이 약 바이알을 육안으로 검사하여 이물과 변색 여부를 확인한다. 이 약은 투명하거나 약간 유백광의 무색 또는 옅은 노란색의 액체이다. 육안 확인 시 이물이 확인되면 바이알을 폐기한다.
- 투여 용량을 최대 4 mL(100 mg)까지 취한 후 이를 0.9% 생리식염주사액 또는 5% 포도당(덱스트로스)을 함유한 정맥수액백에 옮겨 최종 농도 1-10 mg/mL로 희석한다. 희석한 용량을 천천히 위아래로 뒤집어서 잘 섞는다. (흔들지 말 것)
- 점적 주입액(희석된 용액)을 얼리지 않는다.
- 이 약은 보존제가 함유되지 않았다. 희석된 의약품은 즉시 사용해야 한다. 즉시 사용하지 않는 경우 희석된 용액은 실온에서 총 6시간까지 보관할 수 있다. 희석된 용액은 2-8℃에서 냉장 보관할 수 있지만 희석부터 점적주입 완료까지 총 소요시간이 96시간을 초과해서는 안 된다. 냉장 보관한 경우에는 바이알 및/또는 정맥수액백을 꺼내두어 실온에 도달한 뒤 사용해야 한다.
- 희석된 용액을 30분에 걸쳐서 0.2-5 μm 크기의 멸균, 비발열성, 저단백결합 내장 또는 외장 필터를 사용하여 정맥으로 점적 주입한다.
- 같은 점적주입 라인으로 다른 약물을 함께 투여하지 않는다.
- 사용하지 않고 남은 바이알 내용물은 폐기한다.

13. 임상약리학

1) 약리작용 정보

이 약(펨브롤리주맙)은 단일클론항체 항악성종양제이다.

이 약은 PD-1에 대한 높은 결합 친화성을 지닌 항체로, 항원제시세포 또는 종양세포에서 PD-1 경로에 관여하는 PD-L1 및 PD-L2를 포함한 리간드의 이중 리간드 억제(dual ligand blockade) 작용을 한다. 이 약은 PD-1 수용체와 그 리간드의 결합을 방해함으로써, 종양 미세환경에서 종양-특이적 세포독성 T 림프구 및 항종양 면역반응을 재활성화한다.

이 약 2 mg/kg을 매 3주마다 투여하거나 10 mg/kg을 매 2주 또는 3주마다 투여한 환자의 말초혈액에서, 순환하는 T-림프구 수의 증가 없이 활성화된(즉, HLA-DR+) CD4+ 및 CD8+ T-세포의 비율이 증가한 것으로 관찰되었다.

2) 약동학적 정보

이 약의 약동학은 이 약을 매 2주마다 1~10 mg/kg을 투여하거나 매 3주마다 2~10 mg/kg 또는 200 mg를 투여한 2993명의 다양한 암환자들을 대상으로 연구되었다. 이 약의 약동학에 있어 적응증 간 임상적으로 의미있는 차이는 없었다.

흡수

이 약은 정맥으로 투여되기 때문에 즉시 그리고 완전히 생체이용가능하다.

분포

제한적인 혈관 외 분포와 상응하게, 이 약의 정상 상태(steady state)에서의 분포 용적은 작다(6.0 L; 변동 계수[CV]: 20%). 항체 제제에서 기대되는 바와 같이, 이 약은 혈장 단백질과 특이적 결합을 하지 않는다.

대사

이 약은 비특이적 경로로 이화된다; 대사는 이 약의 클리어런스에 기여하지 않는다.

제거
이 약의 클리어런스(CV%)는 첫 투여 시(252 mL/day [CV%: 37%])에 비해 정상 상태에서 최대 변화를 달성한 후 약 23% 낮다[기하학적 평균, 195 mL/day(40%)]; 이러한 시간에 따른 클리어런스의 감소는 임상적으로 유의미하지 않다고 여겨진다. 소실기 반감기($t_{1/2}$)의 기하학적 평균값(CV%)은 22일(32%)이다.
이 약은 매 3주마다 반복 투여 시 16주차에 정상 상태 농도에 도달하였으며 전신 축적은 2.1배였다. 이 약의 최고 농도(C_{max}), 최저 농도(C_{min}) 및 정상 상태에서 시간-혈장농도 곡선 하 면적(AUC_{ss})은 매 3주마다 투여 시 2~10 mg/kg 범위에서 용량 비례적으로 증가하였다.
특수 환자 집단
이 약의 약동학에 대한 다양한 공변량(covariates)의 영향은 집단 약동학 분석에서 평가되었다. 연령(15-94세 범위), 성별, 인종, 경증 또는 중등증 신기능 장애, 경증 간장애 및 종양 부담과 같은 인자들은 이 약의 클리어런스에 임상적으로 유의한 영향을 미치지 않았다. 매 3주마다 2 mg/kg 체중 기반 용량으로 투여한 소아 환자(2-17세)에서의 혈중 농도는 동일 용량으로 투여한 성인 환자에서와 유사하다.
신장애 환자
신 기능 장애가 이 약의 클리어런스에 미치는 영향은 경증(GFR 60 이상 90 미만 mL/min/1.73 m^2) 또는 중등증(GFR 30 이상 60 미만 mL/min/1.73 m^2) 신장애 환자와 정상(GFR 90 이상 mL/min/1.73 m^2) 신기능 환자를 비교한 집단 약동학 분석에서 평가되었다. 경증 또는 중등증 신장애 환자와 정상 신기능 환자 사이에서 이 약의 클리어런스에 임상적으로 유의한 차이는 관찰되지 않았다. 중증(GFR 15 이상 30 미만 mL/min/1.73 m^2) 신장애 환자를 대상으로 한 이 약에 대한 연구는 수행된 바 없다(9. 신장애 환자에 대한 투여 참고).
간장애 환자
간장애가 이 약의 클리어런스에 미치는 영향은 경증 간장애[총 빌리루빈(Total bilirubin, TB) 1.0~1.5 x ULN(Upper limit of normal) 또는 AST >ULN, 간기능 장애에 대한 국립암연구소(National Cancer Institute) 기준에 의함] 환자와 정상 간기능(TB 및 AST ≤ULN) 환자를 비교한 집단 약동학 분석에서 평가되었다. 경증 간장애 환자와 정상 간기능 환자 사이에서 이 약의 클리어런스에 임상적으로 유의한 차이는 관찰되지 않았다. 중등증(TB >1.5~3 x ULN 및 any AST) 또는 중증(TB >3 x ULN 및 any AST) 간장애 환자를 대상으로 한 이 약에 대한 연구는 수행된 바 없다(10. 간장애 환자에 대한 투여 참고).

14. 임상시험 정보
임상적 유효성 및 안전성
흑색종 (Melanoma)
KEYNOTE-006: 이필리무맙 치료 경험이 없는 환자를 대상으로 한 대조 임상시험
이 약의 안전성과 유효성은 이필리무맙 치료 경험이 없으며, 이전에 전신 치료를 한 가지 이상 사용하지 않은 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종 환자 치료 목적의 다기관, 대조 임상 3상 시험인 KEYNOTE-006에서 평가되었다. 환자들은 이 약 10 mg/kg을 2주마다(n=279) 또는 3주마다(n=277) 투여받거나 이필리무맙을 투여(n=278) 받도록 무작위 배정(1:1:1) 되었다. 치료 차수(line of therapy), ECOG PS, 및 PD-L1 발현 상태에 따라 층화되었다. 자가면역질환 환자 또는 면역억제제를 투여 받는 환자, 이전에 다른 단클론 항체에 중증의 과민증을 보인 환자 및 HIV, B형 간염 또는 C형 간염 환자는 이 임상시험에서 제외되었다. BRAF V600E 돌연변이 양성 흑색종을 앓고 있는 환자에 대해서는 이전에 BRAF 억제제 치료를 받는 것이 필수 요건은 아니었다.
환자들은 질병의 진행 또는 허용 불가능한 독성 발생 전까지 이 약을 투여 받았다. 질병 진행의 초

기 증상을 보였으나 임상적으로 안정된 환자들은 질병 진행이 확인될 때까지 치료를 유지하도록 허용되었다. 종양 상태 평가는 12주에 진행되었으며, 그 후 48주까지 6주마다, 그 후에는 12주마다 수행되었다.

KEYNOTE-006에 참가한 834명의 환자들 중에서 60%는 남성, 44%는 65세 이상(연령 중앙값 62세[범위 18-89])이었으며 98%는 백인이었다. 66%는 이전에 전신 치료를 받은 경험이 없었으며, 34%는 이전에 1회의 치료 경험이 있었다. ECOG PS는 0(69%) 및 1(31%)이었다. 환자의 80%는 PD-L1 양성(22C3 항 PD-L1 항체를 사용한 면역 조직 화학 분석에 의해 사전 평가된 종양 및 관련 면역 세포의 1% 이상에서 PD-L1 막 발현)이었으며 18%는 PD-L1 음성이었다. 65%는 M1c 단계였고, 32%는 상승된 LDH 결과를 보였고 9%는 뇌 전이가 확인되었다. 302명(36%)의 환자에서 BRAF 돌연변이 양성이었다. BRAF 돌연변이 양성인 환자 중 139명(46%)은 이전에 BRAF 억제제로 치료를 진행한 경험이 있었다. 베이스라인 특성은 치료군 전반에 걸쳐 균형을 이루었다.

1차 유효성 평가지표는 전체생존(OS)과 무진행생존(PFS, 고형암 반응평가 기준 RECIST 1.1에 따른 IRO 검토에 의해 평가)이었다. 2차 유효성 평가지표는 객관적 반응률(ORR)과 반응지속기간(DoR)이었다. 주요 유효성 결과는 표 32에 요약되어 있다.

표 32. 이필리무맙 치료 경험이 없는 진행성 흑색종 환자에 대한 2주 또는 3주마다 이 약 10 mg/kg 투여 후 반응 결과 (KEYNOTE-006)

평가 지표	3주마다 이 약 10 mg/kg n=277	2주마다 이 약 10 mg/kg n=279	이필리무맙 n=278
전체생존(OS)*			
사건 발생 환자 수 (%)	119 (43%)	122 (44%)	142 (51%)
중앙값(개월) (95% CI)	도달하지 않음 (24, NA)	도달하지 않음 (22, NA)	16 (14, 22)
위험비(HR)†(95% CI)	0.68 (0.53, 0.86)	0.68 (0.53, 0.87)	-
p-값‡	<0.001	<0.001	-
IRO§에 의한 무진행생존(PFS)*			
사건 발생 환자 수 (%)	183 (66%)	181 (65%)	202 (73%)
중앙값(개월) (95% CI)	4.1 (2.9, 7.2)	5.6 (3.4, 8.2)	2.8 (2.8, 2.9)
위험비(HR)†(95% CI)	0.61 (0.50, 0.75)	0.61 (0.50, 0.75)	-
p-값‡	<0.001	<0.001	-
IRO§에 의한 최상의 객관적 반응¶			
객관적 반응률(ORR) % (95% CI)	33% (27, 39)	34% (28, 40)	12% (8, 16)
IRO§에 의한 반응지속기간(DoR)#			
중앙값(개월) (범위)	도달하지 않음(2.0+, 22.8+)	도달하지 않음(1.8+, 22.8)	도달하지 않음(1.1+, 23.8+)

*최종 분석에 기초함

†층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초한 위험비(HR)(이필리무맙 대비 이 약)

‡층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함

§IRO = RECIST 1.1에 따른 독립적인 방사선학 및 종양학자 리뷰

¶1차 중간 분석에 기초함

#최종 분석에서 확인된 완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)을 보인 최상의 객관적 반응 환자를 기준으로 함

NA = 가용하지 않음

이 연구는 이 약 10mg/kg을 2주 및 3주마다 투여시 이필리무맙 대비 OS 및 PFS에 대한 통계적으로

유의미한 개선을 입증하였다.

그림 1. KEYNOTE-006 치료군의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)





그림 2. KEYNOTE-006 치료군의 무진행 생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-002: 이필리무맙 치료 경험이 있는 환자를 대상으로 한 대조 임상시험

이 약의 안전성과 유효성은 이전에 이필리무맙 치료 경험이 있고 BRAF V600 돌연변이 양성의 경우 BRAF 또는 MEK 억제제 치료를 받은 수술 불가능하거나 전이성 흑색종 환자 대상의 다기관, 대조 임상시험인 KEYNOTE-002에서 평가되었다. 환자들은 이 약 3주마다 2 mg/kg(n=180)군, 또는 10 mg/kg(n=181)군 또는 화학요법(n=179; 다카바진, 테모졸로미드, 카보플라틴, 파클리탁셀, 또는 카보플라틴+파클리탁셀 포함)에 무작위 배정(1:1:1) 되었다. 자가면역질환 환자 또는 면역억제제를 투여 받는 환자, 이필리무맙 치료에서 중증 또는 생명을 위협하는 면역-매개 이상반응의 병력을 가진 환자,

12주 이상의 코르티코스테로이드 치료(10 mg/day 이상의 프레드니손 또는 이와 동등)를 필요로 하는 3 또는 4등급의 독성을 경험한 환자, 이전에 다른 단클론 항체에 중증의 과민증을 보인 환자, 폐염증 및 간질성 폐 질환 병력이 있는 환자, HIV, B형 간염 또는 C형 간염 환자는 이 임상시험에서 제외되었다.

환자들은 질병의 진행 또는 허용 불가능한 독성 발생 전까지 이 약을 투여하였다. 질병 진행의 초기 증상을 보였으나 임상적으로 안정된 환자들은 질병 진행이 확인될 때까지 치료를 유지하도록 허용되었다. 종양 상태 평가는 12주에 진행되었으며, 그 후 6주마다 48주까지, 그 후에는 12주마다 수행되었다. 최초 계획된 질병 평가 후 독립적 평가시 질병이 진행된 화학요법군의 환자는 이중 맹검 방식으로 3 주마다 2 mg/kg 또는 10 mg/kg의 이 약을 투여 받을 수 있었다.

KEYNOTE-002에 참가한 540명의 환자들 중에서 61%는 남성, 43%는 65세 이상(연령 중앙값 62세[범위 18-89])이었으며 98%는 백인이었다. 82%는 M1c 단계의 환자이며, 73%는 두 가지 그리고 32%는 세 가지 이상의 진행성 흑색종에 대한 전신 치료 경험을 가지고 있었다. ECOG PS 1(45%)이었으며, 40%는 상승된 LDH 결과를 보였고 23%는 BRAF 돌연변이 유전자를 가지고 있었다. 베이스라인 특성은 치료군 전반에 걸쳐 균형이 잘 잡혔다.

1차 유효성 평가지표는 무진행생존(PFS, RECIST 1.1에 따른 IRO 검토에 의해 평가) 및 전체생존(OS)이었다. 2차 유효성 평가지표는 무진행생존(PFS, RECIST 1.1에 따른 연구자평가), 객관적 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었다. 이전에 이필리무맙 치료를 받은 환자의 주요 유효성 결과는 표 33에 요약되어 있다.

표 33. 수술 불가능하거나 전이성 흑색종 환자에 대한 이 약 2 mg/kg 또는 10 mg/kg 3주마다 투여 후 유효성 결과 (KEYNOTE-002)

평가 지표	3주마다 이 약 2 mg/kg n=180	3주마다 이 약 10 mg/kg n=181	화학요법 n=179
전체생존(OS)*			
사건 발생 환자 수 (%)	123 (68%)	117 (65%)	128 (72%)
중앙값(개월) (95% CI)	13.4 (11.0, 16.4)	14.7 (11.3, 19.5)	11.0 (8.9, 13.8)
위험비(HR)†(95% CI)	0.86 (0.67, 1.10)	0.74 (0.57, 0.96)	-
p-값‡	0.117	0.011ß	-
IRO§에 의한 무진행생존(PFS)*			
사건 발생 환자 수 (%)	150 (83%)	144 (80%)	172 (96%)
중앙값(개월) (95% CI)	2.9 (2.8, 3.8)	3.0 (2.8, 5.2)	2.8 (2.6, 2.8)
위험비(HR)†(95% CI)	0.58 (0.46, 0.73)	0.47 (0.37, 0.60)	-
p-값‡	<0.001	<0.01	-
IRO§에 의한 최상의 객관적 반응¶			
객관적 반응률(ORR) % (95% CI)	21% (15, 28)	25% (19, 32)	4% (2, 9)
IRO§에 의한 반응지속기간(DoR)#			
중앙값(개월) (범위)	22.8 (1.4+, 25.3+)	도달하지 않음(1.1+, 28.3+)	6.8 (2.8, 11.3)

*최종 결과 분석에 기초함

†층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초한 위험비(HR)(화학요법 대비 이 약)

‡층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함

§IRO = RECIST 1.1에 따른 독립적 방사선학 및 종양학자 리뷰


¶2차 중간 분석에 기초함

#최종 분석에서 확인된 완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)을 보인 최상의 객관적 반응 환자를 기준으로 함

[β]다중성 조정 후 통계적으로 유의하지 않음

이 연구는 이 약 2 mg/kg 및 10 mg/kg을 3주마다 투여시 화학요법 대비 PFS에 대한 통계적으로 유의한 개선을 입증하였다.

그림 3. KEYNOTE-002 치료군의 무진행생존 (PFS)에 대한 Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-716: 완전 절제술을 받은 IIB 또는 IIC기 흑색종 환자의 보조요법 치료에 대한 위약 대조 임상시험

이 약의 유효성은 완전히 절제된 stage IIB 또는 IIC기 흑색종 환자를 대상으로 한 다기관, 무작위 이중 맹검 위약 대조 연구인 KEYNOTE-716에서 평가되었다. 총 976명의 환자가 질병이 재발하거나 허용 불가능한 독성 발생 전까지 최대 1년까지 이 약을 200 mg [12세 이상 18세 미만의 경우, 2 mg/kg (최대 200 mg)] 3주마다 정맥 투여(n=487) 또는 위약을 투여(n=489) 하도록 무작위 배정(1:1) 되었다. 무작위 배정은 T 병기(AJCC 7판 기준)에 의해 층화되었다. 환자는 연구 시작 전에 흑색종에 대한 완전한 외과적 절제를 넘어서는 흑색종 치료를 받은 적이 없어야 한다. 활성 자가면역질환이 있거나 면역억제를 필요로 하거나 점막 또는 안구 흑색종을 가진 환자들은 제외되었다.

976명의 시험 참가자의 베이스라인 특성은 다음과 같았다: 연령 중앙값(median age) 61세 (범위: 16-87세), 65세 이상 39%, 남성 60%, ECOG PS 0(93%) 및 ECOG PS 1(7%)이었다. 64%는 IIB기, 35%는 IIC기 였다.

1차 유효성 평가지표는 전체 집단에서 임상 시험 연구자가 평가한 무재발 생존(RFS)이다. 2차 평가지표는 전체 집단에서 무원격전이 생존(DMFS)과 전체 생존(OS)이다.

* RFS: 무작위 배정한 날짜에서 첫 번째 재발 날짜(국소, 주위 또는 원격전이) 또는 사망 중 먼저 발생한 날까지의 기간

이 연구는 이 약 200mg을 3주마다 투여시 위약 대비 RFS에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증했다. 유효성 결과는 표 34에 요약되어있다.

표 34. 유효성 결과 (KEYNOTE-716)


평가지표	3주마다 이 약 200 mg n=487	위약 n=489
무재발 생존(RFS)		

사건 발생 환자의 수 (%)	54 (11%)	82 (17%)
18개월 시점의 무재발 생존(RFS) 비율	85.8%	77%
중앙값 (개월) (95% CI)	NR (22.6, NR)	NR (NR, NR)
위험비(HR)* (95% CI)	0.65 (0.46, 0.92)	
p-값 (층화 된 로그 순위)	0.00658	

* 층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초함

NR = 도달하지 않음

그림 4. KEYNOTE-716의 무재발 생존(RFS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-054: 완전 절제술을 받은 Ⅲ기 흑색종 환자의 보조요법 치료에 대한 위약 대조 임상시험

이 약의 유효성은 완전히 절제된 ⅢA (1 mm 초과 림프절 전이), ⅢB 또는 ⅢC 흑색종 환자를 대상으로 한 다기관, 무작위 이중 맹검 위약 대조 연구인 KEYNOTE-054에서 평가되었다. 총 1019명의 환자가 질병이 재발하거나 허용 불가능한 독성 발생 전까지 최대 1년까지 이 약을 200 mg 3주마다 투여(n=514) 또는 위약을 투여(n=505) 하도록 무작위 배정(1:1) 되었다. 병기[AJCC 기준(ⅢA vs. ⅢB vs. ⅢC 1-3개 양성 림프절 vs. ⅢC 4개 이상 양성 림프절)] 및 지리적 영역(북미, 유럽 국가, 호주 및 기타 지정 국가)에 의해 층화되었다. 환자는 치료를 시작하기 전 13주 이내에 림프절 절개, 또는 지시가 있을 경우에 방사선 치료를 받을 수 있다. 활성 자가면역질환이 있거나 면역억제를 필요로 하거나 점막 또는 안구 흑색종을 가진 환자들은 제외되었다. 환자들은 처음 2년간 첫 번째 이 약 투여 후 12주마다, 그 후 3년에서 5년까지는 6개월마다, 그리고 그 후에는 매년 영상(imaging)을 촬영했다. 1019명의 시험 참가자의 베이스라인 특성은 다음과 같았다: 연령 중앙값(median age) 54세 (25%는 65세 이상), 남성 62%, ECOG PS 0(94%) 및 ECOG PS 1(6%)이었다. 16%는 ⅢA 단계, 46%는 ⅢB 단계,

18%는 IIIC 단계(1~3개 양성 림프절), 20%는 IIIC 단계(4개 이상 양성 림프절), 50%는 BRAF V600 돌연변이 양성 환자였으며 44%는 BRAF 야생형(wild-type)이며, IUO 분석에 따르면 84%는 TPS 1% 이상인 PD-L1 양성 흑색종을 가졌다.

1차 유효성 평가지표는 전체 집단 및 PD-L1 양성 종양을 갖는 집단에서 임상시험 연구자가 평가한 무재발 생존(RFS)이다. 유효성 결과는 표 35과 그림 5, 6에 요약되어 있다.

*RFS: 무작위 배정한 날짜에서 첫 번째 재발 날짜(국소, 주위 또는 원격전이) 또는 사망 중 먼저 발생한 날까지의 기간

표 35. 유효성 결과 (KEYNOTE-054)

평가 지표	3주마다 이 약 200 mg n=514	위약 n=505
무재발 생존(RFS)		
사건 발생 환자의 수 (%)	135 (26%)	216 (43%)
중앙값 (개월) (95% CI)	NR	20.4 (16.2, NR)
위험비(HR)*(98% CI)	0.57 (0.43, 0.74)	
p-값 (층화 된 로그 순위)	<0.0001	
무원격전이 생존(DMFS)		
사건 발생 환자의 수 (%)	173 (34%)	245 (49%)
중앙값 (개월) (95% CI)	NR	40.0 (27.7, NR)
위험비(HR)*(95% CI)	0.60 (0.49, 0.73)	
p-값 (층화 된 로그 순위)	<0.0001	
*층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초함 NR = 도달하지 않음		

이 연구는 이 약 200mg을 3주마다 투여시 위약 대비 RFS에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증했다.

그림 5. KEYNOTE-054의 무재발 생존(RFS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)





그림 6. KEYNOTE-054의 무원격전이 생존(DMFS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



비소세포폐암 (Non-Small Cell Lung Carcinoma)

KEYNOTE-189: 치료 경험이 없는 비편평 비소세포폐암 환자 대상의 병용 요법 대조 임상시험

페메트렉시드 및 백금 화학요법을 병용한 이 약의 유효성은 다기관, 무작위 배정, 활성 대조군, 이중 맹검 임상시험인 KEYNOTE-189에서 평가되었다. 주요 대상 환자 선정 기준은 전이성 비편평 비소세포폐암 환자이고, 이전에 전이성 비소세포폐암에 대한 전신 요법을 받지 않았으며, EGFR 또는 ALK 변이가 없는 환자이다. 2년 간의 치료 동안 전신 치료가 필요한 자가면역질환 환자, 면역 억제 치료가 필요한 환자, 또는 이전 26주 이내에 30 Gy 이상의 흉부방사선을 받은 환자는 제외되었다. 환자들은 시험군 또는 대조군에 무작위로(2:1) 배정되었다:

· 이 약 200 mg 또는 위약, 페메트렉시드 500 mg/m^2및 시스플라틴 75 mg/m^2 또는 카보플라틴 AUC 5 mg/mL/min을 3주마다 4 사이클 동안 정맥투여 한 후에, 이 약 200 mg 또는 위약, 페메트렉시드 500 mg/m^2를 3주마다 정맥투여 하였다.

이 약은 RECIST 1.1에 따라 연구진이 평가한 질병의 진행이 확인되기 전, 허용 불가능한 독성 발생 전, 또는 최대 24개월까지 투여되었다. 환자가 임상적으로 안정적이고 연구자에 의해 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 질병 진행 및 페메트렉시드 중단 후에도 이 약을 투여받았다. 24개월의 치료를 완료했거나 완전 반응을 보인 환자에 대해서는 질병이 진행될 경우 이 약을 최대 1년까지 추가 투여할 수 있었다. 종양 상태에 대한 평가는 6주차, 12주차, 그리고 그 후 9주마다 수행되었다. 위약 및 화학요법을 받는 환자 중에서 독립적 평가시 질병이 진행된 경우 환자들에게는 이 약이 단독 요법으로 제공되었다.

KEYNOTE-189의 616명(410명의 이 약과 화학요법군 및 206명의 위약과 화학요법군)의 시험 참가자 베이스라인 특성은 다음과 같았다. 연령 중앙값(median age) 64세(65세 이상 49%), 남성 59%, 백인 94%, 동양인 3%, ECOG PS 0(43%) 및 1(56%), 31%는 종양 PD-L1 발현 TPS 1% 미만 및 18%는 치료 여부와는 관계없이 뇌 전이 이력이 있었다. 최종 분석 시점에서, 위약 및 화학요법군의 총 84명의 환자가 질병 진행시 이 약 단독 요법으로 교차 투여받았으며, 29명의 환자는 후속 요법으로 관문 억제제를 투여 받았다.

1차 유효성 평가지표는 전체생존(OS)과 무진행생존(PFS, RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거)이었다. 2차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 BICR에 근거한 객관적 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었다. 주요 유효성 결과는 표 36에 요약되어 있다.

표 36. 비편평 비소세포폐암 환자에 대한 이 약, 페메트렉시드 및 백금 화학요법제 치료 후 유효성

결과 (KEYNOTE-189)

평가 지표	이 약 + 페메트렉시드 + 백금 화학요법제 n=410	위약 + 페메트렉시드 + 백금 화학요법제 n=206
전체생존(OS)*		
사건 발생 환자 수 (%)	258 (63%)	163 (79%)
중앙값(개월) (95% CI)	22.0 (19.5, 24.5)	10.6 (8.7, 13.6)
위험비(HR)†(95% CI)	0.56 (0.46, 0.69)	
p-값‡	<0.00001	
무진행생존(PFS)*		
사건 발생 환자 수 (%)	337 (82%)	197 (96%)
중앙값(개월) (95% CI)	9.0 (8.1, 10.4)	4.9 (4.7, 5.5)
위험비(HR)†(95% CI)	0.49 (0.41, 0.59)	
p-값‡	<0.00001	
객관적 반응률(ORR)§		
객관적 반응률(ORR)¶% (95% CI)	48% (43, 53)	19% (14, 25)
p-값#	<0.0001	
반응지속기간(DoR)§		
중앙값(개월) (범위)	11.2 (1.1+, 18.0+)	7.8 (2.1+, 16.4+)

*최종 분석에 기초함

†층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초한 위험비(HR)

‡층화된 로그 순위 테스트 (log-rank test)에 기초함

§1차 중간 분석에 기초함

¶완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)을 보인 최상의 객관적 반응 환자를 기준으로 함

#PD-L1 상태, 백금 화학요법 및 흡연 상태에 의해 층화 된 Miettinen & Nurminen 방법에 기초함

이 연구는 이 약과 백금화학요법 및 페메트렉시드 병용 투여시 백금화학요법 및 페메트렉시드 대비 OS, PFS 및 ORR에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 7. KEYNOTE-189 치료군의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)





그림 8. KEYNOTE-189 치료군의 무진행생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-407: 치료 경험이 없는 편평 비소세포폐암 환자 대상의 병용 요법 대조 임상시험

카보플라틴과 파클리탁셀 혹은 알부민 결합 파클리탁셀과 병용한 이 약의 유효성은 무작위 배정, 이중 맹검, 다기관, 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-407에서 평가되었다. 이 임상시험의 주요 대상 환자 선정 기준은 PD-L1 종양 발현에 관계없이 전이성 편평 비소세포폐암 환자이며, 이전에 전이성 암에 대한 전신 요법을 받지 않은 환자이다. 2년 간의 치료 동안 전신 치료가 필요한 자가면역질환 환자, 면역 억제가 필요한 환자, 또는 이전 26주 이내에 30 Gy 이상의 흉부방사선을 받은 환자는 제외되었다. 종양 PD-L1 발현 (TPS 1% 미만 [음성] vs. TPS 1% 이상), 대조약 선택(파클리탁셀 또는 알부민 결합 파클리탁셀) 및 지리적 영역(동아시아 vs. 비동아시아)에 의해 층화되었다. 환자들은 시험군 또는 대조군에 무작위(1:1) 배정되었다. 연구에 사용된 약물은 모두 정맥 투여되었다.

· 이 약 200 mg 또는 위약 및 카보플라틴 AUC 6 mg/mL/min은 21일 주기의 1일차에 4 사이클 동안, 그리고 파클리탁셀 200 mg/m^2를 21일 주기의 1일차에 4 사이클 동안, 또는 알부민 결합 파클리탁셀 100 mg/m^2를 21일 주기 1일차, 8일차, 15일차에 4 사이클 동안 투여 한 후에, 이 약 200 mg 또는 위약을 3주마다 투여한다. 이 약은 1일차 화학요법 전에 투여한다.

이 약 또는 위약 치료는 RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 질병의 진행이 확인되기 전, 허용 불가능한 독성 발생 전, 또는 최대 24개월까지 계속 진행되었다. 환자가 임상적으로 안정적이고 연구자에 의해 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 질병 진행 후에도 이 약을 투여받았다. 후속 질병 진행 시 이 약을 사용한 치료를 재개하고 최대 1년까지 추가 투여할 수 있었다.

위약군 환자들 중 질병 진행이 확인된 경우 이 약을 단독 요법으로 교차 투여하였다.

종양 상태에 대한 평가는 18주까지는 6주마다, 45주까지는 9주마다, 그리고 이후에는 12주마다 수행되었다. 일차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따라 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 무진행생존(PFS) 및 전체생존(OS)이었다. 추가 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 객관적 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었다.

전체 559명의 환자가 무작위 배정(278명의 환자는 이 약, 281명은 위약)되었다. 대상 환자군 특성은 다음과 같다. 연령 중앙값 65세 (범위: 29~88), 65세 이상 55%, 남성 81%, 백인 77%, ECOG PS 0(29%) 및 1(71%) 그리고 뇌 전이 이력이 있는 환자 8%였다. 35%는 종양 PD-L1 발현 TPS 1% 미만 [음성]이었다. 19%는 동아시아에 거주하며, 60%는 파클리탁셀을 투여 받았다.

주요 유효성 결과는 표 37에 요약되어 있다.

표 37. 유효성 결과 (KEYNOTE-407)

평가 지표	이 약 카보플라틴 파클리탁셀/알부민 결합 파클리탁셀 n=278	위약 카보플라틴 파클리탁셀/알부민 결합 파클리탁셀 n=281
전체생존(OS)*		
사건 발생 수 (%)	168 (60%)	197 (70%)
중앙값(개월) (95% CI)	17.1 (14.4, 19.9)	11.6 (10.1, 13.7)
위험비(HR)†(95% CI)	0.71 (0.58, 0.88)	
p-값 (층화된 로그 순위)	0.0006	
무진행생존(PFS)*		
사건 발생 수 (%)	217 (78%)	252 (90%)
중앙값(개월) (95% CI)	8.0 (6.3, 8.4)	5.1 (4.3, 6.0)
위험비(HR)†(95% CI)	0.57 (0.47, 0.69)	
p-값 (층화된 로그 순위)	<0.0001	
객관적 반응률(ORR)‡		
객관적 반응률(ORR)§	58%	38%
(95% CI)	(52, 64)	(33, 44)
반응지속기간(DoR)‡		
반응지속기간(DoR) 중앙값(개월) (범위)	7.7 (1.1+, 14.7+)	4.8 (1.3+, 15.8+)

*최종 분석에 기초함

†층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초한 위험비(HR)

‡2차 중간 분석에 기초함

§초기 중간 분석 (이 약 병용 요법의 경우 n=101, 위약의 경우 n=102)에서 통계적으로 유의미한 차이가 관찰되었다; 위약에 대한 객관적 반응률(ORR)은 58 %[95% CI (48, 68)] 및 35 %[95% CI (26, 45)], p=0.0004이었다.

이 연구는 이 약과 카보플라틴 및 파클리탁셀(또는 알부민 결합 파클리탁셀) 병용 투여시 위약과 카보플라틴 및 파클리탁셀(또는 알부민 결합 파클리탁셀) 투여 대비 OS, PFS 및 ORR에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 9. KEYNOTE-407의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선





그림 10. KEYNOTE-407의 무진행생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선



KEYNOTE-024: 치료 경험이 없는 비소세포폐암 환자 대상의 대조 임상시험

이전에 치료 경험이 없는 비소세포폐암 환자를 대상으로 한 이 약의 유효성은 다기관, 무작위 배정, 대조 임상시험인 KEYNOTE-024에서도 평가되었다. 이 임상시험의 주요 대상 환자군 선정 기준은 PD-L1 IHC 22C3 pharmDxTM 키트를 사용한 면역조직화학(IHC) 분석에서 종양이 TPS 50% 이상의 PD-L1 발현율이 높은 전이성 비소세포폐암 환자이며 이전에 전이성 암에 대한 전신 요법을 받지 않

은 환자이다. EGFR 또는 ALK 변이가 있는 환자, 2년 간의 치료 동안 전신 치료가 필요한 자가면역 질환 환자, 또는 이전 26주 이내에 30 Gy 이상의 흉부방사선을 받은 환자는 제외되었다.
환자들은 시험군 또는 대조군으로 무작위 배정(1:1)되었다.
· 이 약 200 mg을 3주마다 투여(n=154) 또는
· 백금 함유 화학요법 중 하나 선택하여 투여(n=151)
- 페메트렉시드+카보플라틴 또는 시스플라틴 투여 후 선택적으로 페메트렉시드 유지요법(비편평 비소세포폐암에만 한정)
- 젬시타빈+시스플라틴 또는 카보플라틴
- 파클리탁셀+카보플라틴 투여 후 선택적으로 페메트렉시드 유지요법(비편평 비소세포폐암에만 한정)
환자들은 질병 진행 또는 허용 불가능한 독성 발생 전까지 이 약을 투여 받았다. 환자가 임상적으로 안정적이고 연구자에 의해 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 질병 진행 후에도 이 약을 투여받았다. 질병이 진행되지 않은 환자의 경우 최대 24개월까지 치료받을 수 있었다. 후속 질병 진행 시 이 약을 사용한 치료를 재개하고 최대 1년까지 추가 투여할 수 있었다. 종양 상태 평가는 9주마다 진행되었다. 화학요법을 받는 환자 중에서 독립적 평가시 질병이 진행된 환자들은 이 약으로 교차하여 치료를 진행하였다.
KEYNOTE-024 시험 참가자 305명 중 베이스라인 특성은 다음과 같다. 연령 중앙값(median age) 65세 (65세 이상 54%), 남성 61%, 백인 82%, 및 동양인 15% 그리고 ECOG PS 0(35%) 및 1(65%)이었다. 질병의 특성은 편평세포(18%) 및 비편평세포(82%), M1(99%) 및 뇌전이(9%)였다.
1차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 무진행생존(PFS)였다. 2차 유효성 평가지표는 전체생존(OS) 및 객관적 반응률(ORR, RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거)이었다. 주요 유효성 측정값은 표 38에 요약 되어 있다.
표 38. 유효성 결과 (KEYNOTE-024)

평가 지표	3주마다 이 약 200 mg n=154	화학요법 n=151
무진행생존(PFS)*,†		
사건 발생 환자 수 (%)	73 (47%)	116 (77%)
중앙값(개월) (95% CI)	10.3 (6.7, NA)	6.0 (4.2, 6.2)
위험비(HR)‡(95% CI)	0.50 (0.37, 0.68)	
p-값§	<0.001	
전체생존(OS)¶		
사건 발생 환자 수 (%)	73 (47%)	96 (64%)
중앙값(개월) (95% CI)	30 (18.4, NA)	14.2 (9.8, 19.0)
위험비(HR)‡(95% CI)	0.63 (0.47, 0.86)	
p-값§	0.002	
객관적 반응률(ORR)*,†		
객관적 반응률(ORR) % (95% CI)	45% (37, 53)	28% (21, 36)
반응지속기간(DoR)*,#,Þ		
중앙값(개월) (범위)	도달하지 않음 (1.9+, 14.5+)	6.3 (2.1+, 12.6+)

*중간 분석에 기초함
†RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거함
‡층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초한 위험비(HR)(화학요법 대비 이 약)
§층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함
¶최종 분석에 기초함
#최종 분석에서 확인된 완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)을 보인 최상의 객관적 반응 환자를 기

준으로 함
[b]Kaplan-Meier 추정 분석에 기초함
NA = 가용하지 않음

이 연구는 이 약 200mg을 3주마다 투여시 화학요법 대비 OS 및 PFS에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 11. KEYNOTE-024 대조군의 무진행 생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)





그림 12. KEYNOTE-024 대조군의 전체 생존(OS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-010: 이전에 화학요법으로 치료된 비소세포폐암 환자 대상의 대조 임상시험

이 약의 유효성은 다기관, 무작위 배정, 대조 임상시험인 KEYNOTE-010에서 평가되었다. 주요 대상 환자군 선정 기준은 백금 기반 화학요법제 치료 이후 진행된 비소세포폐암으로, 적절한 경우 ALK 또는 EGFR 변이에 대한 표적 치료 진행, 및 PD-L1 IHC 22C3 pharmDx™ 키트를 사용한 임상시험 분석에 의해 PD-L1 TPS 1% 이상이었다. 자가면역 질환 환자, 면역 억제 치료가 필요한 환자 및 연

구 시작 26주 이내에 30 Gy 이상의 흉부방사선을 받은 환자는 제외되었다. 환자들은 이 약 2 mg/kg(n=344) 또는 10 mg/kg(n=346)을 3주마다 투여 받거나 도세탁셀 75 mg/m^{2}를 3주마다 투여(n=343) 받도록 무작위 배정(1:1:1) 되었다. 환자들은 허용 불가능한 독성이 발생되거나 질병의 진행이 확인되기 전까지 이 약 치료를 지속하였다. 종양 상태에 대한 평가는 9주마다 진행되었다.

KEYNOTE-010 참가자 1033명의 베이스라인 특성은 다음과 같다. 연령 중앙값(median age) 63세(65세 이상 42%), 남성 61%, 백인 72% 및 동양인 21%, 그리고 ECOG PS 0(34%) 및 1(66%)이었다. 질병의 특성은 편평세포(21%) 및 비편평세포(70%), M1 (91%), 뇌전이(15%)이었다. EGFR(8%) 또는 ALK(1%) 유전적 변이가 있었다. 모든 환자가 이전의 치료로서 백금 기반 이중화학요법을 받았으며, 한 가지(69%), 또는 두 가지 이상(29%)의 이전 치료를 받았다.

1차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 전체생존(OS) 및 무진행생존(PFS)였다. 2차 유효성 평가지표는 객관적반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었다. 주요 유효성 결과는 표 39에 요약되어 있다.

표 39. 이전에 치료된 비소세포폐암 환자 대상으로 3주마다 이 약 2 또는 10 mg/kg 투여 시 유효성 결과 (KEYNOTE-010)

평가 지표	이 약 2 mg/kg 3주마다	이 약 10 mg/kg 3주마다	도세탁셀 75 mg/m^2 3주마다
TPS ≥ 1%			
환자 수	344	346	343
전체생존(OS)			
사건 발생 환자 수 (%)	172 (50%)	156 (45%)	193 (56%)
중앙값(개월) (95% CI)	10.4 (9.4, 11.9)	12.7 (10.0, 17.3)	8.5 (7.5, 9.8)
위험비(HR)*(95% CI)	0.71 (0.58, 0.88)	0.61 (0.49, 0.75)	-
p-값†	<0.001	<0.001	-
무진행생존(PFS)‡			
사건 발생 환자 수 (%)	266 (77%)	255 (74%)	257 (75%)
중앙값(개월) (95% CI)	3.9 (3.1, 4.1)	4.0 (2.6, 4.3)	4.0 (3.1, 4.2)
위험비(HR)*(95% CI)	0.88 (0.73, 1.04)	0.79 (0.66, 0.94)	-
p-값†	0.068	0.005	-
객관적 반응률(ORR)‡			
객관적 반응률(ORR) %§(95% CI)	18% (14, 23)	18% (15, 23)	9% (7, 13)
반응지속기간(DoR)‡,¶			
중앙값(개월) (범위)	도달하지 않음 (0.7+, 20.1+)	도달하지 않음 (2.1+, 17.8+)	6.2 (1.4+, 8.8+)

*층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초한 위험비(HR)(도세탁셀 대비 이 약)

†층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함


‡RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거함

§모든 반응은 부분반응(PR)임

¶완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)을 보인 최상의 객관적 반응 환자를 기준으로 함

이 연구는 이 약 2mg/kg 또는 10mg/kg을 3주마다 투여시 화학요법 대비 OS에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 13. KEYNOTE-010(TPS ≥ 1%) 대조군의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-671: 절제 가능한 비소세포폐암 환자 대상의 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 및 수술 후 보조요법(adjuvant) 대조 임상시험

수술 전 보조요법으로서 항암화학요법과의 병용 요법 후 수술, 그리고 이어서 수술 후 보조요법으로서 단독 요법으로 투여한 이 약의 유효성은 이전의 치료 경험이 없는 절제 가능한 IIA기, IIIA기, 또는 IIIB기(N2) 비소세포폐암(AJCC 8판 기준) 환자 총 797명에 대한 다기관, 무작위 배정, 이중 맹검, 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-671에서 평가되었다. 환자들은 종양 PD-L1 발현에 관계없이 모집되었다. 2년 이내 전신 치료가 필요했던 활성 자가면역질환 또는 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 가진 환자, 또는 스테로이드 투여를 필요로 했던 간질성 폐 질환이나 폐염증 병력이 있는 환자는 제외되었다. 무작위배정은 질병진행 단계(II기 vs. III기), 종양 PD-L1 발현(TPS≥50% 또는 <50%), 조직학(편평 vs. 비편평), 및 지리적 영역(동아시아 vs. 동아시아 외)에 따라 층화되었다.

환자들은 아래 치료군 중 하나에 무작위 배정(1:1)되었다:

치료군 A: 수술 전 요법으로 매 3주마다 1일차에 이 약 200 mg을 시스플라틴 75 mg/m^2 및 페메트렉시드 500 mg/m^2(1일차) 또는 젬시타빈 1000 mg/m^2(1일차와 8일차)과 병용하여 최대 4주기까지 투여한다. 수술 후 4-12주 이내, 매 3주마다 이 약 200 mg을 최대 13주기까지 투여한다.

치료군 B: 수술 전 요법으로 매 3주마다 1일차에 위약을 시스플라틴 75 mg/m^2 및 페메트렉시드 500 mg/m^2(1일차) 또는 젬시타빈 1000 mg/m^2(1일차와 8일차)과 병용하여 최대 4주기까지 투여한다. 수술 후 4-12주 이내, 매 3주마다 위약을 최대 13주기까지 투여한다.

연구에 사용된 약물들은 모두 정맥 투여되었다. 이 약 또는 위약을 사용한 치료는 치료 완료(17주기), 근치적 수술을 불가능하게 하는 질병 진행, 수술 후 보조요법 단계에서의 질병 재발, 수술을 하지 않았거나 불완전 절제 이후 수술 후 보조요법 단계로 진입한 상태에서의 질병 진행, 또는 허용 불가능한 독성 발생 전까지 지속되었다. 종양 상태에 대한 평가는 수술 전 보조요법 단계에서 기저치, 7주차 및 13주차에 수행되었고 수술 후 보조요법 단계에서 치료 시작 전 4주 이내에 수행되었다. 수술 후 보조요법 치료를 시작한 후, 종양 상태에 대한 평가는 3년까지는 매 16주마다, 그 이후에는 매 6개월마다 수행되었다.

임상시험은 치료요법의 각 단계(수술 전 보조요법 또는 수술 후 보조요법)에서 이 약의 효과를 구분할 수 있도록 설계되지 않았다.

주요 유효성 평가지표는 전체생존(OS) 및 연구자가 평가한 무사건생존(EFS)이었다. 추가 유효성 평가지표는 눈가림된 독립병리학평가(BIPR)에 근거한 병리학적 완전반응(pCR) 비율과 주요 병리학적 반응(mPR) 비율이었다.

연구 모집단 특성은 다음과 같았다: 연령 중앙값 64세(범위: 26-83세), 65세 이상 45%; 75세 이상 7%; 남성 71%; 백인 61%, 동양인 31%, 및 흑인 2%, 인종 미보고 4%; 히스패닉 또는 라틴계 9%. ECOG PS는 63% 및 37%에서 각각 0 또는 1이었다; 종합 병기 II기 30% 및 III기 70%; TPS 50% 이상 33% 및 TPS 50% 미만 67%; 편평 조직학을 지닌 종양 43% 및 비편평 조직학을 지닌 종양 57%; 동아시아 지역의 환자 31%였다.

이 약과 백금 기반 항암화학요법을 병용투여한 군에 속한 환자의 81%가 근치적 수술을 받은 것과 비교하여 위약과 백금 기반 항암화학요법을 병용투여한 군에 속한 환자의 76%가 근치적 수술을 받았다.

이 연구는 이 약과 백금 기반 항암화학요법 병용 요법에 이어 이 약 단독 요법을 투여 받은 환자에서 위약과 백금 기반 항암화학요법에 이어 위약 단독 요법을 투여받은 환자에 비해 OS 및 EFS에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증했다.

유효성 결과는 표 40 및 그림 14에 요약되어 있다.

표 40. 유효성 결과(KEYNOTE-671)

평가지표	항암화학요법과 병용하여 매 3주마다 이 약 200 mg/이 약 n=397	항암화학요법과 병용하여 위약/위약 n=400
전체생존(OS)		
사건 발생 환자 수(%)	110 (28%)	144 (36%)
중앙값(개월)*(95% CI)	NR (NR, NR)	52.4 (45.7, NR)
위험비(HR)†(95% CI)	0.72 (0.56, 0.93)	
p-값‡,§	0.0103	
무사건생존(EFS)		
사건 발생 환자 수(%)	139 (35%)	205 (51%)
중앙값(개월)*(95% CI)	NR (34.1, NR)	17.0 (14.3, 22.0)
위험비(HR)†(95% CI)	0.58 (0.46, 0.72)	
p-값‡,¶	< 0.0001	

*Kaplan-Meier 추정에 기초함

†치료를 질병진행 단계, 종양 PD-L1 발현, 조직학 및 지리적 영역에 의해 층화된 공변량으로 하는 Cox 회귀 모델에 기초함


‡층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함

§양측 p-값 경계인 0.0109과 비교함

¶양측 p-값 경계인 0.0092와 비교함

NR = 도달하지 않음

그림 14. KEYNOTE-671의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선



두경부암 (Head and Neck Cancer)

KEYNOTE-048: 두경부 편평상피세포암(Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, HNSCC) 대상의 1차 단독 요법 또는 병용 요법 대조 임상시험

이 약의 유효성은 이전에 재발성 또는 전이성 질환에 대한 전신 요법을 받지 않았거나 국소 치료를 통해 불치 판정을 받은 전이성 또는 재발성 두경부 편평상피세포암 환자를 대상으로 다기관, 무작위 배정, 공개 임상, 활성 대조군 임상시험인 KEYNOTE-048에서 평가되었다. 2년 간의 치료 동안 전신 요법을 필요로 하는 활성 자가면역질환 또는 면역 억제 치료가 필요한 환자는 제외되었다. PD-L1 IHC 22C3 pharmDx™ 키트에 따른 종양 PD-L1 발현(TPS 50% 이상 또는 50% 미만), HPV 상태 (양성 또는 음성), 및 ECOG PS(0 또는 1)에 의해 층화되었다. 환자는 다음 치료군 중 하나에 1:1:1로 무작위 배정되었다.

- 이 약 200 mg 3주마다 투여한다.
- 이 약 200 mg 3주마다 1일차에 투여, 카보플라틴 AUC 5 mg/mL/min 3주마다 1일차에 또는 시스플라틴 100 mg/m^2 3주마다 1일차에 투여 및 5-FU 1000 mg/m^2/d 4일 연속으로 3주마다 투여한다(백금과 5-FU는 최대 6 사이클).
- 세툭시맙 400 mg/m^2 투여한 후 250 mg/m^2 1주마다 1회 투여, 카보플라틴 AUC 5 mg/mL/min 3주마다 투여, 또는 시스플라틴 100 mg/m^2 3주마다 투여한 후, 5-FU 1000 mg/m^2/d 4일 연속으로 3주마다 투여한다(백금과 5-FU는 최대 6 사이클).

이 약을 이용한 치료는 RECIST 1.1에 근거하여 연구자가 판단한 정의된 질병의 진행이 확인되거나, 허용 불가능한 독성이 발생되거나, 또는 최대 24 개월까지 계속 진행되었다. 환자가 임상적으로 안정적이고 연구자에 의해 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 질병 진행 후에도 이 약을 투여받았다. 종양 상태는 9주차에, 그리고 첫 해에는 6주마다, 그 후에는 24개월까지 9주마다 평가되었다.

총 882명의 환자 중 301명의 환자가 이 약 단독요법, 281명의 환자가 이 약 및 화학요법, 그리고 300

명의 환자가 표준 치료군에 무작위 배정되었다. 임상시험 참가자의 특성은 연령 중앙값(median age) 61세(범위: 20~94세), 65세 이상 36%, 남성 83%, 백인 73%, 및 동양인 20%, ECOG PS 1(61%), 흡연이력(79%)이었다. 질병의 특성은 HPV 양성 22%, PD-L1 발현률 CPS 1 이상, CPS 20 이상, 및 TPS 50% 이상인 환자는 각각 85%, 43%, 및 23%이고, IV단계는 95%(IVa단계 19%, IVb단계 6%, 그리고 IVc단계 70%)이었다.

1차 유효성 평가지표는 전체생존(OS) 및 무진행생존(PFS, RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거)이었다. 2차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 객관적 반응률(ORR)이었다. KEYNOTE-048에서 이 약의 주요 유효성 결과는 표 41와 42 및 그림 15와 16에 나타내었다.

표 41. 이 약+화학요법 병용시 유효성 결과 (KEYNOTE-048)

평가 지표	이 약 백금 화학요법 5-FU n=281	표준 치료* n=278
전체생존(OS)		
사건 발생 환자 수 (%)	197 (70%)	223 (80%)
중앙값(개월) (95% CI)	13.0 (10.9, 14.7)	10.7 (9.3, 11.7)
위험비(HR)†(95% CI)	0.77 (0.63, 0.93)	
p-값‡	0.0033	
무진행생존(PFS)		
사건 발생 환자 수 (%)	244 (87%)	253 (91%)
중앙값(개월) (95% CI)	4.9 (4.7, 6.0)	5.1 (4.9, 6.0)
위험비(HR)†(95% CI)	0.92 (0.77, 1.10)	
p-값‡	0.1697	
객관적 반응률(ORR)		
객관적 반응률(ORR)§(95% CI)	36% (30.0, 41.5)	36% (30.7, 42.3)
p-값¶	0.5740	
반응지속기간(DoR)		
중앙값(개월) (범위)	6.7 (1.6+, 30.4+)	4.3 (1.2+, 27.9+)

*세툭시맙, 백금 화학요법 및 5-FU

†층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초함


‡층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함

§반응: 완전반응(CR) 또는 부분 반응(PR)으로 확인된 최상의 객관적 반응

¶ECOG(0 vs. 1), HPV 상태(양성 vs. 음성), 및 PD-L1 상태(strongly positive vs. not strongly positive)에 의해 층화된 Miettinen & Nurminen법에 기초함

이 연구는 이 약과 백금화학요법 및 5-FU 병용 투여시 표준 요법 대비 OS에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 15. KEYNOTE-048에서 이 약+화학요법 병용 시 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선*



*프로토콜에서 지정한 최종분석 시점에서 추적조사 중앙값 11.4개월

표 42. CPS ≥1 및 CPS ≥20인 환자군에서의 이 약 단독 요법의 유효성 결과*(KEYNOTE-048)

평가 지표	CPS ≥1		CPS ≥20	
	3주마다 이 약 200 mg n=257	세툭시맙 백금 화학요법 FU n=255	3주마다 이 약 200 mg n=133	세툭시맙 백금 화학요법 FU n=122
전체생존(OS)				
사건 발생 환자 수 (%)	177 (69%)	206 (81%)	82 (62%)	95 (78%)
중앙값(개월) (95% CI)	12.3 (10.8, 14.9)	10.3 (9.0, 11.5)	14.9 (11.6, 21.5)	10.7 (8.8, 12.8)
위험비(HR)†(95% CI)	0.78 (0.64, 0.96)		0.61 (0.45, 0.83)	
p-값‡	0.00855		0.00074	
무진행생존(PFS)				
사건 발생 환자 수 (%)	255 (88%)	231 (91%)	113 (85%)	111 (91%)
중앙값(개월) (95% CI)	3.2 (2.2, 3.4)	5.0 (4.8, 5.8)	3.4 (3.2, 3.8)	5.0 (4.8, 6.2)
위험비(HR)†(95% CI)	1.15 (0.95, 1.38)		0.97 (0.74, 1.27)	
p-값‡	0.91981		0.41028	
객관적 반응률(ORR)				
객관적 반응률 (ORR)§(95% CI)	19% (14.5, 24.4)	35% (29.1, 41.1)	23% (16.4, 31.4)	36% (27.6, 45.3)
반응지속기간(DoR)				
중앙값(개월) (범위)	20.9 (1.5+, 34.8+)	4.5 (1.2+, 28.6+)	20.9 (2.7, 34.8+)	4.2 (1.2+, 22.3+)

*미리 지정된 중간 분석 결과에 의함

†층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초함


‡층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함

§반응: 완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)으로 확인된 최상의 객관적 반응

이 연구는 CPS 1 이상 및 CPS 20 이상인 군에서 이 약 200mg을 3주마다 투여시 표준요법 대비 OS에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 16. KEYNOTE-048에서 PD-L1 발현 양성(CPS ≥1)인 환자군의 이 약 단독 요법의 전체생존(OS)

Kaplan-Meier 곡선*



*프로토콜에서 지정한 최종분석 시점에서 추적조사 중앙값 11.5개월

KEYNOTE-040: 이전에 백금 기반 화학요법제로 치료받은 경험이 있는 두경부 편평상피세포암 환자 대상의 대조 임상시험

이 약의 안전성과 유효성은 구강, 인두 또는 후두의 조직학적으로 확인된 재발성 또는 전이성 두경부 편평상피세포암의 치료를 위해 유도, 동시 또는 보조요법을 포함한 백금 기반 화학요법제로 치료받는 도중 또는 이후 질병 진행을 경험하였으며 치료 의도의 국소 요법에 적합하지 않은 재발성 또는 전이성 두경부 편평상피세포암의 치료를 위한 다기관, 공개 임상, 무작위 배정, 대조 임상시험인 KEYNOTE-040에서 평가되었다. 환자들은 PD-L1 발현(TPS 50% 이상), HPV 상태 그리고 ECOG PS에 의해 층화된 뒤 무작위 배정(1:1)되었다.

이 약 200 mg 3주마다 투여(n=247)받거나 다음 세 가지 중 한 가지의 표준 요법(n=248)을 투여받았다.

· 1주마다 메토트렉세이트 40 mg/m^2(n=64), 3주마다 도세탁셀 75 mg/m^2(n=99), 또는 세툭시맙 400 mg/m^{2}투여한 후 1주마다 250 mg/m^2(n=71).

환자가 임상적으로 안정적이고 연구자에 의해 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 질병 진행 후에도 이 약을 투여받았다. 이 연구는 비인두암, 2년 간의 치료 동안 전신 치료가 필요한 활성 자가면역 질환, 면역 억제 치료가 필요한 환자, 또는 재발성 및/또는 전이성 두경부 편평상피세포암를 위해 이전에 세 가지 이상의 전신 요법으로 치료받은 환자를 제외하였다. 종양 상태에 대한 평가는 9주차에, 그리고 52주까지 6주마다, 그 후에는 24개월까지 9주마다 진행되었다.

KEYNOTE-040에 무작위 배정된 495명의 환자중 PD-L1 IHC 22C3 pharmDx™ 키트에 의해 50% 이상의 PD-L1 발현 TPS를 갖는 환자들은 129명(26%)이었다. 129명의 베이스라인 특성은 다음과 같다. 연령 중앙값 62세(65세 이상 40%), 남성 81%, 백인 78%, 동양인 11%, 및 흑인 2%, ECOG PS 0(23%) 및 1(77%), 19%는 HPV 양성이었다. 67%는 M1 질병을 가졌으며 대다수는 IV단계(IV 단계 32%, IVa 단계 14%, IVb 단계 4%, 및 IVc 단계 44%)였다. 16%는 백금 기반의 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 또는 수술 후 보조요법(adjuvant) 화학요법 치료 후에 질병 진행이 확인되었고, 84%는 전이성 질환에 대해 1-2회의 이전 전신 요법을 받았다.

1차 유효성 평가지표는 ITT 집단에서의 전체생존(OS)였다. TPS 50% 이상인 환자군에서 주요 유효성 결과는 표 43에 요약되어 있다.

표 43. 이전에 백금 기반 화학요법제를 투여받은 TPS 50% 이상 두경부 편평상피세포암 환자에 대한 이 약 200 mg 3주마다 투여 후 유효성 결과 (KEYNOTE-040)

평가 지표	3주마다 이 약 200 mg n=64	표준 치료* n=65
전체생존(OS)		
사건 발생 환자 수 (%)	41 (64)	56 (86)
중앙값(개월) (95% CI)	11.6 (8.3, 19.5)	6.6 (4.8, 9.2)
위험비(HR)†(95% CI)	0.53 (0.35, 0.81)	
p-값‡	0.001	
무진행생존(PFS)§		
사건 발생 환자 수 (%)	52 (81)	58 (89)
중앙값(개월) (95% CI)	3.5 (2.1, 6.3)	2.1 (2.0, 2.4)
위험비(HR)†(95% CI)	0.58 (0.39, 0.86)	
p-값‡	0.003	
객관적 반응률(ORR)§		
객관적 반응률(ORR) (95% CI)	26.6 (16.3, 39.1)	9.2 (3.5, 19.0)
p-값¶	0.0009	
반응지속기간(DoR)§,#		
중앙값(개월) (범위)	도달하지 않음 (2.7, 13.8+)	6.9 (4.2, 18.8)

*메토트렉세이트, 도세탁셀 및 세툭시맙

†층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초한 위험비(HR)(표준 요법 대비 이 약)

‡로그 순위 테스트에 기반한 단측(One-sided) p-값


§RECIST 1.1에 따라 BICR 평가에 근거함

¶Miettinen & Nurminen 방법에 기초함

#최종 분석에서 확인된 완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)을 보인 최상의 객관적 반응 환자를 기준으로 함

이 연구는 TPS 50% 이상인 군에서 이 약 200mg을 3주마다 투여시 표준요법 대비 임상적으로 유의미한 결과를 보였다.

그림 17. KEYNOTE-040 PD-L1 발현(TPS 50% 이상)인 환자의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선



전형적 호지킨 림프종 (Classical Hodgkin Lymphoma)

KEYNOTE-204: 불응성 또는 재발성의 전형적 호지킨 림프종 환자 대상의 대조 임상시험

KEYNOTE-204는 불응성 또는 재발성 cHL 환자 304명을 대상으로 한 무작위 배정, 공개 임상, 활성 대조군 임상시험이다. 활동성, 비-감염성 폐염증 환자, 최근 5년 이내(또는 >5년이지만 GVHD의 증상이 있는 경우) 동종이형 조혈모세포이식수술(HSCT)을 받은 환자, 활성 자가면역질환 환자, 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 가지거나 전신 요법이 필요한 활동성 감염이 있는 환자는 제외되었다. 무작위 배정은 이전의 자가조혈모세포이식(Auto-HSCT) (예 vs. 아니오) 및 최초 치료 후 질병 상태(원발성 불응성 vs. 치료 완료 후 12개월 미만 내 재발 vs. 치료 완료 후 12개월 이상 후 재발)에 의해 층화되었다. 환자들은 다음 치료군 중 하나에 무작위 배정(1:1) 되었다.

- 이 약 200 mg을 3주마다 정맥 투여
- 브렌툭시맙 베도틴 1.8 mg/kg을 3주마다 정맥 투여

환자는 질병 진행, 또는 허용 불가능한 독성 발생 전까지 매 3주마다 이 약 200 mg을 정맥 투여받았다. 종양 상태 평가는 12주마다 실시되었다. 1차 유효성 평가지표는 2007년 개정된 IWG(International Working Group) 기준에 따른 BICR 평가에 근거한 무진행생존(PFS) 및 객관적 반응률(ORR)이었다.

KEYNOTE-204 환자에서 베이스라인 특성은 연령 중앙값(median age) 35세 (65세 이상 16%), 남성 57%, 백인 77%, ECOG PS 0(61%) 및 1(38%)이었다. 전형적 호지킨 림프종의 치료를 위해 투여된 이전의 치료 요법 횟수의 중앙값은 2회(범위: 1~11회)였다. 42%는 마지막 이전의 치료에 불응성이었고, 29%는 원발성 불응성 질환을 가졌다. 37% 환자가 자가조혈모세포이식(auto-HSCT) 경험이 있었고, 5%는 이전에 브렌툭시맙 베도틴 치료 경험이 있으며, 39%는 이전에 방사선 치료를 받았다.

이 약으로 치료받은 151명의 환자에 대한 추적 조사 중앙값은 24.9 개월(범위: 1.8~42.0개월)이었다. 유효성 결과는 표 44에 요약되어있다.

표 44. 불응성 또는 재발성 전형적 호지킨 림프종 환자의 유효성 결과

평가 지표	3주마다 이 약 200 mg n=151	브렌툭시맙 베도틴 1.8 mg/kg 3주마다 n=153
무진행생존(PFS)		
사건 발생 환자 수 (%)	81 (54%)	88 (58%)
중앙값(개월) (95% CI)	13.2 (10.9, 19.4)	8.3 (5.7, 8.8)
위험비(HR)*(95% CI)	0.65 (0.48, 0.88)	
p-값†	0.0027	
객관적 반응률(ORR)		
객관적 반응률(ORR)‡(95% CI)	66% (57.4, 73.1)	54% (46.0, 62.3)
완전반응(CR)	25%	24%
부분반응(PR)	41%	30%
p-값§	0.0225	

*Cox 비례 위험 모형에 기초함


†층화된 로그 순위 테스트 (log-rank test)에 기초함

‡완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)으로 확인된 최상의 객관적 반응 환자를 기준으로 함

§Miettinen & Nurminen 방법에 기초하여 이전의 자가조혈모세포이식수술 및 질병 상태에 의해 층화됨

이 연구는 이 약 200 mg을 3주마다 투여시 브렌툭시맙 베도틴 대비 PFS에 대한 통계적 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 18. KEYNOTE-204의 무진행생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선



KEYNOTE-087: 불응성이거나 3차 이상의 치료 이후 재발한 전형적 호지킨 림프종 환자 대상 공개 임상시험

이 약의 유효성은 불응성이거나 3차 이상의 치료 이후 재발한 전형적 호지킨 림프종 환자 210명을 대상으로 한 다기관, 비무작위, 공개 임상(KEYNOTE-087)에서 평가되었다. PD-L1 발현에 관계없이 모든 환자를 포함하였다. 활동성, 비 감염성 폐염증 환자, 최근 5년 이내(또는 5년 이상이지만 GVHD의 증상이 있는 경우) 동종이형 조혈모세포이식수술(HSCT)을 받은 환자, 활성 자가면역질환 환자, 면역 억제 치료가 필요한 환자는 모두 제외되었다. 환자들은 허용 불가능한 독성 발생 혹은 질환이 재발하기 전까지 이 약 200 mg을 3주마다 투여했다. PET CT 스캔으로 수정된 림프종 기준으로 반응 여부를 평가했으며 12주차에 첫번째 계획된 기준 시점 이후 스캔을 실시했다. 1차 유효성 평가지표인 객관적 반응률(ORR), 완전관해(CR) 및 반응지속기간(DoR)은 2007년 개정된 IWG 기준에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거하였다. 2차 유효성 평가지표는 무진행생존(PFS) 및 전체생존(OS)이었다.

KEYNOTE-087 환자에서 베이스라인 특성은 연령 중앙값(median age) 35세(65세 이상 9%), 남성 54%, 백인 88%, 그리고 ECOG PS 0(45%) 및 1(51%)이었다. 전형적 호지킨 림프종의 치료를 위해 투여된 이전 치료의 중앙값은 4(범위: 1~12)이었다. 81%는 적어도 한 가지 이상의 이전의 치료에 불응성이었고, 이 중 1차 치료에 불응성인 환자 34%가 포함되어있다. 61% 환자가 자가조혈모세포이식수술(auto-HSCT) 경험이 있었고, 38%는 이식 부적격자였으며, 17%는 이전에 브렌툭시맙베도틴 치료를 받은 경험이 없었고, 37%의 환자는 이전에 방사선 치료를 받았다.

유효성 결과는 표 45에 요약되어 있다.

표 45. 불응성 또는 재발성의 전형적 호지킨 림프종 환자의 유효성 결과

평가 지표	3주마다 이 약 200mg n=210
객관적 반응률(ORR)*	
객관적 반응률(ORR) % (95% CI)	71% (64, 77)
완전관해(CR)	28%
부분관해(PR)	43%
반응지속기간(DoR)*	
중앙값(개월) (범위)	16.6 (0.0+, 39.1+)†
≥12개월 반응지속기간(DoR) %	59%Þ
무진행생존(PFS)*	
중앙값(개월) (95% CI)	13.6 (11.1, 16.7)
전체생존(OS)	
6개월 전체생존(OS) 비율	99.5%
9개월 전체생존(OS) 비율	96.1%

*2007년 개정된 IWG(International Working Group)에 따른 BICR 평가에 근거함
†독립 검토에 응답한 환자(n=149)에 기초함
PKaplan-Meier 추정 분석에 기초함; 12개월 이상의 반응을 보인 60명의 환자 포함
이 연구는 이 약 200mg을 3주마다 투여시 ORR, CR 및 PR에 대한 임상적으로 유의미한 결과를 보였다.
요로상피암 (Urothelial Carcinoma)
KEYNOTE-052: 백금기반 항암화학요법이 불가능한 요로상피암 환자 대상 공개 임상시험
이 약의 유효성은 백금 기반 항암화학요법이 불가능한 환자를 포함하여 하나 이상의 동반질환을 지닌 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 환자 370명을대상으로 다기관, 공개 임상, 단일군 임상시험인 KEYNOTE-052에서 평가되었다. 이 시험에서 자가면역질환 환자 또는 면역 억제 치료가 필요한 환자는 제외되었다. 환자들은 허용 불가능한 독성 발생이나 질병 진행 전까지 이 약 200 mg을 3주마다 투여 받았다. 초기 방사선학적으로 질병 진행을 보인 환자들은 질병 진행의 증상이 있거나, 빠른 진행이거나, 신속한 개입이 필요한 경우이거나, 활동 상태가 저하된 상태에서 발생하지 않은 한 질병 진행 중에도 추가 투약을 받을 수 있었다. 질병 진행이 없는 환자의 경우 최대 24개월까지 치료받을 수 있었다.종양 반응 평가는 1차 투여 9주 후, 그 후 첫 해에는 6주마다, 그 후 12주마다 수행되었다. 주요 유효성 결과 측정값은 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 의해 평가된 객관적 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었으며, 최대 10개의 표적 병변과 장기당 최대 5개의 표적 병변을 따르도록 수정되었다.
환자의 베이스라인 특성은 다음과 같다. 연령 중앙값(median age) 74세, 남성 77%, 그리고 백인 89%이었다. 87%는 M1, 13%는 M0 상태였다. 81%는 하부 요로에 원발성 종양을 가졌으며, 19%는 상부 요로에 원발성 종양이 있었다. 85%는 내장전이가 있었으며, 이는 21%의 간 전이를 포함한다. 50%는 기저 크레아티닌 클리어런스가 60 미만 mL/min이었고, 32%는 ECOG PS가 2, 9%는 ECOG PS가 2이면서 기저 크레아티닌 클리어런스가 60 미만 mL/min이었으며, 9%는 3급 심장 부전, 2급 이상 말초신경병증, 2급 이상 청력 소실 중 하나 이상에 해당되었다. 90%의 환자는 치료 경험이 없었으며, 10%는 이전에 수술 후 보조요법(adjuvant) 또는 수술 전 보조요법(neoadjuvant)으로 백금 기반 화학요법을 받았다.
이 약으로 치료받은 환자 370명의 추적 관찰 기간은 중앙값은 11.4개월(범위 0.1-63.8개월)이었다. 유효성 결과는 표 46에 요약되어 있다.
표 46. 유효성 결과(KEYNOTE-052)

평가 지표	3주마다 이 약 200 mg 모든 환자군 n=370
객관적 반응률(ORR)	
객관적 반응률(ORR) (95% CI)	29% (24, 34)
완전 반응(CR)	10%
부분 반응(PR)	20%
반응지속기간(DoR)	
중앙값(개월) (범위)	33.4 (1.4+, 60.7+)

+진행중임을 나타냄
이전에 치료 경험이 없는 백금 기반 항암화학요법 가능 환자
이 약의 유효성은 이전에 치료 경험이 없는 백금 기반 항암화학요법이 가능한 1010명의 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 환자 대상에서의 1차 치료로써 다기관, 무작위 배정, 공개 임상, 활성 대조군 임상시험인 KEYNOTE-361에서 평가되었다. 이전에 치료 경험이 없는 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 환자에서 백금 기반 항암화학요법 병용에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.

이 시험은 이 약을 백금 기반 항암화학요법(즉, 젬시타빈과 시스플라틴 또는 카보플라틴)과 병용하거나 병용하지 않은 단독요법으로서 백금 기반 항암화학요법과 비교하였다. 이 약과 백금 기반 항암화학요법을 병용한 환자 중 44%는 시스플라틴, 56%는 카보플라틴을 투여하였다.
이 시험은 이 약과 항암화학요법 병용 군에서 항암화학요법 단독 군 대비 주요 유효성 평가지표인 PFS 또는 OS 의 개선을 충족하지 못 하였다. 추가 유효성 평가지표는, 이 약 단독요법의 OS 개선을 포함하여 공식적으로 검증되지 않았다.
KEYNOTE-045: 이전에 백금 기반 화학요법제 치료를 받은 요로상피암 환자 대상의 대조 임상시험
이 약의 유효성은 백금 기반 화학요법제 치료 도중 또는 이후에 질병 진행이 확인된 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 환자를 대상으로 다기관, 무작위 배정(1:1), 활성 대조군(active-control) 임상시험인 KEYNOTE-045에서 평가되었다. 자가면역질환 환자, 면역 억제를 필요로 하는 환자는 이 시험에서 제외되었다.
환자들은 3주마다 이 약 200 mg를 정맥으로 투여(n=270) 또는 연구자가 선택한 다음 화학요법 중 하나를 3주마다 정맥으로 투여(n=272) 받았다.
· 파클리탁셀 175 mg/m^2(n=84), 도세탁셀 75 mg/m^2(n=84), 또는 빈플루닌 320 mg/m^2(n=87).
허용 불가능한 독성이나 질병 진행이 확인되기 전까지 환자들은 이 약 치료를 받았다. 질병 진행의 초기 증상을 보였으나 임상적으로 안정된 환자들은 질병 진행이 확인될 때까지 치료를 유지하도록 허용되었다. 질병 진행이 없는 환자의 경우 최대 24개월까지 치료받을 수 있었다. 후속 질병 진행 시 이 약을 사용한 치료를 재개하고 최대 1년까지 추가 투여할 수 있었다. 종양 상태 평가는 무작위 배정 9주 후, 그 후 첫 해에는 6주마다, 그 후 12주마다 수행되었다. 1차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 전체생존(OS) 및 무진행생존(PFS)였다. 2차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 객관적 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었다.
무작위 배정된 542명의 환자들 중, 시험 참여군의 특성은 다음과 같다. 연령 중앙값 66세(범위: 26~88세), 65세 이상 58%, 남성 74%, 백인 72%, 그리고 동양인 23%이었다. 57%는 ECOG PS가 1 이상이며; M1 96%, M0 4%이다. 87%는 내장전이가 있었으며, 이 중 34%의 간 전이를 포함한다. 86%는 하부 요로에 원발성 종양을 가졌으며, 14%는 상부 요로에 원발성 종양이 있었다. 환자의 15%는 가장 최근 치료로 수술 후 보조요법(adjuvant) 또는 수술 전 보조요법(neoadjuvant)으로 백금 기반 화학요법을 받은 후 질병 진행이 있었다. 21%는 이전에 전이상태에서 2가지 이상의 전신 치료를 받은 적이 있다. 76%는 이전에 시스플라틴 치료를 받았으며, 23%는 카보플라틴, 그리고 1%는 다른 백금 기반 화학요법을 받았다.
유효성 결과는 표 47에 요약되어 있다.
표 47. 이전에 화학요법치료제 치료를 받은 요로상피암 환자의 유효성 결과

평가 지표	3주마다 이 약 200 mg n=270	화학요법 n=272
전체생존(OS)*		
사건 발생 환자 수 (%)	200 (74%)	219 (81%)
중앙값(개월) (95% CI)	10.1 (8.0, 12.3)	7.3 (6.1, 8.1)
위험비(HR)†(95% CI)	0.70 (0.57, 0.85)	
p-값‡	<0.001	
무진행생존(PFS)§		
사건 발생 환자 수 (%)	218 (81%)	219 (81%)
중앙값(개월) (95% CI)	2.1 (2.0, 2.2)	3.3 (2.3, 3.5)
위험비(HR)†(95% CI)	0.98 (0.81, 1.19)	
p-값‡	0.416	

객관적 반응률(ORR)[§]		
객관적 반응률(ORR) % (95% CI)	21% (16, 27)	11% (8, 16)
p-값[¶]	0.001	
반응지속기간(DoR)[§,#]		
중앙값(개월) (범위)	도달하지 않음 (1.6+, 15.6+)	4.3 (1.4+, 15.4+)

[*]최종 분석에 기초함

[†]층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초한 위험비(HR)(화학요법 대비 이 약)

[‡]층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함


[§]RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거함

[¶]Miettinen & Nurminen 방법에 기초함

[#]완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)을 보인 최상의 객관적 반응 환자를 기준으로 함

이 연구는 이 약 200mg을 3주마다 투여시 화학요법 대비 OS 및 ORR에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 19. KEYNOTE-045 치료군의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-057: BCG-불응 고위험 비근침습성 방광암(Non-Muscle Invasive Bladder Cancer, NMIBC)

이 약의 유효성은 방광 절제술이 불가능하거나 시행을 선택하지 않았으며, 유두종 유무에 상관없이 상피내암을 동반한 BCG-불응 고위험 비근침습성 방광암(NMIBC) 환자 96명을 대상으로 다기관, 공개 임상, 단일군 임상시험인 KEYNOTE-057에서 평가되었다. BCG-불응 고위험 NMIBC는 적절한 BCG 치료 후에도 지속성인 질병, 적절한 BCG 치료를 통해 종양이 없는 상태 후 질병 재발, 또는 BCG의 단일 유도 과정 후 T1 질환이 발생한 경우로 정의되었다. 치료 전 모든 환자들은 적절한 BCG 치료를 받았으며, 모든 절제 가능한 병변(Ta 및 T1 성분)을 제거하고 근침습성 질환의 부재를 보장하기 위해 방광경 검사 및 경요도방광암절제술(TURBT)을 받았다. 완전한 절제가 불가능한 잔여 CIS(Tis 성분)는 허용되었다. 이 시험에서 근침습성(예: T2, T3, T4)이 국소적으로 진행된 절제 불가능한 또는 전이성 요로상피세포암, 방광외막(예: 요도, 요관 또는 신우) 비근침습성 이행 요로상피세포암, 자가면역질환 환자 또는 면역 억제 치료가 필요한 환자는 제외되었다.

환자들은 허용 불가능한 독성이나, 지속성 또는 재발성 고위험 NMIBC, 또는 진행 병변이 확인되기 전까지 이 약 200 mg을 3주마다 투여 받았다. 종양 상태에 대한 평가는 12주마다 진행되며, 질병 진

행이 없는 환자의 경우 최대 24개월까지 치료받을 수 있었다. 1차 유효성 평가지표는 방광경 검사에 대한 음성 결과[해당되는 경우 TURBT/biopsies 포함], 요세포검사, 전산화 단층촬영 요로 조영술[CTU]로 정의한 완전반응(CR)과 반응지속기간(DoR)이었다.

시험 참가자 특성은 다음과 같다. 연령 중앙값(median age) 73세(65세 이상 69%), 남성 84%, 백인 67%, 그리고 ECOG 결과가 0 또는 1이 각각 73%와 27%였다. 연구 초기의 종양 패턴은 T1 CIS (13%), TA 등급이 높은 CIS(25%), 및 CIS(63%)였다. 기준선 고위험 NMIBC 질환 상태는 27%가 지속성이고 73%가 재발성이었다. BCG의 이전 주입 횟수의 중앙값은 12회였다.

추적 관찰 기간의 중앙값은 28개월(범위: 4.6~40.5개월)이었다. 유효성 결과는 표 48에 요약되어 있다.

표 48. BCG-불응 고위험 NMIBC 환자의 유효성 결과

평가 지표	3주마다 이 약 200mg n=96
완전반응(CR) 비율*	41%
반응지속기간(DoR)†	
중앙값(개월) (범위)	16.2 (0.0+, 30.4+)
≥12개월 반응지속기간(DoR)의 환자 %	57%‡

*방광경 검사에 대한 음성 결과(해당되는 경우 TURBT/biopsies 포함), 요세포검사, 전산화 단층촬영 요로 조영술(CTU)에 기초함

†지속 기간은 완전반응(CR)이 달성된 기간을 반영함

‡Kaplan-Meier 추정 분석에 기초함; 12개월 이상의 반응을 보인 18명의 환자 포함

이 연구는 이 약 200mg을 3주마다 투여시 CR 및 DoR에 대한 임상적으로 유의미한 결과를 보였다.

위암(Gastric Cancer)

KEYNOTE-811: 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 HER2 양성 위 또는 위식도접합부 선암의 1차 치료

이 약과 트라스투주맙과 플루오로피리미딘 및 백금 화학요법제 병용 요법의 유효성은 PD-L1 발현 여부와 관계없이, 이전에 전이성 질환에 대한 전신치료 경험이 없는 HER2 양성 진행성 위 또는 위식도접합부 선암 환자 698명이 등록된 다기관, 무작위, 이중 맹검, 위약 대조군 임상시험인 KEYNOTE-811에서 평가되었다. 이 임상시험에서는 2년 이내 전신 치료가 필요했던 자가면역질환 환자 또는 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 가진 환자는 제외했다. 무작위배정은 PD-L1 발현여부(CPS≥1 또는 <1), 항암화학요법(5-FU 및 시스플라틴[FP] 또는 카페시타빈 및 옥살리플라틴[CAPOX]), 그리고 지리적 영역(유럽/ 이스라엘/ 북미/ 호주, 아시아 또는 기타 국가들)에 의해 층화되었다. 환자들은 다음 치료군 중 하나에 무작위 배정(1:1)되었다; 경구 카페시타빈을 제외한 모든 치료 약물은 매 3주마다 정맥 점적주입되었다:

•이 약 200mg, 트라스투주맙 첫 주입으로 8mg/kg과 후속 주기에는 6mg/kg 투약하며, 이어서 화학요법은 연구진의 선택으로 시스플라틴 80mg/m^2 최대 6주기 및 5-FU 800mg/m^2/day 5일간 병용(FP) 또는 옥살리플라틴 130mg/m^2 최대 6-8주기 및 카페시타빈 1000mg/m^2 14일간 1일 2회 병용(CAPOX) 하였다. 이 약은 매 주기 첫날 트라스투주맙 및 항암화학요법 투여 이전에 투여되었다.

• 위약, 트라스투주맙 첫 주입으로 8mg/kg과 후속 주기에는 6mg/kg 투약하며, 이어서 화학요법은 연구진의 선택으로 시스플라틴 80mg/m^2최대 6주기 및 5-FU 800mg/m^2/day 5일간 병용(FP) 또는 옥살리플라틴 130mg/m^2 최대 6-8주기 및 카페시타빈 1000mg/m^2 14일간 1일 2회 병용(CAPOX) 하였다. 위약은 매 주기 첫날 트라스투주맙 및 항암화학요법 투여 이전에 투여되었다.

이 약과 트라스투주맙 및 항암화학요법의 병용 요법 또는 위약과 트라스투주맙 및 항암화학요법의 병용 요법은 RECIST v1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 질병의 진행이 확인되기 전, 허용 불가능한 독성 발생 전, 또는 최대 24개월까지 계속 진행되었다. 종양 상태에 대한 평가는 6주마다 수행되었다.

KEYNOTE-811 연구에서 무작위 배정된 698명의 환자 중, 594명(85%)은 PD-L1 IHC 22C3 pharmDx™

키트를 사용하여 PD-L1 종양 발현이 CPS≥1로 나타났다. 이 594명의 인구학적 특성은: 연령 중앙값(median age) 63세(범위: 19-85), 65세 이상 43%, 남성 80%, 백인 63%, 동양인 33%, 흑인 0.7%, ECOG PS 0 42%, 그리고 ECOG PS 1 58%였다. 98%의 환자는 전이성 질환(stage Ⅳ)이었고, 2%는 절제 불가능한 국소 진행성 질환이었다. 95%(n=562)의 환자는 MSI-H가 아니었으며, 1%(n=8)의 환자는 MSI-H였고, 4%(n=24)의 환자는 정보가 확인되지 않았다. 85%의 환자가 CAPOX 항암화학요법을 받았다.

일차 평가변수는 RECIST v1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 무진행 생존(PFS)과 전체생존(OS)이었다. 이차 평가변수는 RECIST v1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 객관적반응률(ORR)과 반응지속기간(DoR)이었다.

1차 중간 분석은 전체 무작위 배정 집단 중 264명의 환자를 대상으로 진행되었고(이 약군 133명과 위약군 131명), 객관적반응률에 대한 통계적으로 유의한 개선이 확인되었다(74.4% vs. 51.9%, 22.7% 차이; 95% CI(11.2, 33.7), p-값 0.00006).

2차 중간 분석은 전체 환자군을 대상으로 진행되었고, 이 약과 트라스투주맙 및 항암화학요법의 병용 요법군에서 위약과 트라스투주맙 및 항암화학요법 병용 요법군 대비 통계적으로 유의한 PFS의 개선을 입증하였다(HR 0.72, 95% CI 0.60, 0.87, p-값 0.0002). 전체 환자군을 대상으로 진행한 이번 분석 시점에서는 전체 생존에 대한 통계적인 유의성은 확인되지 않았다.

사전 지정된 PD-L1 발현이 CPS≥1 이상인 환자군에 대한 2차 중간분석 결과는 표 49, 그림 20 및 그림 21에 요약되어 있다.

표 49. PD-L1 발현이 CPS≥1 이상인 환자군에 대한 유효성 결과

평가 지표	이 약 200mg 매 3주에 1회 트라스투주맙 플루오로피리미딘 및 백금화학요법 n=298	위약 트라스투주맙 플루오로피리미딘 및 백금화학요법 n=296
무진행생존(PFS)		
사건 발생 환자 수 (%)	199 (67%)	215 (73%)
중앙값(개월) (95% CI)	10.8 (8.5, 12.5)	7.2 (6.8, 8.4)
위험비(HR)*(95% CI)	0.70 (0.58, 0.85)	
p-값†	0.0001	
전체생존(OS)		
사건 발생 환자 수 (%)	167 (56%)	183 (62%)
중앙값(개월) (95% CI)	20.5 (18.2, 24.3)	15.6 (13.5, 18.6)
위험비(HR)*(95% CI)	0.79 (0.64, 0.98)	
p-값†	0.0143	
객관적 반응률(ORR)		
객관적 반응률‡(95% CI)	73% (67.7, 78.1)	58% (52.6, 64.1)
완전 반응률	14%	10%
부분 반응률	59%	49%
차이§(95% CI)	15% (7, 22)	
p-값§	0.00008	
반응지속기간	n=218	n=173
중앙값(개월) (범위)	11.3 (1.1+, 40.1+)	9.5 (1.4+, 38.3+)
≥6개월 반응지속기간 (DoR) %¶	75%	67%
≥12개월 반응지속기간 (DoR) %¶	49%	41%

*층화되지않은 Cox 비례 위험 모형에 기초함

†층화되지않은 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함; p-값은 명목적 p-값임

‡반응: 완전 반응 또는 부분 반응으로 확인된 최상의 객관적 반응
§층화되지않은 Miettinen & Nurminen 방법에 기초함; p-값은 명목적 p-값임
¶Kaplan-Meier estimation에 기초함

그림20. KEYNOTE-811에서 PD-L1 발현 양성(CPS≥1)인 치료군의 무진행생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선





그림21. KEYNOTE-811에서 PD-L1 발현 양성(CPS≥1)인 치료군의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선



KEYNOTE-859: 이전에 치료 경험이 없는 HER2 음성 위암에서 병용 요법 대조 임상시험
이 약과 플루오로피리미딘 및 백금 화학요법과의 병용요법의 유효성은 PD-L1 발현여부와 관계 없이 이전에 전이성 질환에 대한 전신 치료를 받은 경험이 없는 HER2 음성 진행성 위 또는 위식도접합부 선암 환자 1579명을 대상으로 다기관, 무작위 배정, 이중 맹검, 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-859에서 평가되었다.
2년 이내 전신 치료가 필요했던 자가면역질환 환자 또는 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 가진 환자는 제외되었다. 무작위화는 PD-L1 발현여부(CPS≥1 또는 <1), 화학요법(5-FU 및 시스플라틴[FP] 또는 카페시타빈 및 옥살리플라틴[CAPOX]), 그리고 지리적 영역(유럽/ 이스라엘/ 북미/ 호주, 아시아 또는 기타 국가들)으로 층화되었다. 환자들은 다음 치료군 중 하나에 무작위 배정(1:1)되었다; 경구 카페시타빈을 제외한 모든 치료 약물은 매 3주마다 정맥 점적주입되었다:
• 이 약 200mg, 연구진의 선택으로 시스플라틴 80mg/m^2 및 5-FU 1일 800mg/m^2 5일 투여[FP] 또는 옥살리플라틴 130mg/m^2 및 카페시타빈 1000mg/m^2 1일 2회 14일 투여[CAPOX]를 최대 35주기 동안 투여. 이 약은 매 주기 첫날 화학요법 투여 이전에 투여되었다.

• 위약, 연구진의 선택으로 시스플라틴 80mg/m^2 및 5-FU 1일 800mg/m^2 5일 투여[FP] 또는 옥살리플라틴 130mg/m^2 및 카페시타빈 1000mg/m^2 1일 2회 14일 투여[CAPOX]를 최대 35주기 동안 투여. 위약은 매 주기 첫날 화학요법 투여 이전에 투여되었다.

이 약과 화학요법의 병용 요법 또는 위약과 화학요법의 병용 요법은 RECIST v1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 질병의 진행이 확인되기 전, 허용 불가능한 독성 발생 전, 또는 최대 24개월까지 계속 진행되었다. 치료는 환자가 임상적으로 안정적이고 연구자에 의해 임상적 이익을 도출하는 것으로 간주되는 경우 RECIST가 정의한 질병 진행 후에도 허용되었다. 종양 상태에 대한 평가는 6주마다 수행되었다. 일차 평가변수는 전체생존(OS)였다. 추가적인 이차 평가변수는 RECIST v1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 무진행 생존(PFS), 객관적반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR) 이었다.

인구학적 특성은: 연령 중앙값(median age) 62세(범위: 21-86), 65세 이상 39%, 남성 68%, 백인 55%, 동양인 34%, ECOG PS 0 37%, 그리고 ECOG PS 1 63%였다. 97%의 환자는 전이성 질환(stage Ⅳ)이었고, 3%는 절제 불가능한 국소 진행성 질환이었다. 78%는 PD-L1 발현 CPS≥1인 종양을 가졌고, 5%(n=74)의 환자는 MSI-H 인 종양을 가졌다. 86%의 환자가 CAPOX 항암화학요법을 받았다.

이 약과 화학요법 병용 요법에 배정된 환자군에서 위약과 화학요법 병용 요법에 비해 통계적으로 유의한 OS, PFS 및 ORR의 개선이 입증되었다. 유효성 결과는 표50에 요약되어 있다.

표 50. KEYNOTE-859의 유효성 결과

평가지표	**이 약 200mg 3주마다 FP 또는 CAPOX n=790**	**위약 FP 또는 CAPOX n=789**
전체생존(OS)		
사전 발생 환자 수(%)	603 (76)	666 (84)
중앙값(개월)* (95% CI)	12.9 (11.9, 14.0)	11.5 (10.6, 12.1)
위험비(HR)†(95% CI)	0.78 (0.70, 0.87)	
p-값‡	<0.0001	
무진행생존(PFS)		
사전 발생 환자 수(%)	572 (72)	608 (77)
중앙값(개월)* (95% CI)	6.9 (6.3, 7.2)	5.6 (5.5, 5.7)
위험비(HR)† (95% CI)	0.76 (0.67, 0.85)	
p-값‡	<0.0001	
객관적 반응률(ORR)		
객관적 반응률§(95% CI)	51% (47.7, 54.8)	42% (38.5, 45.5)
완전 반응률	9%	6%
부분 반응률	42%	36%
차이 (95% CI)	9% (4.4, 14.1)	
p-값¶	0.00009	
반응지속기간	n=405	n=331
중앙값(개월) (범위)	8.0 (1.2+, 41.5+)	5.7 (1.3+, 34.7+)
≥12개월 반응지속기간(DoR) %*	39%	26%

≥24개월 반응지속기간(DoR) %*	27%	13%

* Kaplan-Meier 추정 분석에 기초함

† 층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초함

‡ 층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초한 단측(one-sided) p-값

§ 완전 반응(CR) 또는 부분 반응(PR)으로 확인된 최상의 객관적 반응

¶ 층화된 Miettinen & Nurminen 방법에 기초한 단측(one-sided) p-값

그림22. KEYNOTE-859에서 치료군의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선





그림23. KEYNOTE-859에서 치료군의 무진행생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선



식도암(Esophageal Cancer)

KEYNOTE-590: 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 식도암/위식도 접합부암의 1차 치료

이 약의 유효성은 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 식도암 및 위식도 접합부암(Siewert type I)의 1차 치료로써, 환자 749명을 대상으로 다기관, 무작위 배정, 위약 대조 임상시험인

KEYNOTE-590에서 평가되었다. 중앙 실험실에서 PD-L1 검사를 위한 모든 환자의 종양 표본이 필요했고, PD-L1 IHC 22C3 pharmDx™ 키트를 사용하여 종양 PD-L1 발현을 결정했다. 활성 자가면역질환 또는 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 가진 환자, 또는 HER-2 양성 위식도 접합부(GEJ) 선암종 환자는 제외되었다. 무작위화는 종양 조직학(편평 세포 암종 vs. 선암종), 지리적 영역(아시아 vs. 아시아 외) 및 ECOG PS(0 vs. 1)에 의해 층화되었다.

환자는 시험군 또는 대조군에 무작위 배정(1:1)되었고, 모든 시험 약물은 정맥 점적주입되었다.

· 이 약 200mg 또는 위약을 매 3주 1일차에 투여하며, 시스플라틴 80 mg/m^2매 3주 1일차에 6사이클까지 그리고 5-FU 800 mg/m^2매 3주 1일차부터 5일차까지 투여하거나, 지역 표준 치료법에 따라 병용 투여했다.

이 약 또는 화학요법은 허용 불가능한 독성 발생 전이나 질병의 진행이 확인되기 전까지 계속 진행되었다. 이 약에 무작위 배정된 환자는 최소 4주 이후 반복 영상으로 질병 진행의 방사선 근거가 처음 확인될 때까지 임상적으로 안정한 경우 처음 RECIST v1.1가 정의한 질병 진행 후에도 허용되었다. 질병 진행이 없는 환자의 경우 최대 24개월까지 치료받을 수 있었다. 종양 상태에 대한 평가는 9주마다 수행되었다. 1차 유효성 평가지표는 조직학적 편평 세포, CPS ≥10 및 전체 환자군에서 RECIST1.1에 따라 연구자가 평가한 OS와 PFS이었다. 이 연구는 사전에 지정된 모든 시험군에 대해 OS 및 PFS에서 통계적으로 유의미한 개선을 보였다. 2차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 근거하여 연구자가 평가한 ORR 및 DoR이었다.

KEYNOTE-590에서 749명의 환자 중 383명(51%)이 PD-L1 발현 CPS≥10인 종양을 가졌다. 이러한 383명의 시험 참가자의 특성은 다음과 같다: 연령 중앙값 63세(범위: 28-89세), 65세 이상 41%; 남성 82%; 백인 34% 그리고 아시아인 56%; ECOG PS 0 43% 그리고 ECOG PS 1 57%. 93%는 M1 질병을 가졌으며, 7%는 M0 질병을 가졌다. 종양 조직학적으로 75%는 편평 세포 암종을 가졌고, 25%는 선암종을 가졌다.

KEYNOTE-590에서 PD-L1 발현 CPS≥10인 종양을 가진 환자에서의 주요 유효성 결과는 사전 지정된 분석으로 표 51에 요약되어 있다. OS 및 PFS의 Kaplan-Meier 곡선은 그림 24 및 25에 나타내고 있다.

표 51. PD-L1 발현(CPS ≥10)에서 이 약 + 화학요법제의 유효성 결과(KEYNOTE-590)

평가 지표	이 약 200 mg 3주마다 시스플라틴 5-FU n=186	위약 시스플라틴 5-FU n=197
전체 생존(OS)		
사건 발생 환자 수 (%)	124 (66.7%)	165 (83.8%)
중앙값(개월)* (95% CI)	13.5 (11.1, 15.6)	9.4 (8.0, 10.7)
위험비(HR)†(95% CI)	0.62 (0.49, 0.78)	
p -값(층화된 로그 순위)§	<0.0001	
무진행 생존(PFS)‡		
사건 발생 환자 수 (%)	140 (75.3%)	174 (88.3%)
중앙값(개월)* (95% CI)	7.5 (6.2, 8.2)	5.5 (4.3, 6.0)
위험비(HR)†(95% CI)	0.51 (0.41, 0.65)	
p-값 (층화된 로그 순위)§	<0.0001	
객관적 반응률(ORR)‡		
객관적 반응률(ORR)§(95% CI)	51.1 (43.7, 58.5)	26.9 (20.8, 33.7)
p-값¶	< 0.0001	
반응지속기간(DoR)‡,#		
반응지속기간(DoR) 중앙값(개월) (범위)	10.4 (1.9, 28.9+)	5.6 (1.5+, 25.0+)

*Kaplan-Meier 추정 분석에 기초함
†층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초함
‡RECIST 1.1에 따른 연구자의 평가에 근거함
§지리적 영역(아시아 vs. 기타 국가들), 종양 조직학(선암종 vs. 편평 세포 암종) 및 ECOG PS(0 vs. 1)에 따라 층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초한 단측(one-sided) p-값
¶검정을 위한 단측(one-sided) p-값. H0: %의 차이=0 vs. H1 : %의 차이>0
#완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)으로 확인된 최상의 객관적 반응

그림 24. KEYNOTE-590에서 PD-L1 발현 양성(CPS≥10)인 치료군의 전체 생존(OS) Kaplan-Meier 곡선





그림 25. KEYNOTE-590에서 PD-L1 발현 양성(CPS≥10)인 치료군의 무진행 생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선



신세포암(Renal Cell Carcinoma)

KEYNOTE-426: 치료 경험이 없는 진행성 신세포암 환자 대상의 병용 요법 대조 임상시험

엑시티닙과 병용한 이 약의 유효성은 PD-L1 종양 상태 및 IMDC(International Metastatic RCC Database Consortium)의 위험 범주와 관계없이 진행성 신세포암 환자를 대상으로 무작위 배정, 다기관, 공개 임상, 활성 대조군 임상시험인 KEYNOTE-426에서 평가되었다. 이 임상시험에서는 자가면역질환 환자 또는 면역 억제 치료가 필요한 환자는 제외했다. IMDC기준 위험 범주[저위험(favorable) vs. 중간위험(intermediate) vs. 고위험(poor)] 및 지리적 영역(북미 vs. 서유럽 vs. 기타 국가들)으로 층화되었다. 환자들은 다음 치료군 중 하나에 무작위 배정(1:1)되었다:

· 엑시티닙 5 mg 1일 2회 경구투여와 병용하여 이 약 200 mg을 3주마다 정맥 투여한다.

* 엑시티닙의 경우,

- 2급 초과하는 치료 관련 부작용이 없으며 혈압이 150/90 mmHg 이하로 잘 조절되는 상태에서 엑시티닙 1일 2회 5 mg을 2회 연속 치료 주기(즉, 6주)동안 용인한 환자들은 1일 2회 7 mg으로 엑시티닙의 용량 증가가 허용되었다.
- 동일한 기준을 사용하여 1일 2회 10 mg까지 엑시티닙의 용량 증가가 허용되었다.
- 엑시티닙은 독성을 관리하기 위하여 1일 2회 3 mg으로, 이어서 1일 2회 2 mg으로 감량하거나 중단할 수 있다.

· 4주 동안 수니티닙 50 mg를 1일 1회 경구투여한 후 2주 동안 투여를 중단한다.

이 약과 엑시티닙을 병용한 치료는 RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 질병의 진행, 허용 불가능한 독성의 발생, 또는 이 약의 경우, 최대 24개월까지 진행되었다. 연구자에 의해 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 질병 진행 후에도 이 약 및 엑시티닙의 투여는 허용되었다. 종양 상태에 대한 평가는 기준 시점에 시작하여, 무작위 배정 후 12주차에 진행되었으며, 그 후 6주마다 54주까지, 그 후에는 12주마다 수행되었다. 화학 및 혈액학 실험실 검사는 매 주기마다 수행되었다.

KEYNOTE-426의 861명의 환자 중(이 약 병용 요법 시험군 432명 및 수니티닙 시험군 429명) 베이스라인 특성은 다음과 같다. 연령 중앙값(median age) 62세(범위: 26~90세), 65세 이상 38%, 남성 73%, 백인 79%, 그리고 동양인 16%이었다; 99.9%는 Karnofsky Performance Score(KPS)가 70% 이상이었고, 환자의 IMDC 기준의 위험도 분포는 31%가 저위험(favorable), 56%가 중간위험(intermediate), 그리고 13%는 고위험(poor)이었다.

1차 유효성 평가지표는 전체생존(OS) 및 무진행생존(PFS, RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거)였다. 2차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 객관적 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었다. 주요 유효성 결과는 표 52에 요약되어 있다.

표 52. 진행성 신세포암 환자에서 이 약 및 엑시티닙에 대한 반응 (KEYNOTE-426)

평가 지표[a]	이 약 및 엑시티닙 n=432	수니티닙 n=429
전체생존(OS)		
사건 발생 환자 수 (%)	193 (45%)	225 (52%)
중앙값(개월) (95% CI)	45.7 (43.6, NA)	40.1 (34.3, 44.2)
위험비(HR)*(95% CI)	0.73 (0.60, 0.88)	
p-값†	0.00062	
무진행생존(PFS)		
사건 발생 환자 수 (%)	286 (66%)	301 (70%)
중앙값(개월) (95% CI)	15.7 (13.6, 20.2)	11.1 (8.9, 12.5)
위험비(HR)*(95% CI)	0.68 (0.58, 0.80)	
p-값†	<0.00001	
객관적 반응률(ORR)		

객관적 반응률(ORR)‡(95% CI)	60% (56, 65)	40% (35, 44)
p-값§	<0.0001	
반응지속기간(DoR)		
중앙값(개월) (범위)	23.6 (1.4+, 43.4+)	15.3 (2.3, 42.8+)

[a]최종 분석에 기초함

*IMDC 위험군 및 지리적 영역에 의해 층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초함

†층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초한 명목적 p-값

‡완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)을 보인 최상의 객관적 반응 환자를 기준으로 함

§IMDC 위험군 및 지리적 영역에 의해 층화된 Miettinen & Nurminen 방법을 기반으로 한 명목적 p-값

NA = 가용하지 않음

이 연구는 이 약과 엑시티닙 병용 투여시 수니티닙 대비 OS, PFS 및 ORR에 대한 통계적으로 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 26. KEYNOTE-426 치료군의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)





그림 27. KEYNOTE-426 치료군의 무진행생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-581: 진행성 신세포암 환자 대상의 1차 치료로서 렌바티닙과의 병용 요법 대조 임상시험

렌바티닙과 병용한 이 약의 유효성은 진행성 신세포암 환자 1,069명을 대상으로 다기관, 공개, 무작위 임상시험인 KEYNOTE-581에서 평가되었다. 환자들은 PD-L1 종양 발현 상태와 관계없이 등록되었다. 이 임상 시험에서는 활동성 자가면역질환 환자 또는 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 가진 환자는 제외되었다. 무작위화는 지리적 영역(북미 vs. 서유럽 vs. 기타 국가들) 및 MSKCC 기준의 위험 범주[저위험(favorable) vs. 중간위험(intermediate) vs. 고위험(poor)]로 층화되었다. 환자들은 다음의 치료군 중 하나에 무작위 배정되었다(1:1:1).

• 렌바티닙 20mg 1일 1회 경구투여와 병용하여 이 약 200mg을 3주마다 정맥 투여 한다.
• 에베로리무스 5mg 1일 1회 경구투여와 병용하여 렌바티닙 18mg 1일 1회 경구투여한다.
• 4주 동안 수니티닙 50mg를 1일 1회 경구투여한 후 2주 동안 휴약한다.

치료는 RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 질병의 진행이 확인되거나, 허용 불가능한 독성이 발생되기 전까지 계속 진행되었다. 환자가 임상적으로 안정적이고 연구진에 의해 임상적 이익을 얻는 것으로 간주되는 경우, RECIST에 따른 질병 진행 후에도 이 약과 렌바티닙의 투약이 허용되었다.

이 약 치료는 최대 24개월까지 진행되었으며; 렌바티닙 치료의 경우 24개월을 넘어서도 지속할 수 있었다. 종양 상태에 대한 평가는 기저치에서 진행된 이후 8주마다 진행되었다.

KEYNOTE-581의 1,069명의 환자 중(이 약과 렌바티닙 병용 요법 시험군 355명, 렌바티닙과 에베로리무스 병용 요법 시험군 357명 및 수니티닙 시험군 357명) 베이스 라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 62세(범위: 29-88세); 65세 이상 42%; 남성 75%; 백인 74%, 동양인 21%, 흑인 1%, 그리고 기타 인종 2%였다. Karnofsky Performance Score(KPS)가 70-80%인 환자는 18%, 90-100%인 환자는 82%였다; IMDC 기준의 위험도 분포는 33%가 저위험(favorable), 56%가 중간위험(intermediate), 그리고 10%는 고위험(poor) 이었으며; MSKCC 기준의 위험도 분포는 27%가 저위험(favorable), 64%가 중간위험(intermediate), 그리고 9%는 고위험(poor) 이었다. 환자의 일반적인 전이 부위는 폐(68%), 림프절(45%), 그리고 뼈(25%) 였다.

1차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 무진행 생존(PFS)이었다. 주요 2차 유효성 평가지표는 전체 생존(OS) 및 객관적 반응률(ORR)을 포함하였다. KEYNOTE-581의 주요 유효성 결과는 표 53과 그림 28 및 29에 요약되어 있다.

표 53. 진행성 신세포암에서 이 약 및 렌바티닙에 대한 유효성 결과(KEYNOTE-581)

평가지표	이 약 200mg 매 3주에 1회 + 렌바티닙 n=355	수니티닙 n=357
무진행 생존(PFS)		
사건발생 환자 수(%)	160 (45%)	205 (57%)
중앙값(개월) (95% CI)	23.9 (20.8, 27.7)	9.2 (6.0, 11.0)
위험비(HR)* (95% CI)	0.39 (0.32, 0.49)	
p-값†	<0.0001	
전체 생존(OS)		
사건발생 환자 수(%)	80 (23%)	101 (28%)
중앙값(개월) (95% CI)	NR (33.6, NR)	NR (NR, NR)
위험비(HR)* (95% CI)	0.66 (0.49, 0.88)	
p-값†	0.0049	

*층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초함

†로그 순위 테스트에 기반한 양측(Two-sided) p-값

NR = not reached

이 연구는 수니티닙 시험군 대비 이 약과 렌바티닙 병용요법 시험군에 무작위 배정된 환자의 PFS 및 OS에서 통계적으로 유의미한 개선을 입증했다.

그림 28. KEYNOTE-581 치료군의 무진행 생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선





그림 29. KEYNOTE-581 치료군의 전체 생존(OS) Kaplan-Meier 곡선



KEYNOTE-564: 절제술을 받은 신세포암 환자 대상의 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료 위약 대조 임상시험

이 약의 유효성은 신세포암에 대한 보조요법(adjuvant) 치료로서, 신세포암의 재발 위험이 중등-고위험 또는 고위험이거나 M1의 NED(no evidence of disease) 환자 994 명을 대상으로 다기관, 무작위 배정, 이중 맹검, 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-564에서 평가되었다. 중등-고위험 및 고위험 범주에는 다음이 포함된다.

• 중등-고위험
- pT2, 4등급 또는 육종, N0, M0
- pT3, 모든 등급, N0, M0
• 고위험
- pT4, 모든 등급, N0, M0
- 모든 pT, 모든 등급, N+, M0
• M1 NED (전이병변 완전 절제)


환자는 스크리닝 시점으로부터 4주 이전에 부분 또는 완전 신장 절제술 (M1 NED인 경우 전이성 병변 완전 절제 포함)을 받았어야 하며 수술 절제면이 음성이어야 한다. 활성 자가면역질환 환자 또는 면역 억제 치료가 필요한 환자는 제외했다. 환자는 질병 재발 또는 허용 불가능한 독성이 나타날 때까지 이 약(n=496) 200mg 또는 위약(n=498)을 3주마다 최대 1년까지 투약하도록 무작위 배정(1:1)되었다. 무작위 배정은 전이 상태(M0, M1 NED)에 따라 층화되었고, M0군 내에서는 ECOG PS(0,1) 및 지리적 지역(미국, 미국 외)에 의해 추가로 층화되었다. 환자들은 무작위 배정 이후 처음 2년 동안은 12주마다, 그 다음에는 3년에서 5년까지 16주마다, 그 다음에는 매년 24주마다 영상을 촬영했다.
994명의 환자의 베이스라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 60세(범위: 25-84세), 65세 이상 33%; 남성 71%; 그리고 ECOG PS 평가결과 0은 85%, ECOG PS 평가결과 1은 15%이었다.
N0는 94%, 육종이 없는 환자는 84%이었다. 중등-고위험은 86%, 고위험은 8%, M1 NED는 6%이었다.
1차 유효성 평가지표는 임상 시험 연구자가 평가한 무질병 생존(DFS)이고, 주요 2차 평가지표는 OS이다.

표 54. 유효성 결과 (KEYNOTE-564)

평가 지표	이 약 200 mg 3 주마다 n=496	위약 n=498
무질병 생존(DFS)		
사건 발생 환자 수 (%)	109 (22%)	151 (30%)
중앙값(개월) (95% CI)	NR	NR
위험비(HR)*(95% CI)	0.68 (0.53, 0.87)	
p-값	0.0010†	
24 개월 시점에서의 무질병 생존(DFS) 비율 (95% CI)	77% (73, 81)	68% (64, 72)
*층화된 Cox 비례 위험 모형에 기초함 †층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함 NR = 도달하지 않음		

이 연구는 이 약 투여시 위약 대비 DFS에 대한 통계적으로 유의한 개선을 입증하였다.

그림 30. KEYNOTE-564 치료군의 무질병 생존(DFS) Kaplan-Meier 곡선



자궁내막암(Endometrial carcinoma)
KEYNOTE-775: 이전에 전신 요법으로 치료 경험이 있는 진행성 자궁내막암 환자 대상의 병용 요법 대조 임상시험
이 약의 유효성은 렌바티닙 병용요법의 다기관, 무작위 배정, 위약 대조, 공개 라벨 임상시험인

KEYNOTE-775에서 이전에 수술 전 보조요법(neoadjuvant)과 수술 후 보조요법(adjuvant)을 포함한 모든 요법에서 적어도 하나의 백금기반 화학치료요법으로 투약 경험이 있는 진행성 자궁내막암 827명의 환자에서 조사되었다. 이 임상시험에서는 암 육종을 포함하는 자궁내막 육종이거나 활동성 자가면역 질환 또는 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 갖는 환자는 제외되었다. 무작위는 MMR 상태 (dMMR 또는 [dMMR이 없는] pMMR)로 층화되었다. pMMR인 경우에는 ECOG 수행 상태, 지리적 위치, 골반 방사선 치료 이력에 따라 다시 층화되었다. 환자는 다음의 치료군에 무작위 배정(1:1)되었다:

• 이 약 200mg을 매 3주마다 정맥 투여하며 렌바티닙 20 mg을 1일 1회 경구 투여와 병용

• 연구자의 선택으로 독소루비신 60mg/m^2을 매 3주마다 투여하거나, 파클리탁셀 80mg/m^2을 매 1주 간격으로 투여하며 3주 투약 후 1주 휴약

이 약과 렌바티닙 병용요법은 RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거한 질병의 진행이 확인되거나 전, 허용 불가능한 독성 발생 전까지 투여되었고, 또는 이 약의 경우 최대 24개월까지 투여되었다. 이 약의 투여는 환자가 치료에 내약성을 보이고 연구자가 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 RECIST 1.1로 정의된 질병 진행 후에도 허용되었다. 종양 상태에 대한 평가는 8주마다 수행되었다. 1차 유효성 지표는 전체 생존(OS) 및 RECIST 1.1에 따른 BICR평가에 근거한 무진행생존(PFS)이었다.

총 827명의 환자는 무작위 배정되어, 411명의 환자는 이 약과 렌바티닙 병용요법군 그리고 연구자의 선택에 따라 306명은 독소루비신 또는 110명은 파클리탁셀 투약군에 배정되었다. 이 연구의 인구 집단 특성은 다음과 같았다. 연령 중앙값 65세 (범위: 30-86세), 65세 이상 연령 50%, 백인 61%, 아시아인 21%, 흑인 4%; ECOG PS 0 59%, ECOG PS 1 41% 그리고 84%는 pMMR 종양 상태였다. 조직학적 유형은 자궁내막양암종 60%, 장액성 26%, 투명세포암종 6%, 혼합 5%, 그리고 이 외 3%였다. 모든 827명의 자궁내막암 환자는 이전의 전신 요법으로 치료 경험이 있었다: 1회 69%, 2회 28%, 3회 또는 그 이상의 전신 요법 3%. 37%의 환자는 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 또는 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료 경험만 있었다.

pMMR인(MSI-H 또는 dMMR이 없는) 697명의 유효성 결과는 표 55에 요약되어있다.

표 55. KEYNOTE-775의 유효성 결과

	MSI-H 또는 dMMR이 없는 자궁내막암	
평가 지표	매 3주마다 이 약 200mg+렌바티닙 n=346	독소루비신 또는 파클리탁셀 n=351
전체 생존(OS)		
사건 발생 환자 수(%)	165 (48%)	203 (58%)
중앙값(개월) (95% CI)	17.4 (14.2, 19.9)	12.0 (10.8, 13.3)
위험비(HR)* (95% CI)	0.68 (0.56, 0.84)	
p-값†	0.0001	
무진행 생존(PFS)		
사건 발생 환자 수(%)	247 (71%)	238 (68%)
중앙값(개월) (95% CI)	6.6 (5.6, 7.4)	3.8 (3.6, 5.0)
위험비(HR)* (95% CI)	0.60 (0.50, 0.72)	
p-값†	<0.0001	

*Cox회귀모형(Cox regression model)에 기초함

†로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함

이 연구는 pMMR인(MSI-H 또는 dMMR이 없는) 군에서 이 약과 렌바티닙과의 병용투여시 표준 요법 대비 OS 및 PFS에서 통계적으로 유의미한 개선을 입증하였다.

그림 31. KEYNOTE-775에서 pMMR인(MSI-H 또는 dMMR이 없는) 자궁내막암 환자의 전체 생존(OS) Kaplan- Meier 곡선 (ITT 집단)





그림 32. KEYNOTE-775에서 pMMR인(MSI-H 또는 dMMR이 없는) 자궁내막암 환자의 무진행 생존(PFS) Kaplan- Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-146: 자궁내막암 환자 대상의 병용 요법 공개 임상시험

렌바티닙과 병용한 이 약의 유효성은 임의의 환경에서 적어도 하나의 이전의 전신 요법 이후 진행이 확인된 자궁내막암 환자 108명을 대상으로 비무작위, 다기관, 공개 임상, 다중 코호트(multi-cohort) 임상시험인 KEYNOTE-146에서 평가되었다. 이 임상시험에서는 활성 자가면역질환 환자 또는 면역억제 치료가 필요한 환자는 제외했다.

환자들은 허용 불가능한 독성 발생 또는 연구진 평가시 질병의 진행이 확인되기 전까지 3주마다 1회 이 약 200 mg 정맥 투여를 렌바티닙 20 mg 1일 1회 경구 투여와 병용하였다. 연구자에 의해 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 질병 진행 후에도 이 약 및 렌바티닙의 투여는 허용되었다. 이 약은 최대 24개월까지 투여되었으며, 렌바티닙은 24개월 이후에도 투여될 수 있었다. 종양 상태에 대한 평가는 기준 시점에 진행된 이후 24주차까지 6주마다, 그 후에는 9주마다 수행되었다. 주요 유효성 평

가지표는 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 객관적 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었다.

108명의 환자 중, 87%(n=94)는 MSI-H 또는 dMMR을 나타내지 않았으며, 10%(n=11)는 MSI-H 또는 dMMR를 나타냈으며, 3%(n=3)에서는 상태를 알 수 없었다. MSI-H 또는 dMMR을 나타내지 않는 94명의 환자의 베이스라인 특성은 다음과 같다. 연령 중앙값(median age) 66세, 65세 이상 62%, 백인 86%, 흑인 6%, 동양인 4%, 그리고 기타 인종 3%였다. ECOG PS 0(52%) 또는 1(48%)이었다. 이 환자들 94명 모두 자궁내막암에 대한 이전의 전신 치료를 받았다. 51%는 1가지, 38%는 2가지, 11%는 3가지 이상의 이전의 전신치료를 받았다.

유효성 결과는 표 56에 요약되어 있다.

표 56. MSI-H 또는 dMMR이 없는 자궁내막암 환자의 유효성 결과

평가 지표	이 약 및 렌바티닙 n=94*
최상의 객관적 반응†	
객관적 반응률(ORR) % (95% CI)	38.3% (29, 49)
완전 반응(CR)	10.6%
부분 반응(PR)	27.7%
반응지속기간(DoR)†	
중앙값(개월) (범위)	NR (1.2+, 33.1+)‡
≥12 개월 반응지속기간(DoR)의 %	51%§
반응까지의 시간	
중앙값(개월) (범위)	1.4 (1.1, 8.0)
무진행생존(PFS)†	
중앙값(개월) (95% CI)	5.4 (4.4, 7.6)
전체생존(OS)	
중앙값(개월) (95% CI)	16.4 (13.5, 25.9)

*추적 조사 기간의 중앙값 18.7개월

†RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거함

‡독립적 검토로 응답한 환자(n=36)에 근거함

§Kaplan-Meier 추정 분석에 기초함; 12개월 이상의 반응을 보인 8명의 환자 포함

+진행중임을 나타냄

NR = 도달하지 않음

이 연구는 이 약 및 렌바티닙 병용투여시 ORR 및 DOR에 대한 임상적으로 유의미한 결과를 보였다.

고빈도-현미부수체 불안정성 암 (Microsatellite Instability-High Cancer)

KEYNOTE-158: 표준요법 이후 진행된 MSI-H 또는 dMMR 비직결장암(non-Colorectal Cancer, non-CRC) 환자 대상의 공개 임상시험

이 약의 유효성은 자궁내막암(n=49), 위암(n=24), 담도암(n=22), 췌장암(n=22), 소장암(n=19) 또는 난소암(n=15) 환자 총 151명을 포함하여 MSI-H 또는 dMMR 비직결장암(non-CRC) 환자 233명을 대상으로 한 다기관, 비무작위, 공개 임상, 다중 코호트 제 2상 임상시험(KEYNOTE-158)에서 평가되었다. 조직학적 소견에 관계없이 MSI 또는 MMR 종양 상태는 각각 중합효소 연쇄반응(PCR) 또는 면역조직화학검사(IHC)에 의해 결정되었다.

환자들은 허용 불가능한 독성 발생이나 질병 진행 전까지 이 약 200 mg을 3주마다 투여 받았다. 질병 진행의 초기 증상을 보인 임상적으로 안정된 환자들은 질병 진행이 확인될 때까지 치료를 유지하도록 허용되었다. 질병 진행이 없는 환자의 경우 최대 24개월까지 치료받을 수 있었다. 이 약을 이용한 치료는 후속적인 질병 진행 시 다시 시작되어 최대 1년까지 추가로 투여될 수 있었다. 종양 상태 평가는 첫 1년은 9주마다, 이후에는 12주마다 수행되었다.

자궁내막암 환자 49명의 베이스라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 65세(65세 이상 53%), 백인 90%, 동양인 4%, 흑인 4% 및 ECOG PS 0(49%) 및 1(51%)이었다. 96%가 M1 질환을, 4%가 M0 질환으로 확인되었다. 49%의 환자가 적어도 2가지 이상의 이전의 치료를 받았다. 위암 환자 24명의 베이스라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 67세(65세 이상 58%), 남성 63%, 백인 50%, 동양인 46% 및 ECOG PS 0(50%) 및 1(50%)이었다. 모든 환자가 M1 질환으로 확인되었다. 58%의 환자가 적어도 2가지 이상의 이전의 치료를 받았다. 담도암 환자 22명의 베이스라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 61세(65세 이상 41%), 남성 73%, 백인 91%, 동양인 9% 및 ECOG PS 0(45%) 및 1(55%)이었다. 82%가 M1 질환으로, 18%가 M0 질환으로 확인되었다. 41%의 환자가 적어도 2가지 이상의 이전의 치료를 받았다. 췌장암 환자 22명의 베이스라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 62세(65세 이상 32%), 남성 59%, 백인 82%, 동양인 5% 및 ECOG PS 0(64%) 및 1(36%)이었다. 모든 환자가 M1 질환으로 확인되었다. 77%의 환자가 적어도 2가지 이상의 이전의 치료를 받았다. 소장암 환자 19명의 베이스라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 60세(65세 이상 37%), 남성 63%, 백인 84%, 동양인 16% 및 ECOG PS 0(53%) 및 1(47%)이었다. 모든 환자가 M1 질환으로 확인되었다. 37%의 환자가 적어도 2가지 이상의 이전의 치료를 받았다. 난소암 환자 15명의 베이스라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 55세(65세 이상 27%), 백인 80%, 동양인 6.7% 및 ECOG PS 0(53%) 및 1(47%)이었다. 모든 환자가 M1 질환으로 확인되었다. 73%의 환자가 적어도 2가지 이상의 이전의 치료를 받았다.

1차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 객관적반응률(ORR)이었다. 2차 유효성 평가지표는 반응지속기간(DoR), 무진행생존(PFS) 및 전체생존(OS)였다. 추적관찰 중앙값은 자궁내막암에 대해 24.4개월(범위: 0.5~34.2), 위암에 대해 23.3개월(범위: 1.4~32.6), 담도암에 대해 12.5개월(범위: 1.1~30.9), 췌장암에 대해 4.0개월(범위: 0.4~33.6), 소장암에 대해 20.6개월(범위: 4.2~33.4), 그리고 난소암에 대해 13.1개월(범위: 2.8~24.2)였다. 유효성 결과는 표 57과 표 58에 요약되어있다.

표 57. MSI-H 자궁내막암 또는 난소암 환자의 유효성 결과 (KEYNOTE-158)

평가 지표	자궁내막암 (n=49)	난소암 (n=15)
객관적 반응률(ORR)*		
객관적 반응률(ORR) % (95% CI)	57% (42.2, 71.2)	33% (11.8, 61.6)
완전 반응(CR)	16%	20%
부분 반응(PR)	41%	13%
반응지속기간(DoR)*		
중앙값(개월) (범위)	NR (2.9, 27.0+)	NR (4.2, 20.7+)
≥24개월 반응지속기간(DoR)의 %†	74.1%	NR
반응까지의 시간		
중앙값(개월) (범위)	2.2 (1.3, 10.6)	2.0 (1.8, 4.2)
무진행 생존(PFS)*		
중앙값(개월) (95% CI)	25.7 (4.9, NR)	2.3 (1.9, 6.2)
12개월 시점의 무진행 생존(PFS) 비율	58%	26.7%
24개월 시점의 무진행 생존(PFS) 비율	51%	NR
전체 생존(OS)		
중앙값(개월) (95% CI)	NR (27.2, NR)	NR (3.8, NR)
12개월 시점의 전체 생존(OS) 비율	73.5%	73.3%
24개월 시점의 전체 생존(OS) 비율	69.1%	64.2%

*RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거함

†Kaplan-Meier 추정 분석에 기초함

NR = 도달하지 않음

표 58. MSI-H 위암, 담도암, 췌장암 또는 소장암 환자의 유효성 결과 (KEYNOTE-158)

평가 지표	위암 (n=24)	담도암 (n=22)	췌장암 (n=22)	소장암 (n=19)
객관적 반응률(ORR)*				
객관적 반응률(ORR) % (95% CI)	46% (25.6, 67.2)	41% (20.7, 63.6)	18% (5.2, 40.3)	42% (20.3, 66.5)
완전 반응(CR)	17%	9%	5%	16%
부분 반응(PR)	29%	32%	14%	26%
반응지속기간(DoR)*				
중앙값(개월) (범위)	NR (6.3, 28.4+)	NR (4.1+, 24.9+)	13.4 (8.1, 16.0+)	NR (4.3+, 31.3+)
≥24개월 반응지속기간(DoR)의 %†	91%	88%	NR	100%
반응까지의 시간				
중앙값(개월) (범위)	2.4 (1.9, 4.2)	2.4 (1.9, 4.2)	2.1 (1.9, 2.1)	2.1 (1.9, 4.2)
무진행 생존(PFS)*				
중앙값(개월) (95% CI)	11.0 (2.1, NR)	4.2 (2.1, NR)	2.1 (1.9, 3.4)	9.2 (2.3, NR)
12개월 시점의 무진행 생존(PFS) 비율	48%	34%	15.6%	46%
24개월 시점의 무진행 생존(PFS) 비율	44%	34%	NR	46%
전체 생존(OS)				
중앙값(개월) (95% CI)	NR (7.2, NR)	24.3 (6.5, NR)	4.0 (2.1, 9.8)	NR (10.6, NR)
12개월 시점의 전체 생존(OS) 비율	65.2%	61.9%	22.7%	73.7%
24개월 시점의 전체 생존(OS) 비율	60.9%	50.6%	22.7%	55.3%

*RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거함

†Kaplan-Meier 추정 분석에 기초함

NR = 도달하지 않음

고빈도-현미부수체 불안정성 직결장암 (Microsatellite Instability-High Colorectal cancer)

KEYNOTE-177: MSI-H 또는 dMMR을 나타내는 직결장암 환자 대상에서 1차 치료로서의 대조 임상시험

이 약의 유효성은 치료 경험이 없는 수술이 불가능하거나 전이성인 MSI-H 또는 dMMR을 나타내는 직결장암 환자 307명을 대상으로 다기관, 무작위 배정, 공개 임상, 활성 대조군 임상시험인 KEYNOTE-177에서 평가되었다. MSI 또는 MMR 종양 상태는 지역에서 사용하는 각 중합효소연쇄반응(PCR) 또는 면역조직화학검사(IHC)에 의해 결정되었다. 자가면역 질환이나 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 가진 환자는 임상시험 대상에서 제외되었다.

환자들은 이 약 200mg을 3주마다 정맥투여하거나 연구진의 선택으로 다음의 화학요법제를 2주마다 정맥투여하는 것으로 무작위(1:1) 배정되었다.

• mFOLFOX6(옥살리플라틴, 류코보린, 플루오로우라실) 또는 mFOLFOX6을 베바시주맙이나 세툭시맙과 병용: 옥살리플라틴 85 mg/m^2, 류코보린 400 mg/m^2(또는 레보류코보린 200 mg/m^2), 그리고 1일차에 플루오로우라실 400 mg/m^2 bolus 투약한 후, 46-48시간에 걸쳐 플루오로우라실 2400 mg/m^{2}을 투약한다. 1일 차에 베바시주맙을 5 mg/kg 투약하거나 첫 주입으로 세툭시맙을400 mg/m^2 투약한 후, 매 1주마다 250 mg/m^{2}을 투약한다.

• FOLFIRI (이리노테칸, 류코보린, 플루오로우라실) 또는 FOLFIRI를 베바시주맙이나 세툭시맙과 병용: 이리노테칸 180 mg/m^2, 류코보린 400 mg/m^2(또는 레보류코보린200 mg/m^2), 그리고 1일차에 플루오로우라실 400 mg/m^2 bolus 투약한 후, 46-48시간에 걸쳐 플루오로우라실 2400 mg/m^2을 투약한다. 1일 차에 베바시주맙을 5 mg/kg 투약하거나 첫 주입으로 세툭시맙을 400 mg/m^2 투약한 후, 매 1주마다 250 mg/m^2을 투약한다.

이 약 또는 화학요법제 치료는 연구진의 결정에 따라 RECIST v1.1에 의해 정의된 질병의 진행 또는 허용 불가능한 독성의 발생 전까지 진행되었다. 질병 진행이 없는 환자의 경우 최대 24개월까지 치료받을 수 있었다. 후속 질병 진행 시 이 약을 사용한 치료를 재개하고 최대 1년까지 추가 투여할 수 있었다. 종양 상태 평가는 매 9주마다 수행되었다. 화학요법제 치료에 무작위 배정된 환자에서 질병의 진행이 있는 경우 이 약이 제공되었다. 1차 유효성 지표는 무진행생존(PFS, RECIST v1.1에 따른 BICR평가에 근거) 및 전체생존(OS)였다. 2차 유효성 지표는 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었다.

총 307명의 환자가 등록되어 이 약(n=153) 또는 화학요법제(n=154) 치료에 무작위 배정되었다. 307명의 베이스라인 특성은 다음과 같다: 연령 중앙값 63세(범위: 24-93세), 65세 이상 47%; 남성 50%; 백인 75% 그리고 동양인 16%; ECOG PS 평가 결과 0은 52%, ECOG PS 평가결과 1인 환자는 48%이었다. 유전자 변이 상태는 BRAF V600E 25%, KRAS/NRAS 24%이었다. 베바시주맙 또는 세툭시맙 병용 여부에 상관없이 화학요법제 치료를 받은 143명의 환자 중, mFOLFOX6를 투약한 환자는 56%였고 FOLFIRI를 투약한 환자는 44%였다.

이 연구의 중간분석에서 화학요법제 투약군에 비해 이 약 치료로 무작위 배정된 환자군에서 통계적으로 유의한 PFS의 개선이 확인되었다. 최종 OS 분석에서는 화학요법제 투약군과 이 약 투약군 간의 통계적으로 유의한 차이가 확인되지는 않았으나, 화학요법제 투약군에 무작위 배정된 환자의 60%에서 이 약을 포함한 항 PD-1/PD-L1요법 투약을 위해 교차하였다. 최종 분석 시점에서 추적조사기간 중앙값은 38.1개월(범위:0.2-58.7개월)이었다.

표 59. MSI-H 직결장암 환자에서의 1차 치료로서 유효성 결과 (KEYNOTE-177)

평가 지표	이 약 200 mg 매 3주에 1회 n=153	화학요법제 n=154
무진행 생존(PFS)*		
사건 발생 환자 수(%)	82 (54%)	113 (73%)
중앙값(개월) (95% CI)	16.5 (5.4, 32.4)	8.2 (6.1, 10.2)
위험비(HR)*†(95% CI)	0.60 (0.45, 0.80)	
p-값‡	0.0002	
전체 생존 (OS)§		
사건 발생 환자 수(%)	62 (41%)	78 (51%)
중앙값(개월) (95% CI)	NR (49.2, NR)	36.7 (27.6, NR)
위험비(HR)†(95% CI)	0.74 (0.53, 1.03)	
p-값¶	0.0359	

*PFS의 위험비 값은 최종분석에서도 유지되었다.

†Cox회귀모형(Cox regression model)에 기초함

‡로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함(유의수준 0.0117과 비교)

§최종 분석결과에 기초함

¶다중성 조정 후 통계적으로 유의하지 않음

NR=도달하지 않음

그림 33. KEYNOTE-177 치료군의 무진행 생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)





그림 34. KEYNOTE-177 치료군의 전체 생존(OS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)*



*프로토콜에서 지정한 최종 분석시점

†다중성 조정 후 통계적으로 유의하지 않음

KEYNOTE-164: 이전에 플루오로피리미딘 및 옥살리플라틴 또는 플루오로피리미딘 및 이리노테칸 치료 경험이 있는 MSI-H 또는 dMMR 직결장암(Colorectal Cancer, CRC) 환자 대상의 공개 임상시험

이 약의 유효성은 MSI-H 또는 dMMR 직결장암(CRC) 환자를 대상으로 한 다기관, 비무작위, 공개 임상, 다중 코호트 제 2상 임상시험(KEYNOTE-164)에서 평가되었다. MSI 또는 MMR 종양 상태는 각각 중합효소 연쇄반응(PCR) 또는 면역조직화학검사(IHC)를 사용하여 결정되었다. 유효성은 플루오로피리미딘 및 옥살리플라틴 또는 플루오로피리미딘 및 이리노테칸 치료 이후에도 진행된 진행성 MSI-H 또는 dMMR CRC 환자 124명에서 평가되었다[코호트 A(n=61), 코호트 B(n=63)]. 자가 면역 질환 또는 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 갖는 환자는 제외되었다.

환자들은 허용 불가능한 독성 발생이나 질병 진행 전까지 이 약 200 mg을 3주마다 투여 받았다. 질병 진행의 초기 증상을 보인 임상적으로 안정된 환자들은 질병 진행이 확인될 때까지 치료를 유지하도록 허용되었다. 질병 진행이 없는 환자의 경우 최대 24개월까지 치료받을 수 있었다. 이 약을 이용한 치료는 후속적인 질병 진행 시 다시 시작되어 최대 1년까지 추가로 투여될 수 있었다. 종양 상태 평가는 9주마다 수행되었다.

코호트 A에 참여한 환자에 대한 베이스라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 53세(65세 이상 31%), 남성 59%, 백인 69%, 동양인 31%, 그리고 ECOG PS 0(48%) 및 1(52%)이었다. 모든 환자들은 이전에 치료받은 경험이 있는 전이성 CRC 환자였다. 98%가 MSI-H 또는 dMMR 종양을 나타냈으며, 90%가 2가지 이상의 이전의 치료를 받았다. 코호트 B에 참여한 환자에 대한 베이스라인 특성은: 연령 중앙값(median age) 59세(65세 이상 40%), 남성 52%, 백인 67%, 동양인 22%, 그리고 ECOG PS 0(35%) 및 1(65%)이었다. 94%가 M1 질환으로, 6%가 M0 질환으로 확인되었다. 모든 환자가 적어도 1가지의 이전의 치료를 받았으며, 62%는 2가지 이상의 이전의 치료를 받았다.

1차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 객관적반응률(ORR)이었다. 2차 유효성 평가지표는 반응지속기간(DoR), 무진행생존(PFS) 및 전체생존(OS)였다.

코호트 A에서 61명 및 코호트 B에서 63명 환자에 대한 추적 관찰 기간 중앙값은 각각 31.3개월(범위: 0.2~35.6) 및 24.2개월(범위: 0.1~27.1)이었다. 유효성 결과는 표 60에 요약되어있다.

표 60. MSI-H 직결장암 환자의 유효성 결과 (KEYNOTE-164)

평가 지표	코호트 A (n=61)	코호트 B (n=63)
객관적 반응률(ORR)*		
객관적 반응률(ORR) % (95% CI)	33% (21.3, 46.0)	33% (22.0, 46.3)
완전 반응(CR)	3.3%	7.9%
부분 반응(PR)	30%	25%
반응지속기간(DoR)*		
중앙값(개월) (범위)	NR (6.2, 31.3+)	NR (4.4, 23.6+)
≥18개월 반응지속기간(DoR)의 %†	95%	95%
반응까지의 시간		
중앙값(개월) (범위)	4.3 (1.8, 24.9)	3.9 (1.8, 12.5)
무진행 생존(PFS)*		
중앙값(개월) (95% CI)	2.3 (2.1, 8.1)	4.1 (2.1, 18.9)
12개월 시점의 무진행 생존(PFS) 비율	34%	41%
24개월 시점의 무진행 생존(PFS) 비율	31%	37%
전체 생존(OS)		
중앙값(개월) (95% CI)	31.4 (21.4, NR)	NR (19.2, NR)
12개월 시점의 전체 생존(OS) 비율	72%	76%
24개월 시점의 전체 생존(OS) 비율	55%	63%

*RECIST 1.1에 따른 BICR 평가에 근거함

†Kaplan-Meier 추정 분석에 기초함

NR = 도달하지 않음

삼중음성 유방암(Triple-Negative Breast cancer)

KEYNOTE-522: 고위험 조기 삼중음성 유방암 환자 대상의 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 및 수술 후 보조요법(adjuvant) 대조 임상시험

이 약의 유효성은 수술 전 보조요법으로서 카보플라틴 및 파클리탁셀에 이어 독소루비신 또는 에피루비신 및 사이클로포스파마이드와의 병용 요법 및 수술 후 보조요법으로서 단독 요법의 무작위 배정, 이중 맹검, 다기관, 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-522에서 평가되었다. 주요 선정 기준은 PD-L1 발현에 관계없이 이전의 치료 경험이 없는 새로 진단된 고위험 조기 삼중음성 유방암(림프절 침범이 있는 경우 종양크기 지름이 >1 cm이면서 지름 ≤2 cm, 또는 림프절 침범에 관계없이 종양크기 지름 >2 cm) 환자였다. 2년 이내 전신 치료가 필요했던 활성 자가면역질환 또는 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 가진 환자는 임상시험 대상에서 제외되었다. 무작위배정은 림프절 침범 상태(양성 vs. 음성), 종양 크기(T1/T2 vs. T3/T4), 그리고 카보플라틴 처방(매 3주마다 vs. 매주)에 따라

층화되었다.

• 수술 전 보조요법

환자들은 아래 화학요법과 병용하여 이 약 200 mg을 3주마다 8회 또는 위약을 투여받았다.

(1-4주기)

- 카보플라틴: 1일차에 매 3주마다 AUC 5 mg/mL/min 또는 1-4주기의 1일, 8일, 15일차에 매주 AUC 1.5 mg/mL/min
- 파클리탁셀: 매주 1일, 8일, 15일차에 80 mg/m^2

(5-8주기)

- 1일차에 매 3주마다 독소루비신 60 mg/m^2또는 에피루비신 90 mg/m^2
- 사이클로포스파마이드: 1일차에 매 3주마다 600 mg/m^2

• 수술 후 보조요법

- 이 약 200 mg 또는 위약을 매 3주마다 총 9주기 동안 투여

이 약 또는 위약을 사용한 치료는 치료 완료(17주기), 근치적 수술을 불가능하게 하는 질병 진행, 수술 후 질병 재발, 또는 허용 불가능한 독성 발생 전까지 지속되었다.

일차 유효성 평가지표는 병리학적 완전반응(pCR) 비율과 무사건생존율(EFS)이었다.

pCR: 유방과 림프절에 침습성 암이 없는 상태(ypT0/Tis ypN0)

총 1174명의 환자가 무작위 배정되어, 784명의 환자는 이 약군 그리고 390명의 환자는 위약군에 배정되었다. 이 연구의 인구 집단 특성은 다음과 같았다: 연령 중앙값 49세(범위: 22-80세), 65세 이상 연령 11%; 여성 99.9%; 백인 64%, 아시아인 20%, 흑인 5%, 아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민 2%; ECOG PS 0 87%, ECOG PS 1 13%; 폐경 전 56%, 폐경 후 44%; 원발성 종양 1 (T1) 7%, T2 68%, T3 19%, T4 7%; 림프절 침범 0 (N0) 49%, N1 40%, N2 11%, N3 0.2%; 종합 병기 II기 환자 75% 및 III기 환자 25%.

유효성 결과는 표 61 및 그림 35에 요약되어 있다.

표 61. 고위험 조기 삼중음성 유방암 환자의 유효성 결과 (KEYNOTE-522)

평가 지표	매 3주마다 이 약 200 mg + 화학요법 / 매 3주마다 이 약 200 mg	위약 + 화학요법 / 위약
병리학적 완전반응(pCR (ypT0/Tis ypN0)*)	n=669	n=333
pCR 비율(%), (95% CI)	64.0 (60.2, 67.6)	54.7 (49.1, 60.1)
치료 차이 (%) 추정 (95% CI)†	9.2 (2.8, 15.6)	
p-값	0.00221	
무사건생존율(EFS)‡	n=784	n=390
사건 발생 환자 수(%)	123 (16%)	93 (24%)
24개월에서의 EFS 비율 (95% CI)	87.8 (85.3, 89.9)	81.0 (76.8, 84.6)
위험비 (95% CI)§	0.63 (0.48, 0.82)	
p-값¶	0.00031	

*사전 지정된 pCR 최종 분석에 기초함 (유의수준 0.0028과 비교)

†림프절 침범 상태, 종양 크기 및 카보플라틴 처방에 의해 층화된 Miettinen & Nurminen 방법에 기초함


‡사전 지정된 EFS 중간 분석에 기초함 (유의수준 0.0052와 비교)

§치료를 림프절 침범 상태, 종양 크기 및 카보플라틴 처방에 의해 층화된 공변량으로 하는 에프론의 타이 처리 방법(Efron's method of tie handling)을 이용한 Cox 회귀 모델을 기초로 함

¶림프절 침범 상태, 종양 크기 및 카보플라틴 처방에 의해 층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함

이 연구는 시험군(이 약+항암화학요법/이 약)이 대조군(위약+항암화학요법/위약) 대비 pCR 및 EFS에 대한 통계적으로 유의한 개선을 입증하였다.

그림 35. KEYNOTE-522 치료군의 무사건생존율(EFS) Kaplan-Meier 곡선 (ITT 집단)



KEYNOTE-355: 수술이 불가능한 국소 재발성 또는 전이성 삼중음성 유방암 환자 대상의 병용 요법 대조 임상시험

이 약의 유효성은 파클리탁셀, 알부민 결합 파클리탁셀, 또는 젬시타빈과 카보플라틴 병용요법의 다기관, 무작위 배정, 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-355에서 조사되었다. 주요 피험자 선정 기준은 PD-L1발현에 관계없이 이전의 화학요법 치료 경험이 없는 수술이 불가능한 국소 재발성 또는 전이성 삼중음성 유방암 환자였다. I-III기 유방암에 대한 완치목적 치료 완료 6개월 후 국소 또는 원위 질병재발이 있는 환자, (신)보조요법으로 안트라사이클린 전신 치료를 받은 경우이거나 안트라사이클린에 금기인 환자를 등록하였다. 이전 선행요법으로 탁산 제제 젬시타빈 또는 백금 제제를 완치목적으로 투여한 환자의 경우 투여후 12개월 이상인 경우에만 동일계열의 화학요법 투여가 가능했다.

환자는 위약군 또는 이 약군에 무작위 배정(1:2)되었고, 화학요법(파클리탁셀 또는 알부민 결합 파클리탁셀 vs. 젬시타빈과 카보플라틴), PD-L1 IHC 22C3 pharmDx^{TM}키트에 따른 종양 PD-L1 발현(CPS≥1 vs. CPS<1), 그리고 수술 전 보조요법(neoadjuvant)치료로 동일한 화학요법 군으로의 이전 치료여부(예 vs.아니오)에 따라 층화되었다.

위약 또는 이 약 200mg을 매 3주 1일차에 투여하며, 다음 세 가지 화학요법 중 하나를 선택하여 병용투여한다.

- 알부민 결합 파클리탁셀 100mg/m^{2}을 매 28일 간격으로 1일, 8일, 15일 차에 병용 투여
- 파클리탁셀 90mg/m^{2}을 매 28일 간격으로 1일, 8일, 15일 차에 병용 투여
- 젬시타빈 1000mg/m^{2}과 카보플라틴 AUC 2mg/mL/min을 매 21일 간격으로 1일, 8일 차에 병용 투여

이 약 또는 위약 치료는 연구자로부터 RECIST 1.1에 따른 질병의 진행이 확인되기 전, 허용 불가능한 독성 발생 전, 또는 최대 24개월까지 계속 진행되었다. 이 약의 투여는 환자가 임상적으로 안정적이고 연구자에 의해 임상적 이익을 도출하는 것으로 간주되는 경우 RECIST가 정의한 질병 진행 후에도 허용되었다. 종양 상태에 대한 평가는 8주, 16주, 24주차에 수행되었으며, 이 후 첫 1년까지는 9주마다, 그리고 이후에는 12주마다 수행되었다.

1차 유효성 지표는 종양 PD-L1 발현이 CPS≥10인 환자에서의 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 근거한 전체생존(OS) 및 무진행생존(PFS)이었다. 2차 유효성 지표는 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DoR)이었다.

총 847명의 환자는 무작위 배정되어, 566명의 환자는 이 약 그리고 281명의 환자는 위약 투여군에

배정되었다. 이 연구의 인구 집단 특성은 다음과 같았다: 연령 중앙값 53세 (범위:22-85세), 65세 이상 연령 21%; 여성 100%; 백인 68%, 아시아인 21%, 흑인 4%; ECOG PS 0 60%, ECOG PS 1 40% 그리고 68%는 폐경 상태였다. 75%의 환자에서 CPS ≥1의 종양 PD-L1 발현을, 38%의 환자에서 CPS≥10의 종양 PD-L1발현을 나타냈다.

유효성 결과는 표 62, 그림 36 및 그림 37에 요약되어 있다.

표 62. PD-L1 발현 CPS≥10인 삼중음성 유방암 환자에서의 유효성 결과

평가 지표	이 약+ 항암화학요법제* n=220	위약+ 항암화학요법제* n=103
전체생존(OS)†		
사건 발생 환자 수(%)	155 (70%)	84 (82%)
중앙값(개월) (95% CI)	23.0 (19.0, 26.3)	16.1 (12.6, 18.8)
위험비(HR)‡(95% CI)	0.73 (0.55, 0.95)	
p-값§	0.0093	
무진행 생존(PFS)¶,#		
사건 발생 환자 수(%)	136 (62%)	79 (77%)
중앙값(개월) (95% CI)	9.7 (7.6, 11.3)	5.6 (5.3, 7.5)
위험비(HR)‡(95% CI)	0.65 (0.49, 0.86)	
p-값§	0.0012	

*항암화학요법제: 파클리탁셀, 알부민결합 파클리탁셀, 또는 젬시타빈과 카보플라틴

†사전 지정된 최종 분석에 기초함

‡연구 내 항암화학요법제(탁산 vs. 젬시타빈과 카보플라틴)와 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 치료로서 동일한 화학요법 군으로의 이전 치료여부(예 vs. 아니오)를 치료의 공변량으로 층화한 Efron 분석(Efron's method of tie handling)의 Cox 회귀 모델에 기초함

§연구 내 항암화학요법제(탁산 vs. 젬시타빈과 카보플라틴)와 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 치료로서 동일한 화학요법 군으로의 이전 치료여부(예 vs. 아니오)의 층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초한 단측(one-sided) p-값

¶RECIST 1.1에 따른 BICR 평가

#사전 지정된 중간 분석에 기초함

이 연구는 PD-L1 발현 CPS≥10군에서 화학요법 대조군 대비 이 약과 화학요법 병용한 시험군에서 PFS 및 OS에서 통계적 유의성을 입증하였다. 하위군 분석결과 대부분 일관적인 치료적 유익성을 보였으나, 무질병기간(Disease Free Interval)에 따른 하위군 분석 결과 중 '12개월 이내 재발한 종양 PD-L1 발현 CPS≥10인 환자군의 경우' 이 약과 화학요법제 병용군(n=49)과 위약과 화학요법제(n=17) 병용군의 무진행생존 중앙값은 각각 7.5개월과 7.2개월, 전체생존 중앙값은 각각 17.4개월과 19.7개월을 보였다.

그림 36. KEYNOTE-355 치료군의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선 (CPS≥10)





그림 37. KEYNOTE-355 치료군의 무진행 생존(PFS) Kaplan- Meier 곡선 (CPS≥10)



자궁경부암(Cervical Cancer)

KEYNOTE-A18: FIGO 2014 III-IVA기 자궁경부암 환자 대상의 화학방사선요법과의 병용 요법 대조 임상시험

시스플라틴 및 외부 빔 방사선 요법(EBRT) 후 근접치료(BT)와 병용한 이 약의 유효성은 이전에 자궁경부암 치료를 위해 근치적 수술, 방사선, 또는 전신 요법을 받은 적이 없는 자궁경부암 환자 1060명을 대상으로 한 다기관, 무작위, 이중 맹검, 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-A18에서 조사되었다. 림프절 양성 또는 음성 질환을 지닌 FIGO 2014 III-IVA기(골반 측벽으로 확장된 종양, 수신증/비기능 신장, 또는 인접 골반 기관으로 퍼진 종양을 지니거나 지니지 않은 질 하부 종양 침범) 환자 596명 및 림프절 양성 질환을 지닌 FIGO 2014 IB2-IIB기(종양 병변 >4 cm 또는 종양이 자궁 너머로 퍼졌지만 골반 벽이나 질 하부 1/3 지점까지는 확장되지 않은 임상적으로 확인 가능한 병변) 환자 462명이 참여하였다; 2명의 환자는 FIGO 2014 IVB기 질환을 가지고 있었다. 무작위배정은 계획된 EBRT의 종

류(세기조절 방사선치료[IMRT] 또는 입체적 세기조절 회전치료[VMAT] vs. 비-IMRT 및 비-VMAT), 스크리닝 시점에서의 자궁경부암 병기(FIGO 2014 IB2-IIB기 vs. III-IVA기), 그리고 계획된 총 방사선 요법 용량(동등 용량[EQD2]에 따른 [EBRT+BT 용량] <70 Gy vs. ≥70 Gy)에 따라 층화되었다. 환자들은 두 치료군 중 하나에 무작위배정(1:1)되었다:

• 시스플라틴 매주 40 mg/m^2 정맥투여(5주기, 현지 관행에 따라 선택적으로 6번째 투여 가능) 및 방사선요법(EBRT 후 BT)과 병용하여 이 약 200 mg을 매 3주마다 정맥투여(5 주기), 그리고 이어서 이 약 400 mg을 매 6주마다 정맥투여(15주기)

• 시스플라틴 매주 40 mg/m^2 정맥투여(5주기, 현지 관행에 따라 선택적으로 6번째 투여 가능) 및 방사선요법(EBRT 후 BT)과 병용하여 위약을 매 3주마다 정맥투여(5 주기), 그리고 이어서 위약을 매 6주마다 정맥투여(15주기)

치료는 RECIST v1.1에 따라 연구자가 평가한 질병 진행이 확인되거나 허용 불가능한 독성 발생 전까지 지속되었다.

종양 상태에 대한 평가는 첫 2년 동안은 화학방사선요법을 마친 뒤 매 12주마다, 3년차에는 매 24주마다, 그 이후에는 매해 수행되었다. 주요 유효성 평가지표는 최대 10개의 표적 병변과 장기당 최대 5개의 표적 병변을 따르도록 수정된 RECIST v1.1 또는 조직병리학적 확인에 따라 연구자가 평가한 무진행 생존(PFS) 및 전체 생존(OS)이었다.

FIGO 2014 III-IVA기 질환을 지닌 596명의 환자들의 베이스라인 특성은 다음과 같다: 연령 중앙값 52세(범위: 22-87세), 65세 이상 연령 17%; 백인 36%, 아시아인 34%, 흑인 1%, 히스패닉 또는 라틴계 38%; ECOG PS 0 68%, ECOG PS 1 32%; CPS≥1 93%; 골반 양성 및/또는 대동맥-주위 림프절(들) 양성 70%, 골반 또는 대동맥-주위 림프절 모두 음성 30%; 83%는 편평세포암, 17%는 비-편평 조직학을 나타냈다. 방사선의 경우, 85%의 환자가 IMRT 또는 VMAT EBRT를 조사받았으며, EQD2 용량 중앙값은 87 Gy(범위: 7-114)이었다.

이 연구는 전체 모집단에서 PFS에 대한 통계적으로 유의한 개선을 입증하였다. FIGO 2014 IB2-IIB기 질환을 지닌 462명의 환자(44%)에 대한 탐색적 하위군 분석에서, PFS 위험비(HR) 추정값은 0.91(95% CI: 0.63, 1.31)이었으며, 이는 전체 모집단에서의 PFS 개선이 주로 FIGO 2014 III-IVA기 질환을 지닌 환자의 하위군에서 나타난 결과로 설명될 수 있음을 나타낸다. OS 결과는 PFS 분석 시점에서 성숙하지 않았으며, 전체 모집단의 10%에서 사망 사건이 발생하였다.

FIGO 2014 III-IVA기 질환을 지닌 596명의 FIGO 2014 III-IVA기 환자에 대한 탐색적 하위군 분석 유효성 결과는 표 63 및 그림 38에 요약되어있다.

표 63. KEYNOTE-A18의 유효성 결과(FIGO 2014 III-IVA기 자궁경부암 환자)


평가지표	CRT와 이 약 매 3주마다 200 mg 병용 및 이 약 매 6주마다 400 mg n=293	CRT와 위약 병용 n=303
연구자에 의한 무진행 생존(PFS)		
사건 발생 환자 수(%)	61 (21%)	94 (31%)
중앙값(개월) (95% CI)	NR (NR, NR)	NR (18.8, NR)
12개월 시점의 PFS 비율 (95% CI)	81% (75, 85)	70% (64, 76)
위험비(HR)* (95% CI)	0.59 (0.43, 0.82)	

* 층화되지 않은 Cox 비례 위험 모형에 기초함

CRT = 화학방사선요법

NR = 도달하지 않음

그림 38. KEYNOTE-A18의 무진행 생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선(FIGO 2014 Ⅲ-IVA기 자궁경부암 환자)



KEYNOTE-826: 지속성, 재발성 또는 전이성 자궁경부암 환자 대상의 병용 요법 대조 임상시험
방사선 감광제로 사용된 경험을 제외하고 이전에 항암화학요법 치료 경험이 없는 지속성, 재발성 또는 전이성 자궁경부암 환자 617명을 대상으로 베바시주맙을 포함하거나 포함하지 않는 파클리탁셀과 시스플라틴 또는 파클리탁셀과 카보플라틴과의 병용요법으로 한 다기관, 무작위 배정, 이중 맹검, 위약 대조 임상시험인 KEYNOTE-826에서 조사되었다. 환자는 PD-L1 발현 상태와 관계없이 등록되었다. 지난 2년 이내 전신 치료가 필요했던 자가면역질환 환자 또는 면역 억제를 필요로 하는 의학적 상태를 가진 환자는 제외되었다. 초기 진단시점에서 전이 상태, 베바시주맙 포함 여부, 종양 PD-L1 발현(CPS<1 vs. CPS 1에서 <10 vs. CPS≥10)에 따라 층화되었다. 환자들은 다음 네가지 항암화학요법 중 연구자가 선택한 항암화학요법과 이 약 200mg 또는 위약 두 군 중 하나에 무작위 배정(1:1)되었다.

- 파클리탁셀 175mg/m^2+ 시스플라틴 50mg/m^2
- 파클리탁셀 175mg/m^2+ 시스플라틴 50mg/m^2 + 베바시주맙 15mg/kg
- 파클리탁셀 175mg/m^2+ 카보플라틴 AUC 5mg/mL/min
- 파클리탁셀 175mg/m^2+ 카보플라틴 AUC 5mg/mL/min + 베바시주맙 15mg/kg

모든 연구 치료는 각 3주 치료 주기 중 1일차에 투여되었다. 시스플라틴은 각 3주 치료 주기 중 2일차에 투여가 가능했다. 파클리탁셀과 백금 화학요법은 최대 6주기까지 투여가 가능하였으며 연구자에 의해 6주기 이상 투여하는 것이 허용되었다. 이 약의 치료는 RECIST 1.1에 따른 질병의 진행이 확인되기 전, 허용 불가능한 독성 발생 전, 또는 최대 24개월까지 계속 진행되었다. 이 약의 투여는 환자가 임상적으로 안정적이고 연구자에 의해 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 RECIST가 정의한 질병 진행 후에도 허용되었다. 종양 상태에 대한 평가는 9주차에 수행되었으며, 이 후 첫 1년까지는 9주마다, 그리고 이후에는 12주마다 수행되었다. 1차 유효성 평가지표는 전체 생존(OS) 및 RECIST 1.1에 따라 연구자에 의해 평가된 무진행 생존(PFS)였다.
이 연구의 인구 집단 특성은 다음과 같았다: 연령 중앙값 51세 (범위:22-82세), 65세 이상 연령 16%; 백인 58%, 아시아인 18%, 흑인 1%, 히스패닉 또는 라틴계 37%; ECOG PS 0 56%, ECOG PS 1 43%; 89%의 환자에서 CPS ≥1의 종양 PD-L1 발현; 63%의 환자가 베바시주맙 치료를 받음; 선암 23%, 선편평상피세포암 5%; 원격 전이와 관계없이 지속성 또는 재발성 질환의 환자 중 이전에 항암 방사선 치료만을 받은 환자는 39%, 항암방사선 치료와 수술을 받은 환자는 17%였다.
유효성 결과는 표 64, 그림 38 및 그림 39에 요약되어 있다.
표 64. KEYNOTE-826에서 CPS 1 이상인 군의 유효성 지표

평가지표	매 3주마다 이 약 200mg + 항암화학요법* (±베바시주맙) n=273	위약 + 항암화학요법* (±베바시주맙) n=275
전체 생존(OS)		
사건 발생 환자 수 (%)	118 (43.2)	154 (56)
중앙값(개월) (95% CI)	NR (19.8, NR)	16.3 (14.5, 19.4)
위험비(HR)†(95% CI)	0.64 (0.50, 0.81)	
p-값‡	0.0001	
무진행 생존(PFS)		
사건 발생 환자 수 (%)	157 (57.5)	198 (72.0)
중앙값(개월) (95% CI)	10.4 (9.7, 12.3)	8.2 (6.3, 8.5)
위험비(HR)†(95% CI)	0.62 (0.50, 0.77)	
p-값§	<0.0001	

*항암화학요법 (파클리탁셀과 시스플라틴 또는 파클리탁셀과 카보플라틴)

†Cox 비례위험모형(Cox proportional hazard model)에 기초함

‡층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함 (알파경계값 0.00549와 비교됨)

§층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초함 (알파경계값 0.00144와 비교됨)

NR = not reached

이 연구는 이 약 200mg을 3주마다 투여시 위약 대비 OS 및 PFS에 대한 통계적으로 유의한 개선을 입증하였다.

그림 39. KEYNOTE-826에서 CPS 1 이상인 군의 전체 생존(OS) Kaplan-Meier 곡선





그림 40. KEYNOTE-826에서 CPS 1 이상인 군의 무진행 생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선



담도암(Biliary Tract Carcinoma)

KEYNOTE-966: 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 담도암 환자 대상의 병용 요법 대조 임상시험

이 약과 젬시타빈 및 시스플라틴 병용 요법의 유효성은 이전에 진행성 질환에 대한 전신 치료를 받은 경험이 없는 수술이 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 담도암 환자 1069명을 대상으로 한 다기관, 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조 연구인 KEYNOTE-966에서 평가되었다. 지난 2년 이내 전신 치료가 필요했던 자가면역질환 환자 또는 면역 억제 치료를 필요로 하는 의학적 상태를 가진 환자는 제외되었다. 무작위 배정은 지역(아시아 vs. 비-아시아), 국소 진행성 vs. 전이성, 원발암 위치(담낭, 간내 또는 간외 담관암)으로 층화되었다.

환자들은 다음의 두 군 중 하나로 무작위 배정(1:1)되었다.

• 매 3주마다 1일차에 이 약 200mg 투여 및 젬시타빈 1000mg/m^2 + 시스플라틴 25mg/m^2 를 1일차, 8일차에 투여

• 매 3주마다 1일차에 위약 투여 및 젬시타빈 1000mg/m^2 + 시스플라틴 25mg/m^2 를 1일차, 8일차에 투여

모든 연구 약물은 정맥 주입으로 투여되었다. 치료는 허용 불가능한 독성이 발생하거나 질병진행이 확인되기 전까지 지속되었다. 이 약의 경우, 치료는 최대 35주기 또는 약 24개월까지 지속되었다. 시스플라틴의 경우, 치료는 최대 8주기까지 투여 가능하였고, 젬시타빈의 경우, 8주기 이상으로 투여 지속이 가능했다.

이 약과 항암화학요법의 병용 투여는 환자가 임상적으로 안정적이고 연구자에 의해 임상적 이익이 있다고 판단되는 경우 RECIST가 정의한 질병 진행 후에도 허용되었다. 종양 상태에 대한 평가는 베이스라인에서 수행되었고, 첫 54주까지는 6주마다, 이후에는 12주마다 수행되었다.

이 연구의 인구 집단 특성은 다음과 같았다: 연령 중앙값 64세 (범위:23-85세), 65세 이상 연령 47%; 남성 52%; 백인 49%, 아시아인 46%, ECOG PS 0 46%, ECOG PS 1 54%; 31%의 환자에서 HBV 감염 이력; 3%의 환자에서 HCV 감염 이력.

1차 유효성 평가지표는 전체 생존(OS)이었고 2차 유효성 평가지표는 RECIST 1.1에 따른 눈가림된 독립중앙평가(BICR)에 의해 평가된 무진행 생존(PFS), 객관적 반응률(ORR) 및 반응지속기간(DOR)이었다.

유효성 결과는 표 65, 그림 41 및 그림 42에 요약되어 있다.

표65. KEYNOTE-966의 유효성 결과

평가지표	매 3주마다 이 약 200mg와 젬시타빈/시스플라틴 n=533	위약과 젬시타빈/시스플라틴 n=536
전체생존(OS)*		
사건 발생 환자 수(%)	414 (78%)	443 (83%)
중앙값(개월) (95% CI)	12.7 (11.5, 13.6)	10.9 (9.9, 11.6)
위험비(HR)† (95% CI)	0.83 (0.72, 0.95)	
p-값‡	0.0034	
무진행생존(PFS)§		
사건 발생 환자 수(%)	361 (68%)	391 (73%)
중앙값(개월) (95% CI)	6.5 (5.7, 6.9)	5.6 (5.1, 6.6)
위험비(HR)† (95% CI)	0.86 (0.75, 1.00)	
p-값‡	0.0225	
객관적 반응률(ORR)§		
객관적 반응률¶(95% CI)	28.7% (24.9, 32.8)	28.5% (24.8, 32.6)
완전 반응(%)	11 (2.1%)	7 (1.3%)
부분 반응(%)	142 (26.6%)	146 (27.2%)
p-값#	0.4735	
반응지속기간*, Þ	n=156	n=152
중앙값(개월) (범위)	8.3 (1.2+, 33.0+)	6.8 (1.1+, 30.0+)

* 사전 지정된 최종 OS 분석 결과

† 층화된 Cox 비례 위험 모형(Cox proportional hazard model)에 기초함

‡ 층화된 로그 순위 테스트(log-rank test)에 기초한 단측(one-sided) p-값


§ 사전 지정된 중간 분석 결과

¶ 완전 반응 또는 부분 반응으로 확인됨

층화된 Miettinen & Nurminen 방법에 기초한 단측(one-sided) p-값


Þ Kaplan-Meier 추정 분석에 기초함

그림41. KEYNOTE-966에서 치료군의 전체생존(OS) Kaplan-Meier 곡선*



* 사전 지정된 최종 OS 분석에 기초함

그림42. KEYNOTE-966에서 치료군의 무진행생존(PFS) Kaplan-Meier 곡선*



* 사전 지정된 중간 분석 시점 기준

1.3 허가조건 (변경 항목만 작성)

○ 해당없음

1.4 중앙약사심의위원회 자문 결과 (해당하는 경우)

○ 해당없음

1.5 사전검토 (해당하는 경우)

○ 자궁경부암 추가: 유전자재조합의약품과-267호(2024.02.26.)

○ 담도암 추가: 유전자재조합의약품과-275호(2024.02.27.)

○ 안전성 정보 추가: 유전자재조합의약품과-230호(2024.02.16.)

1.6 검토이력

구 분	품목변경허가	안전성·유효성 관련 자료
신청일자	2024.3.18.	사전검토 완료
보완요청일자		-
보완접수일자		-
최종처리일자	2024.4.15.	사전검토 완료

[붙임 1] 안전성·유효성 및 기준 및 시험방법 심사결과

【제출자료 목록】

○ 관련규정 : 생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정(식약처 고시) 제6조 [별표1] 제2부 Ⅲ. 당해품목 허가변경
1. 새로운 효능·효과

제출자료 / 구분	자료번호																				
	1	2		3				4						5				6		7	8	비고
		가	나	가		나		가	나	다	라	마	바	가	나	다	라	가	나			
				1)	2)	1)	2)															
제출범위	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	△	×	○	×	○	○	
제출여부	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	

면제여부 : 5. 약리작용에 관한 자료 - 기 허가 시 제출된 자료로 갈음 가능

○ 제출자료 목록

1. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료
6. 임상시험성적에 관한 자료
   가. 임상시험자료집
7. 국내·외에서의 사용 및 허가 현황 등에 관한 자료
8. 기타 당해 의약품의 특성 등에 관한 자료

[심사자 종합의견]

[자궁경부암]

- 용량 설정의 타당성
  - 3상 임상시험에서 용법용량은 200 mg 3주 1회 5회 주입 후 400 mg 6주 1회 15회 주입으로 해당용량은 내약성이 양호하였음
  - 400 mg 6주 1회 요법을 투여 시작부터 적용하는 용법용량은 해당 임상시험에서 적용되지 않았으나 다양한 암종을 대상으로하는 임상시험에서 200 mg 3주 1회 용법과 병행하여 투여하고 있고 기 제출자료에서 약동학적 분석을 통해 차이가 없음을 확인하였으며 유지치료기에 단독요법으로 400 mg Q6W으로 변경하는 설계이므로 해당 용법에 대한 안전성도 확립되었다고 볼 수 있음
- 유효성의 타당성
  - 1차 평가변수인 시험자가 판단한 무진행 생존은 시험군에 유리한 유의성 있는 결과를 보였음
  - 효능효과의 대상환자군을 Stage III, IVA로 제한하였으며 해당 환자군에서 OS의 HR은 0.51(0.31, 0.83)로 유효성이 확립되었음을 확인함
- 안전성의 타당성
  - 노출기간의 중앙값은 시험군에서 약간 길었고 자궁경부암의 비교적 초기 환자인 점에서 기존 보고된 다른 암종에서의 노출 중앙값보다 2배 이상 노출을 보였음

- 흔하게 발생한 이상사례는 백혈구 감소증, 저칼륨혈증, AST 증가, 갑상선 기능 저하증 및 항진증으로 기 보고된 이상사례 범주 안에 있음
- 3-5등급 이상사례는 빈혈, 백혈구 감소증으로 화학방사선요법에서 보고된 일반적인 이상사례임
- 사망은 면역-매개 위장관 질환으로 인해 발생하였으며 면역-매개 질환은 펨브롤리주맙의 알려진 이상반응임

[담도암]

- 용량 설정의 타당성
  - 3상 임상시험에서 용법용량은 200 mg 3주 1회 주입임
  - 신청된 용법용량 변경이 없으므로 기승인된 용법용량에 따라 200 mg 3주 1회, 400 mg 6주 1회 중 초기부터 선택하여 투여할 수 있음, 해당 질환 환자에서 안전성·유효성은 평가되지 않았으나 수평한 E-R 프로파일을 근거로 백금계 약물과 병용한 다양한 암종에서 기승인되어 있는 점을 참고하였을 때, 타당함
- 유효성의 타당성
  - 1차 평가변수인 OS는 시험군에 유리한 유의성 있는 결과(HR 0.83)를 보였으며 12.7개월의 기간은 문헌보고된 다른 약물의 OS 기간 범위 내에 있음
  - PFS, ORR 평가를 위한 방사선학적 분석이 담도암에서 어려울 수 있다는 문헌근거를 제시하였음. 최종 평가변수인 OS에서 분명한 유효성을 보였으며 PFS의 HR이 1을 넘지 않으므로 ORR에서 나타난 시험군과 대조군의 차이 없음이 유효성을 판단하는데 주요인자는 아니며 방사선학적 분석의 어려움에서 기인했을 가능성이 있다는 설명은 인정가능함
- 안전성의 타당성
  - 흔하게 발생한 이상사례 중, 발진, 발열, 소양증은 시험군에서 대조군보다 많이 발생하였으나 이는 펨브롤리주맙의 알려진 이상사례임
  - 3-5등급 이상사례는 호중구 수 감소, 빈혈, 혈소판 수 감소, WBC 수 감소 및 담관염이 빈발하였으나 담관염은 질병 관련, 혈구수 이상은 화학약물 병용에 의한 것으로 생각됨
  - 사망은 폐렴, 패혈증이 원인이었으며 병용하는 화학약물에서 기 보고된 중증 이상사례에 해당함

[약어 및 정의]

약어	정의	
AE	Adverse event(s)	이상반응
AEOSI	Adverse events of special interest	특별 관심대상 이상반응
ALP	Alkaline phosphatase	알카리성 포스파타제
ALT	Alanine aminotransferase	알라닌 아미노전이효소
APaT	All Participants as Treated	모든 시험대상자 치료받은 대로
AST	Aspartate aminotransferase	아스파라진산 아미노전이효소
BICR	Blinded Independent Central Review	눈가림된 독립적 중앙 검토
CCRT	concurrent chemoradiotherapy	병용화학요법
CI	Confidence interval	신뢰구간
CPS	Combined Positive Score	종합양성점수
CR	Complete response	완전 반응
CRT	Chemoradiotherapy	화학방사선요법
CTCAE	Common Terminology Criteria for Adverse Events	이상반응 공통용어 기준
DFS	Disease free survival	무질병 생존기간
DILI	drug-induced liver injury	약인성 간손상
DOR	Duration of response	반응 기간
EBRT	External beam radiotherapy	체외방사선요법
EC50	half-maximal effective concentration	최대 크기의 절반 효과를 내는 농도
ECOG PS	Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status	동부암협력연구그룹 활동도 상태
EOP	End of phase	단계 종료
E-R	Exposure-response	노출-반응

약어	정의	
PD-L1	Programmed cell death ligand 1	프로그램된 세포사 리간드 1
PD-L2	Programmed cell death ligand 2	프로그램된 세포사 리간드 2
PFS	Progression-free survival	무진행 생존 기간
PK	Pharmacokinetic	약물동태학
PR	Partial response	부분 반응
PRO	Patient-reported outcomes	환자보고결과
QW	once weekly	1주에 1회 투여
Q3W	once every 3weeks	3주에 1회 투여
Q6W	once every 6 weeks	6주에 1회 투여
RECIST	Response Evaluation Criteria In Solid Tumors	고형암 반응평가 기준
RSD	Reference safety data	참조 안전성 데이터세트
RT	radiotherapy	방사선요법
SAE	Serious adverse event	중대한 이상반응
sBLA	supplemental Biologics Licensure Application	보충적 생물학적 제제 허가 신청
SEER	Surveillance, Epidemiology, and End Results	감시, 역학 및 최종 결과
SOC	System organ class	신체기관계
TNFα	Tumor necrosis factor-α	종양괴사인자 알파

1. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료

1.1. 제품정보

- **제품명**: 키트루다주(펨브롤리주맙,유전자재조합)
- **작용기전** : 키트루다의 주성분인 펨브롤리주맙 (pembrolizumab, MK-3475 혹은 SCH 900475, ORG 307488-0 이라고도 명명됨)은 humanized monoclonal IgG4/kappa isopyte antibody로, T-cell 에 발현된 PD1 receptor억제를 선택적으로 차단하여 억제되었던 tumor-specific cytotoxic T lymphocytes가 활성화되고 cytokine 생산 및 암세포 제거가 강화되는 등 항종양 면역체계가 강화되어 항종양 효과를 나타냄.

1.2. 기원 및 개발경위

- 키트루다주는 2015년 3월 20일자로 흑색종에 대하여 희귀의약품으로 허가된 후 2016년 4월 30일에 비소세포폐암에 대해 신약으로 허가되었다. 이후 비소세포폐암, 두경부암, 전형적 호지킨 림프종, 요로상피암, 식도암, 신세포암, 자궁내막암, 고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H)암, 삼중음성 유방암, 자궁경부암, 위암에 대하여 허가되었다.

1.3. 신청 적응증 개요 및 치료법

- 자궁경부암
  - 자궁경부암 치료는 어렵고 충족되지 않은 의학적 수요가 높은 영역이다. 국소 진행성 자궁경부암에 대한 표준치료는 동시 화학방사선요법과 후속 근접치료이다. 국소 질환은 조기에 진단하고 치료하면 완치가 가능하지만 화학방사선요법 이후 재발 위험이 있으며 재발률이 높다. 특히 결절 양성 질환이 있는 FIGO 2014 IB2-IIB 기 또는 III-IVA 기 환자(고위험 환자)에서는 더욱 그렇다. 따라서 고위험 국소 진행성 자궁경부암의 효과적인 치료에 대한 옵션이 제한적이다.
  - 펨브롤리주맙은 자궁경부암에 효과적이다. 펨브롤리주맙은 KEYNOTE-826 의 1 차 중간분석을 기반으로 종양이 PD-L1(CPS ≥1)을 발현한 시험대상자에서 화학요법 도중 또는 이후에 진행한, 지속성, 재발성 또는 전이성 자궁경부암 치료를 위해 베바시주맙과 병용하거나 병용하지 않고 화학요법과의 병용으로 미국 및 유럽연합에서 승인을 받았다. 또한 펨브롤리주맙은 KEYNOTE-158 을 기반으로 종양이 PDL1(CPS ≥1)을 발현한 시험대상자에서 화학요법 도중 또는 이후에 질병이 진행한, 재발성 또는 전이성 자궁경부암에 대해 단일요법으로 미국에서 승인을 받았다.

- 담도암
  - 1 차 선택 치료 환경에서 절제불가능한 국소 진행성 또는 전이성 담도암 환자는 치료옵션이 제한되어 있어 충족되지 않는 의학적 필요성이 높다. 젬시타빈과 시스플라틴은 아형에 관계없이 10 년 이상 치료의 주축을 이루고 있다. 일본에서, S-1 (테가푸르, 지메라실 및 오테라실을 포함하는 경구 플루오로피리미딘)과 젬시타빈 병용요법은 제 3 상 FUGA-BT; JCOG1113 임상시험에 기초한 대체 1 차 선택 옵션으로 이는 젬시타빈+시스플라틴과 비교하여 젬시타빈+S-1 의 비열등성을 보여준다. 면역요법과 화학요법을 병용하는 것에 대한 관심이 증가하고 있으며, 최근 몇 년 동안 TOPAZ-1 임상시험을 포함하여 면역관문 저해제+젬시타빈 및 시스플라틴을 평가하는 몇 가지 연구가 시작되었다. 무작위배정 제 3 상 임상시험인 TOPAZ-1 에서는 더발루맙과 병용한 젬시타빈 및 시스플라틴을 평가하였고 최근 미국, 유럽연합, 캐나다 및 일본에서 이 요법을 승인하였다.
  - 기타 NCCN 및 ESMO 권장 1 차 선택 치료 옵션에는 젬시타빈+옥살리플라틴(GEMOX) 및 5-플루오로우라실/카페시타빈-기반 및 탁센-함유(예: 도세탁셀, 파클리탁셀 또는 알부민 결합 파클리탁셀) 병용요법이 포함된다. 하지만 이러한 요법에 대한 글로벌 무작위배정 제 3 상 데이터는 없다. 선택된 생체표지자 집단에 대한 옵션에는 NTRK 유전자 융합양성 종양에 대한 엔트렉티닙 또는 라로트렉티닙, MSI-H/dMMR 종양에 대한 펨브롤리주맙 단독요법 및 RET 융합-양성 종양에 대한 프랄세티닙 및 셀퍼카티닙이 포함된다.

1.4. 신청품목과 관련된 중요한 안전성 쟁점

- 면역 매개 이상반응

1.5. 신청품목의 허가신청 전 민원이력에 관한 사항

- 사전검토 이력
  - 자궁경부암 추가: 유전자재조합의약품과-267호(2024.02.26.)

- 담도암 추가: 유전자재조합의약품과-275호(2024.02.27.)

2. 구조결정・물리화학적 성질 및 생물학적 성질에 관한 자료(품질에 관한 자료)

- 해당사항 없음

3. 안정성에 관한 자료

- 해당사항 없음

4. 독성에 관한 자료

- 해당사항 없음

5. 약리작용에 관한 자료

- 기 허가 시 제출된 자료로 갈음 가능

6. 임상시험성적에 관한 자료

[자궁경부암]

6.1. 임상시험자료의 신뢰성(GCP 준수)

- 자료제출증명서 제출

6.2. 임상시험자료집 개요 (CTD 5.2)

- 임상 1상 0건, 2상 0건, 3상 1건 제출
- 신청 적응증을 입증하는 핵심 임상시험은 KEYNOTE-A18임

6.4. 임상약리시험

펨브롤리주맙의 약물동태학(PK)과 면역원성은 이미 대부분 규명되어 기존 신청 건의 자료들에 수록되었다.

펨브롤리주맙 임상약리학이 확실히 밝혀져 있고 5 배 용량 범위에서 편평한 노출-반응(E-R) 프로파일이 잘 규명되어 있다는 점을 고려할 때, 모든 치료 설정을 통틀어 400 mg 6 주에 1 회 용량처방의 안전성과 유효성이 이미 승인된 200 mg 3 주에 1 회(또는 2 mg/kg 3 주에 1 회)와 비슷할 것으로 예상된다.

따라서, 화학방사선요법과 병용한 400 mg 6 주에 1 회 용량처방은 국소 진행성 자궁경부암 환자들의 동일한 병용 설정에서 임상적 용도의 펨브롤리주맙 200 mg 3 주에 1 회(또는 2 mg/kg 3 주에 1 회) 용량처방과 비슷한 혜택-위험 프로파일을 나타낼 것이다. 마찬가지로 화학방사선요법 병용 이후 펨브롤리주맙 200 mg 3 주에1 회 단일요법은 고위험 국소 진행성 자궁경부암 성인에 대한 치료 요법 일환으로 400 mg 6 주에 1 회 단일요법과 비슷한 혜택-위험 프로파일을 나타낼 것이다.

6.5. 유효성 및 안전성 (CTD 5.3.5)

6.5.1. 유효성·안전성시험 개요

단계	임상시험 제목 및 디자인	투여용량	평가항목

<table>
<tr><th>임상시험
(번호/
저널명)</th><th></th><th>투여기간</th><th></th></tr>
<tr><td>KEYNOTE-A18</td><td>고위험의 국소진행성 자궁경부암 환자를 대상으로 펨브롤리주맙을 병용하거나 병용하지 않은 화학방사선요법을 평가하는 무작위배정, 제3상, 이중 눈가림 임상시험</td><td>
<table>
<tr><th>중재치료</th><th>단위용량과 투여 빈도</th><th>투여 경로</th></tr>
<tr><td>펨브롤리주맙</td><td>200 mg 3주에 1회로 5회 점적주입 후 400 mg 6주회 1회로 15회 점적주입</td><td>정맥 점적주입</td></tr>
<tr><td>위약(생리식염수 또는 덱스트로스 용액)</td><td>3주에 1회로 5회 점적주입 후 6주회 1회로 15회 점적주입</td><td>정맥 점적주입</td></tr>
<tr><td>시스플라틴</td><td>40 mg/m² 매주 1회를 5회 점적주입[a]</td><td>정맥 점적주입</td></tr>
<tr><td>EBRT</td><td>여러 가지</td><td>외부조사 방사선</td></tr>
<tr><td>근접방사선요법</td><td>여러 가지</td><td>내부조사 방사선</td></tr>
</table>
EBRT=external beam radiation therapy, IV=intravenous, Q3W=every 3 weeks, Q6W=every 6 weeks

펨브롤리주맙 및 위약: 3주에 1회로 5회 점적주입 후 6주회 1회로 15회 점적주입
표준 화학방사선요법: 시스플라틴을 매주 1회로 5회 점적주입하면서 40일 동안 EBRT 실시 후 뒤이어 근접방사선요법을 실시</td><td>공동 1차 : PFS(시험자). OS
2차 : PFS(맹검), 2년째 PFS, 3년 째 OS, 12주 째 CR, ORR, PFS2</td></tr>
</table>

6.5.2. 핵심임상시험(Pivotal studies)

1) 임상시험설계

(1) 일반사항

KEYNOTE-A18 은 고위험 국소 진행성 자궁경부암(FIGO 2014 IB2-IIB 기 [결절 양성 질환 동반] 또는 IIIIVA 기 [결절 양성 또는 결절 음성 질환]) 시험대상자에서 펨브롤리주맙과 병용하거나 병용하지 않은 화학방사선요법에 대해 진행 중인 무작위배정, 제 3 상, 위약 대조, 다기관, 이중 눈가림 임상시험이다.

무작위배정된 시험대상자는 예정된 EBRT 유형(IMRT 또는 VMAT vs 비-IMRT 및 비-VMAT), 스크리닝 시의 자궁경부암 병기(FIGO 2014 IB2-IIB vs FIGO 2014 III-IVA 기) 및 EBRT + 근접치료 용량(<70 Gy EQ2D vs ≥70 Gy EQ2D)으로 정의된, 예정된 총 방사선요법 용량에 따라 층화되었으며 다음 치료군 중 하나에 1:1 의 비율로 배정되었다:

• 1군 (본문에서는 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법이라고 함): 펨브롤리주맙 (200 mg 3주에 1회씩 5회 점적주입)과 병용한 동시 화학방사선요법, 이후 펨브롤리주맙 단일요법 (400 mg 6주에 1회씩 15회 점적주입)

• 2군 (본문에서는 위약 + 화학방사선요법이라고 함): 위약 (3주에 1회씩 5회 점적주입)과 병용한 동시 화학방사선요법, 이후 위약 단독투여 (6주에 1회씩 15회 점적주입) 표준치료 화학방사선요법은 펨브롤리주맙 (1 군) 또는 위약(2 군) 3 주에 1 회 투여 기간 동안 투여되었으며 다음을 포함한다:


• 시스플라틴, 5회 점적주입, 40 mg/m2 용량으로 매주 정맥 투여(선택사항, 시스플라틴 여섯 번째 점적주입은 지역 관행에 따라 투여될 수 있다) +

• 40일 동안 EBRT, 이후 근접치료

참고: 근접치료는 EBRT 완료 이후에 실시되어야 하며 EBRT 및 근접치료 전체 치료 시간은 50 일 초과해서는 안 된다(예기치 않게 지연되는 경우 최대 56 일까지 연장됨). 허용 가능한 최소 방사선은 volume-directed 의 경우 80 Gy, point-directed 의 경우 75 Gy 이다.

그림 2.7.3-cervical4: 1

KEYNOTE-A18 의 임상시험 디자인



(2) 통계적 방법

The study initially allocates one-sided α = 0.025 to test PFS between 2 treatment arms. If the null hypothesis for PFS is rejected, then its α = 0.025 will be fully reallocated to the OS test. Table 12 demonstrates the bounds and boundary properties for PFS hypothesis testing. The actual boundaries will be calculated based on the observed number of PFS events at the interim and final PFS analyses using the Lan-DeMets O'Brien-Fleming spending function accordingly. The final analysis will use the remaining Type I error that has not been spent at the earlier analyses.

The OS hypothesis will be tested at α = 0.025 (only if the null hypotheses for PFS is rejected). Table 13, analogous to the PFS table explained above, demonstrates the bounds and boundary properties for OS hypothesis testing. The actual boundaries will be calculated based on the observed number of OS events at the interim and final OS analyses using the Lan-DeMets O'Brien-Fleming spending function accordingly. The final analysis will use the remaining Type I error that has not been spent at the earlier analyses

Table 12 Boundary Properties for Planned Analyses of PFS Based on Potential Alpha Levels to be Used for Testing

Analysis[a]	Value	α = 0.025
IA1: 78%	Z	2.3212
N: 980	p (1-sided)	0.0101
Events: 237	HR at bound	0.7387
Month: 28	P(Cross) if HR=1	0.0101
	P(Cross) if HR=0.660	0.8016
IA2: 100%	Z	2.0143
N: 980	p (1-sided)	0.0220
Events: 304	HR at bound	0.7952
Month: 34	P(Cross) if HR=1	0.0250
	P(Cross) if HR=0.660	0.9500

Abbreviations: HR=hazard ratio; IA=interim analysis; PFS=progression-free survival.
[a] This column displays the number (Events) and percentage (%) of needed PFS events, the expected sample size (N) and the estimated months (Month) after the first participant is randomized for each analysis.
p (1-sided): the nominal α for testing.
HR at bound: the approximate hazard ratio required to reach an efficacy bound.
P(Cross if HR=1): the probability of crossing a bound at or before each analysis under the null hypothesis
P(Cross if HR=0.660): the probability of crossing a bound at or before each analysis under the alternative hypothesis.

Table 13 Boundary Properties for Planned Analyses of OS Based on Potential Alpha Levels to be Used for Testing

Analysis[a]	Value	α = 0.025
IA1: 55%	Z	2.8059
N: 980	p (1-sided)	0.0025
Events: 132	HR at bound	0.6131
Month: 28	P(Cross) if HR=1	0.0025
	P(Cross) if HR=0.671	0.2985
IA2: 76%	Z	2.3511
N: 980	p (1-sided)	0.0094
Events: 182	HR at bound	0.7056
Month: 34	P(Cross) if HR=1	0.0101
	P(Cross) if HR=0.671	0.6334
Final: 100%	Z	2.0178
N: 980	p (1-sided)	0.0218
Events: 240	HR at bound	0.7703
Month: 42	P(Cross) if HR=1	0.0250
	P(Cross) if HR=0.671	0.8600

Abbreviations: HR=hazard ratio; IA=interim analysis; OS=overall survival.
[a] This column displays the number (Events) and percentage (%) of needed OS events, the expected sample size (N) and the estimated months (Month) after first participant is randomized for each analysis.
p (1-sided): the nominal α for testing.
HR at bound: the approximate hazard ratio required to reach an efficacy bound.
P(Cross if HR=1): the probability of crossing a bound at or before each analysis under the null hypothesis
P(Cross if HR=0.671): the probability of crossing a bound at or before each analysis under the alternative hypothesis.

The sample size (number of participants) calculations are based on the following assumptions:

1) PFS follows a Poisson mixture model with approximately 20% participants achieving long-term results (i.e. cure rate of 20% for both arms) and PFS rate at 2 years of 57% for the control arm versus 69% for the treatment arm (HR = 0.660);

2) OS follows a Poisson mixture model with approximately 20% participants achieving long-term results (i.e. cure rate of 20% for both arms) and OS rate at 3 years of 64.5% for the control arm versus 74.5% for the treatment arm (HR = 0.671);
3) enrollment duration of 28 months with an average accrual rate of 35 participants per month;
4) yearly drop-out rate of 2% for both arms.

The assumption of PFS rate of 57% at 2 years and OS rate of 64.5% at 3 years for the control arm is based on data reported in RetroEMBRACE study (largest series published in 2016 for LACC participants treated with CRT) and the CALLA study [Monk, B.J. 2022]. The assumption of 20% cure rate is based on the data reported from SEER database (stages IB2-IVA) [Han, K., et al 2013]. The PFS hypothesis testing is designed for one-sided α = 0.025 and power of 95% to detect an HR of 0.660 with approximately 237 and 304 events between the 2 arms at the planned PFS interim and final analyses.

The OS hypothesis testing is designed for one-sided α = 0.025 (only if the null hypothesis for PFS is rejected) and power of 86% to detect an HR of 0.671 with approximately 132, 182 and 240 events between the 2 arms at the planned OS interim and final analyses.

2) 등록된 환자군 정보

(1) 선정기준

• 국제산부인과학협회(FIGO) 2014 기준에 따라 IB2-IIB기(결절 양성) 또는 III-IVA기(결절 양성이거나 결절 음성)인 고위험의 국소진행성 자궁경부암 환자
• 자궁경부의 편평세포암종, 선암종, 선편평세포암종이 조직학적으로 확진된 환자
• 이전에 자궁경부에 대한 근치적 수술, 방사선요법, 전신요법 치료(임상시험용 의약품 포함) 경험이 없고 면역요법제에 노출된 적이 없는 환자. 국소 자궁경부종양에 대한 이전의 외과시술은 허용되었다.
• 시험 중재치료 최초 투여 전 7일 이내에 동부암협력연구그룹(ECOG) 활동도 상태가 0-1

(2) 인구통계

데이터마감일(2023 년 1 월 9 일) 기준으로 총 1,060 명의 시험대상자가 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법(529 명) 또는 위약 + 화학방사선요법(531 명)에 1:1 의 비율로 무작위배정되었다.

2 명만 제외하고, 시험 중재치료에 무작위배정된 거의 모든 시험대상자가 시험 중재치료를 1 회 이상 투여 받았다. 전반적으로 시험대상자 분포 및 시험중재 영구중단 사유는 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군과 위약 + 화학방사선요법 군 사이에 비슷하였다. 두 치료군 모두에서 가장 빈번하게 인용된 치료 영구중단 사유는 방사선학적 진행이었다.

데이터마감일 기준으로 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군의 추적조사 기간 중앙값은 위약 + 화학방사선요법 군과 비슷하였다 (17.0 개월 vs 17.0 개월).

임상시험에는 고위험 국소 진행성 자궁경부암으로 진단을 받은 시험대상자가 등록되었다. 인구통계학 및 베이스라인 질병 특성은 고위험 국소 진행성 자궁경부암 환자 집단을 대표하였으며 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법군과 위약+ 화학방사선요법군 사이에 대체로 균형적이었다.

• 전체 연령 중앙값(범위): 50.0세(22-87세)
• 성별: 여성 1060명(100.0%)
• 민족성: 히스패닉/라티노 335명(31.6%), 비-히스패닉/비-라티노 717명(67.6%), 보고되지 않음 4명(0.4%), 알려지지 않음 3명(0.3%), 정보 누락 1명(0.1%).
• 인종: 미국 인디언/알래스카 원주민 46명(4.3%), 아시아인 303명(28.6%), 흑인/아프리카계 미국인 22명(2.1%), 다인종 164명(15.5%), 하와이 또는 기타 태평양군도 원주민 3명(0.3%), 백인 518명(48.9%), 정보 누락 4명(0.4%).
• PD-L1 상태: CPS ≥1 1000명(94.3%), CPS <1 50명(4.7%), 정보 누락 10명(0.9%).

	Pembrolizumab + CCRT		Placebo + CCRT		Total	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	529		531		1,060	
Sex						
Female	529	(100.0)	531	(100.0)	1,060	(100.0)
Age (Years)						
< 65	473	(89.4)	454	(85.5)	927	(87.5)
>= 65	56	(10.6)	77	(14.5)	133	(12.5)
Mean	49.4		50.1		49.8	
SD	11.9		12.3		12.1	
Median	49.0		50.0		50.0	
Range	22 to 87		22 to 78		22 to 87	
Race						
American Indian Or Alaska Native	24	(4.5)	22	(4.1)	46	(4.3)
Asian	155	(29.3)	148	(27.9)	303	(28.6)
Black Or African American	14	(2.6)	8	(1.5)	22	(2.1)
Multiple	78	(14.7)	86	(16.2)	164	(15.5)
Native Hawaiian Or Other Pacific Islander	2	(0.4)	1	(0.2)	3	(0.3)
White	254	(48.0)	264	(49.7)	518	(48.9)
Missing	2	(0.4)	2	(0.4)	4	(0.4)
Ethnicity						
Hispanic Or Latino	161	(30.4)	174	(32.8)	335	(31.6)
Not Hispanic Or Latino	362	(68.4)	355	(66.9)	717	(67.6)
Not Reported	4	(0.8)	0	(0.0)	4	(0.4)
Unknown	1	(0.2)	2	(0.4)	3	(0.3)
Missing	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.1)
Geographic Region						
Asia Pacific	155	(29.3)	150	(28.2)	305	(28.8)
EMEA	186	(35.2)	183	(34.5)	369	(34.8)
North America	34	(6.4)	45	(8.5)	79	(7.5)
Latin America	154	(29.1)	153	(28.8)	307	(29.0)
Geographic Region 2						
North America	34	(6.4)	45	(8.5)	79	(7.5)
Western Europe	137	(25.9)	127	(23.9)	264	(24.9)
Rest of the World	358	(67.7)	359	(67.6)	717	(67.6)
Age Group (Years)						
< 65	473	(89.4)	454	(85.5)	927	(87.5)
65 - 74	50	(9.5)	70	(13.2)	120	(11.3)
75 - 84	5	(0.9)	7	(1.3)	12	(1.1)
85+	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.1)
Baseline ECOG						
0	380	(71.8)	397	(74.8)	777	(73.3)
1	149	(28.2)	134	(25.2)	283	(26.7)
FIGO 2014 Stage at Screening						
IB2 to IIB	235	(44.4)	227	(42.7)	462	(43.6)
III to IVA	294	(55.6)	304	(57.3)	598	(56.4)
Presence of Lymph Node						
Positive Pelvic and/or Para-Aortic	445	(84.1)	438	(82.5)	883	(83.3)
No Positive Pelvic nor Para-Aortic	84	(15.9)	93	(17.5)	177	(16.7)
Histology Subtype						
Non-squamous	96	(18.1)	80	(15.1)	176	(16.6)
Squamous	433	(81.9)	451	(84.9)	884	(83.4)
Planned Type of EBRT						
IMRT or VMAT	469	(88.7)	470	(88.5)	939	(88.6)
non-IMRT and non-VMAT	60	(11.3)	61	(11.5)	121	(11.4)
Planned Total Radiationtherapy Dose per (EQ2D)						
< 70 Gy	47	(8.9)	46	(8.7)	93	(8.8)
>= 70 Gy	482	(91.1)	485	(91.3)	967	(91.2)
PD-L1 Status						
CPS<1	22	(4.2)	28	(5.3)	50	(4.7)
CPS>=1	502	(94.9)	498	(93.8)	1,000	(94.3)
Missing	5	(0.9)	5	(0.9)	10	(0.9)

(3) 질환 특성

- 스크리닝 시점에 시험대상자의 43.6%는 FIGO 2014 IB2-IIB기 질병을 가지고 있었으며 56.4%는 III IVA기 질병을 가지고 있었다. III-IVA기로 분류된 시험대상자 중에서 2명은 IVB기 질병을 가지고 있었다.
- CPS 종양 상태가 알려진 시험대상자 1,050명 중에서 1,000명(94.3%)은 PD-L1 양성 종양(CPS ≥1)을 가지고 있었다.
- 대부분의 시험대상자는 베이스라인 시에 편평 조직을 가지고 있었다 (편평 83.4% vs 비편평 16.6%).
- 대부분의 시험대상자(83.3%)는 스크리닝 시에 양성 골반 및/또는 대동맥 주변 림프절이 존재하였다.

3) 유효성 결과

유효성 분석은 일차 분석에서 ITT 집단을 대상으로 PFS 및 OS 를 평가한 1 차 중간분석(데이터마감일: 2023 년 1 월 9 일)에 근거하였다. 추적조사 기간 중앙값은 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군의 경우 17.0 개월(범위: 0.9- 31.0 개월), 위약 + 화학방사선요법 군의 경우 17.0 개월(범위: 0.9-29.5 개월)이었다. PFS 결과는 269 건의 사건에 근거하였다(정보 비율 88.5%).

(1) 시험자 평가에 근거한 무진행 생존(PFS)

- 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법은 위약 + 화학방사선요법에 비해 우수였으며 RECIST 1.1에 따른 시험자 평가 또는 의심되는 질병 진행에 대한 조직병리학적 확인에 근거한 PFS가 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있게 개선되었다. PFS HR 0.70 (95% CI: 0.55, 0.89; 1-sided p=0.0020)은 질병진행 또는 사망 위험의 30% 감소를 나타낸다.
- 관찰된 p-값 0.0020(단측)은 1차 중간분석에서 사전에 명시된 명목 경계인 0.0172(단측)를 넘어섰다. 따라서 PFS 일차 가설에 대한 성공 기준이 충족되었다.
- PFS에 대한 KM 곡선은 약 3개월째에 분리되어 시간 경과에 따라 분리 상태를 유지하여 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법에 우호적이었다.
- 각 치료군에서 PFS 중앙값은 달성되지 않았다. PFS 비율은 12개월째(72.2% vs 78.2%) 및 24개월째(57.3% vs

67.8%)에 위약 + 화학방사선요법 군에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 높았다.

그림 2.7.3-cervical4: 2
무진행 생존기간에 대한 카플란-마이어 추정치(일차 검열 규칙)시험자 평가에 근거함(ITT 집단




Table 2.7.3-cervical4: 2
KEYNOTE-A18 에 대한 일차 유효성 결과 요약(ITT 집단)

	Pembrolizumab + Chemoradiotherapy (N=529)	**Placebo + Chemoradiotherapy (N=531)**
PFS by Investigator Assessment per RECIST 1.1 or by Histopathologic Confirmation		
Median PFS[a], months (95% CI)	NR (NR, NR)	NR (NR, NR)
HR (95% CI)[b]	0.70 (0.55, 0.89)	
p-value[c]	0.0020	
PFS Rate by Investigator Assessment per RECIST 1.1 or by Histopathologic Confirmation		
12 months (%) (95% CI)	78.2 (73.9, 81.9)	72.2 (67.7, 76.3)
24 months (%) (95% CI)	67.8 (61.8, 73.0)	57.3 (51.2, 62.9)
OS[a]		
Median OS, months (95% CI)	NR (NR, NR)	NR (NR, NR)
HR (95% CI)[b]	0.73 (0.49, 1.07)	
p-value[c]	0.0541	
Rate at month 12 (%) (95% CI)	94.4 (91.8, 96.2)	93.7 (91.0, 95.6)
Rate at month 24 (%) (95% CI)	87.2 (82.4, 90.8)	80.8 (74.8, 85.5)

Abbreviations: CI=confidence interval; CPS=combined positive score; HR=hazard ratio; NR=not reached; OS=overall survival; PD-L1=programmed cell death ligand 1; PFS=progression-free survival; RECIST 1.1=Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1; sSAP=supplemental statistical analysis plan.

[a] From product-limit (Kaplan-Meier) method for censored data.

[b] Based on Cox regression model with Efron's method of tie handling with treatment as a covariate stratified by planned type of EBRT (IMRT or VMAT vs non-IMRT and non-VMAT), stage at screening (FIGO [2014] IB2-IIB vs III-IVA), and planned total radiotherapy dose (<70 Gy vs >=70 Gy) with small strata collapsed as prespecified in the sSAP.

[c] One-sided p-value based on log-rank test stratified by planned type of EBRT (IMRT or VMAT vs non-IMRT and non-VMAT), Stage at screening (FIGO [2014] IB2-IIB vs III-IVA), and planned total radiotherapy dose (<70 Gy vs >=70 Gy) with small strata collapsed as prespecified in the sSAP.

Database Cutoff Date: 09-JAN-2023

(2) 전체 생존

• OS HR은 0.73(95% CI: 0.49, 1.07)으로 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법에 우호적이었다. 관찰된 단측 p-값 0.0541은 1차 중간분석에서 통계적 유의성에 대한 단측 p-값 경계인 0.00006을 넘지 않았다. 하지만 OS 평가변수에 대해 상대적으로 빠른 분석 시점으로 인해 (최종 분석의 정보 비율 42.9%) 결과는 통계적으로 유의하지 않았다.

• 두 치료군 모두에서 OS 중앙값은 달성되지 않았다. OS 비율(KM 추정치)은 24개월째에 (80.8% vs 87.2%) 위약 + 화학방사선요법 군에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 높았다.

• 사전에 명시된 하위군 대부분에 걸친 OS 결과는 1차 중간분석에서 OS 수가 적기 때문에 해석하기가 어렵다.

시험자 평가에 근거한 하위군 인자별 무진행 생존기간 위험비 그래프(일차 검열 규칙)(ITT 집단)





그림 2.7.3-cervical4: 4

전체 생존기간에 대한 카플란-마이어 추정치(ITT 집단)



(3) RECIST 1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한 무진행 생존기간

RECIST 1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한 PFS 는 위에 나타난 바와 같이 시험자 평가에 근거한 PFS 와 일치하였다. 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법은 위약 + 화학방사선요법에 비해 RECIST 1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한 PFS 에서 임상적으로 의미 있는 개선을 제공하였다 (HR 0.76 [95% CI: 0.58, 1.00]).

(4) 기타 이차 유효성 평가변수

① 반응율

12 주째에 시험자 평가에 근거한 완전 반응 비율에 대한 점 추정치는 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군의 경우 32.4%, 위약 + 화학방사선요법 군의 경우 30.3%였다.

12 주째에 BICR 평가에 근거한 완전 반응 비율은 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군의 경우 39.0%, 위약 + 화학방사선 요법 군의 경우 37.6%였다.

Table 11-7
Summary of Objective Response at 12 Weeks after Completion of CCRT
Based on Investigator Assessment per RECIST 1.1
(Participants with Measurable Disease at Baseline)

	Pembrolizumab + CCRT			Placebo + CCRT		
	n	(%)	(95% CI)[a]	n	(%)	(95% CI)[a]
Number of Participants in Population	521			522		
Complete Response (CR)	169	(32.4)	(28.4, 36.6)	158	(30.3)	(26.4, 34.4)
Partial Response (PR)	195	(37.4)	(33.3, 41.7)	177	(33.9)	(29.9, 38.1)
Objective Response (CR+PR)	**364**	**(69.9)**	**(65.7, 73.8)**	**335**	**(64.2)**	**(59.9, 68.3)**
Stable Disease (SD)	12	(2.3)	(1.2, 4.0)	18	(3.4)	(2.1, 5.4)
Disease Control (CR+PR+SD)	**376**	**(72.2)**	**(68.1, 76.0)**	**353**	**(67.6)**	**(63.4, 71.6)**
Progressive Disease (PD)	26	(5.0)	(3.3, 7.2)	38	(7.3)	(5.2, 9.9)
Not Evaluable (NE)	3	(0.6)	(0.1, 1.7)	6	(1.1)	(0.4, 2.5)
No Assessment (NA)	116	(22.3)	(18.8, 26.1)	125	(23.9)	(20.3, 27.8)

[a] Based on binomial exact confidence interval method.
Investigator assessed responses per RECIST 1.1 are included in this table.
Database Cutoff Date: 09JAN2023

② 시험자 평가에 근거한 PFS2

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법은 무작배정일로부터 PFS2 까지의 시간에 있어서 위약 + 화학방사선요법에 비해 임상적으로 의미 있는 개선을 제공하였다 (HR=0.65 [95% CI: 0.45, 0.94]).

③ PRO: 글로벌 건강 상태/삶의 질(QoL)

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법을 투여 받은 시험대상자와 위약 + 화학방사선요법을 투여 받은 시험대상자 간에 EORTC QLQ-C30 의 글로벌 점수를 활용한 HRQoL 평가 측면에서 임상적으로 의미 있는 차이가 관찰되지 않았다. 마찬가지로, QLQ-CX24 증상 특정 점수의 차이는 성적 걱정을 제외하면 관찰되지 않았으며, 베이스라인 대비 LS 평균 차이는 36 주째에 위약 + 화학방사선요법 군에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 높았다 (악화됨을 시사).

(5) PD-L1 상태별 무진행 생존기간 및 전체 생존기간

① 시험자 평가에 근거한 PFS

CPS ≥1 인 하위군에서 시험자 평가에 근거한 PFS 는 전체 ITT 집단의 결과와 일치하였다. CPS ≥1 인 하위군에서 PFS 는 위약 + 화학방사선요법 군에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 개선되었다(HR 0.72 [95% CI: 0.56, 0.92]).

CPS <1 인 하위군의 시험대상자 수는 적었다 (N=50, 전체 시험대상자의 ~5%). CPS <1 인 하위군 시험대상자의 경우 PFS HR 은 0.61(95% CI: 0.18, 2.07)로, 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법에 우호적이었다. 사건 수는 적었으며(치료군 당 사건 7 건 이하) CI 는 넓었다. 이 하위군의 결과는 주의를 기울여 해석해야 한다.

② BICR 평가에 근거한 PFS

CPS ≥1 인 하위군에서 BICR 평가에 근거한 PFS 는 전체 ITT 집단의 결과와 일치하였다. CPS ≥1 인 하위군에서 PFS 는 위약 + 화학방사선요법 군에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 개선되었다(HR 0.77 [95% CI: 0.58, 1.02]).

CPS <1 인 하위군 시험대상자의 경우 HR 은 0.55(95% CI: 0.14, 2.21)로, 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법에 우호적이었다. 사건 수는 적었으며(군 당 사건 6건 이하) CI는 넓었다. 이 하위군의 결과는 주의를 기울여 해석해야 한다.

③ PD-L1 상태별 OS

CPS ≥1 인 하위군의 OS 는 전체 ITT 집단의 결과와 일치하였다. CPS ≥1 인 하위군의 OS 는 위약 + 화학방사선요법 군에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 개선되었다 (HR 0.73 [95% CI: 0.49, 1.09]).

CPS <1 인 하위군 시험대상자의 경우 HR 은 0.51(95% CI: 0.05, 5.72)이었다. OS 수는 군 당 사건 6 건 이하이며 CI 는 넓다. 이 하위군의 결과는 주의를 기울여 해석해야 한다.

4) 안전성 결과

(1) 노출정도

시험약에 대한 노출 기간 중앙값은 두 치료군 시험대상자 간에 비슷하였으며(각각 11.76 개월 및 10.92 개월) 각 군은 동일한 주기 수 중앙값의 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법을 투여 받았다 [Table 2.7.4-cervical4: 2]. 방사선 치료를 모두 완료한 시험대상자에 대한 화학요법 (시스플라틴 점적주입) 및 방사선요법 용량 별 노출 기간 중앙값 또한 두 군 간에 비슷하였다.

시험약에 대한 노출 기간 중앙값은 RSD(4.17 개월)에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군(11.76 개월) 시험대상자에서 더 길었다 [Table 2.7.4-cervical4: 2]. 안전성 분석을 해석할 때에는 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 긴 노출 기간을 고려해야 한다.

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 시험대상자의 70% 이상이 6 개월 이상 치료를 유지하고 있었으며 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 시험대상자의 40% 이상이 12 개월 이상 치료를 받았다.

Table 2.7.4-cervical4: 2
약물 노출 요약(APaT 집단)

	KN-A18 Pembrolizumab+CCRT (N=528)	KN-A18 Placebo+CCRT (N=530)	Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[g] (N=2799)
Duration of Exposure (month)			
Mean	12.08	11.80	6.51
Median	11.76	10.92	4.17
SD	7.51	7.48	5.93
Range	0.03 to 27.01	0.07 to 26.58	0.03 to 30.39
Number of Cycles			
Mean	11.59	11.42	11.08
Median	11.00	11.00	7.00
SD	5.68	5.63	9.60
Range	1.00 to 20.00	1.00 to 20.00	1.00 to 59.00

Each participant is counted once on each applicable duration category row.
Duration of Exposure is calculated as last dose date - first dose date + 1.
In KN-A18, number of cycles of Pembro/Placebo refer to Q3W cycles from C1 to C5 and Q6W from C6 onward.
[g] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab in KN001 Part B1, B2, B3, D, C, F1, F2, F3, KN002 (original phase), KN006, and KN010.
Database cutoff date for Cervical Cancer (KN-A18: 09JAN2023). The list of studies and database cutoff dates for the aggregate safety datasets within this table are provided in the appendix of Module 2.7.4.

(2) 이상사례

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법에 대한 전반적 이상사례 프로파일은 펨브롤리주맙 단일요법 및 시스플라틴기반 화학방사선요법의 기 확립된 안전성 프로파일과 대체로 일치하였다.

한 가지 이상의 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 두 치료군에서 비슷하였다 (99.4% vs 99.2%)[Table 2.7.4-cervical4: 4]. 약물-관련 이상사례, 3-5 등급 이상사례, 3-5 등급 약물-관련 이상사례, 사망을 초래한 이상사례 (사망을 초래한 약물-관련 이상사례 포함), 중대한 이상사례, 약물-관련 중대한 이상사례, 치료 영구중단을 초래한 이상사례(모든 및 약물-관련)을 경험한 시험대상자 발생률은 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 및 위약 + 화학방사선요법 군에서 대체로 비슷하였다. 관찰된 차이는 펨브롤리주맙에 화학방사선요법을 추가하는 것과 일치하였다[Table 2.7.4-cervical4: 4].

RSD 와 비교하면 약물-관련 이상사례, 3-5 등급 이상사례, 3-5 등급 약물-관련 이상사례, 약물-관련 중대한 이상사례를 경험한 시험대상자 및 이상사례로 인해 치료를 영구중단한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 높았다(5 % 포인트 이상 차이)[Table 2.7.4-cervical4: 4]. 이러한 이상사례의 더 높은 발생률은 KEYNOTE-A18 시험대상자가 펨브롤리주맙에 추가하여 시스플라틴 및 방사선을 투여 받았기 때문에 예견된 것이었다. 또한 [Table 2.7.4-cervical4: 2]에서 논의된 바와 같이, 시험치료에 대한 노출 기간 중앙값은 RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 시험대상자에서 더 길었다 (4.17 개월 vs 11.76 개월).

(3) 흔하게 발생한 이상사례

펨브롤리주맙+화학방사선요법 군에서 보고된 이상사례의 빈도, 유형 및 중증도는 펨브롤리주맙 단일요법 및 화학방사선요법의 기 확립된 개별 안전성 프로파일과 대체로 일치했다.

Table 2.7.4-cervical4: 4
이상사례 요약(APaT 집단)

	KN-A18 Pembrolizumab + CCRT		KN-A18 Placebo+CCRT		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[#]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Subjects in population	528		530		2,799	
with one or more adverse events	525	(99.4)	526	(99.2)	2,727	(97.4)
with no adverse event	3	(0.6)	4	(0.8)	72	(2.6)
with drug-related[a] adverse events	507	(96.0)	509	(96.0)	2,062	(73.7)
with toxicity grade 3-5 adverse events	394	(74.6)	364	(68.7)	1,273	(45.5)
with toxicity grade 3-5 drug-related adverse events	354	(67.0)	321	(60.6)	386	(13.8)
with serious adverse events	150	(28.4)	131	(24.7)	1,042	(37.2)
with serious drug-related adverse events	91	(17.2)	65	(12.3)	282	(10.1)
who died	5	(0.9)	6	(1.1)	110	(3.9)
who died due to a drug-related adverse event	2	(0.4)	2	(0.4)	10	(0.4)
discontinued drug due to an adverse event	92	(17.4)	75	(14.2)	334	(11.9)
discontinued drug due to a drug-related adverse event	81	(15.3)	67	(12.6)	146	(5.2)
discontinued drug due to a serious adverse event	26	(4.9)	20	(3.8)	253	(9.0)
discontinued drug due to a serious drug-related adverse event	20	(3.8)	13	(2.5)	101	(3.6)


이상사례 및 가장 빈번하게 보고된 이상사례(발생률 ≥10%)의 전체 발생률은 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 시험대상자 비율이 더 높았던 백혈구감소증(24.4% vs 18.3%), 저칼륨혈증(21.6% vs 16.2%), AST 증가(17.6% vs 12.5%), 갑상선기능저하증(19.1% vs 4.5%) 및 갑상선기능항진증(11.4% vs 2.1%)를 제외하면 두 치료군 간에 대체로 비슷하였다[Table 2.7.4-cervical4: 5]. 이러한 이상사례는 위약 + 화학방사선요법에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법에서 위험 차이가 더 컸다(즉, 95% CI 의 하한선 >0)).


예상했던 대로 빈혈, 오심, 설사, 호중구감소증, 호중구 수 감소, 혈소판 수 감소, WBC 수 감소, 저마그네슘혈증 및 탈모 등 화학방사선요법과 관련된 이상사례는 대체로 두 치료군에서 비슷하였다[Table 2.7.4-cervical4: 5]

Table 2.7.4-cervical4: 5
이상사례를 경험한 시험대상자(하나 이상의 치료군에서 발생률 ≥10%)권장용어 내림차순 순(APaT 집단)

	KN-A18 Pembrolizumab+ CCRT		KN-A18 Placebo+CCRT		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[#]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	528		530		2,799	
with one or more adverse events	525	(99.4)	526	(99.2)	2,727	(97.4)
with no adverse events	3	(0.6)	4	(0.8)	72	(2.6)
Anaemia	353	(66.9)	343	(64.7)	347	(12.4)
Nausea	317	(60.0)	334	(63.0)	685	(24.5)
Diarrhoea	296	(56.1)	297	(56.0)	625	(22.3)
White blood cell count decreased	175	(33.1)	184	(34.7)	28	(1.0)
Neutrophil count decreased	160	(30.3)	151	(28.5)	21	(0.8)
Vomiting	154	(29.2)	173	(32.6)	387	(13.8)
Hypomagnesaemia	130	(24.6)	122	(23.0)	80	(2.9)
Leukopenia	129	(24.4)	97	(18.3)	22	(0.8)
Neutropenia	120	(22.7)	107	(20.2)	17	(0.6)
Platelet count decreased	118	(22.3)	112	(21.1)	29	(1.0)
Hypokalaemia	114	(21.6)	86	(16.2)	124	(4.4)
Constipation	109	(20.6)	118	(22.3)	498	(17.8)
Urinary tract infection	108	(20.5)	130	(24.5)	162	(5.8)
Hypothyroidism	101	(19.1)	24	(4.5)	236	(8.4)
Alanine aminotransferase increased	98	(18.6)	82	(15.5)	172	(6.1)
Fatigue	94	(17.8)	108	(20.4)	1,044	(37.3)
Aspartate aminotransferase increased	93	(17.6)	66	(12.5)	168	(6.0)
Decreased appetite	92	(17.4)	103	(19.4)	630	(22.5)
Asthenia	90	(17.0)	72	(13.6)	362	(12.9)
Thrombocytopenia	80	(15.2)	66	(12.5)	50	(1.8)
Pyrexia	79	(15.0)	73	(13.8)	357	(12.8)
Dysuria	78	(14.8)	73	(13.8)	46	(1.6)
Lymphocyte count decreased	78	(14.8)	92	(17.4)	44	(1.6)
Weight decreased	75	(14.2)	78	(14.7)	220	(7.9)
Abdominal pain	70	(13.3)	70	(13.2)	274	(9.8)
Headache	66	(12.5)	66	(12.5)	400	(14.3)
Hyperthyroidism	60	(11.4)	11	(2.1)	96	(3.4)
Hyponatraemia	57	(10.8)	58	(10.9)	146	(5.2)
COVID-19	53	(10.0)	46	(8.7)	0	(0.0)
Blood creatinine increased	51	(9.7)	58	(10.9)	108	(3.9)
Lymphopenia	51	(9.7)	55	(10.4)	33	(1.2)
Arthralgia	50	(9.5)	57	(10.8)	636	(22.7)
Pelvic pain	47	(8.9)	62	(11.7)	23	(0.8)
Rash	40	(7.6)	23	(4.3)	508	(18.1)
Back pain	39	(7.4)	41	(7.7)	344	(12.3)
Pruritus	30	(5.7)	26	(4.9)	580	(20.7)
Cough	25	(4.7)	23	(4.3)	615	(22.0)
Oedema peripheral	16	(3.0)	12	(2.3)	285	(10.2)
Dyspnoea	9	(1.7)	22	(4.2)	534	(19.1)

Figure 12-1
Between-treatment Comparisons in Selected Adverse Events
(Incidence ≥ 10% in One or More Treatment Groups)
(APaT Population)





펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 병용은 펨브롤리주맙 단일요법-관련 또는 화학방사선요법-관련 독성의 발생률 또는 중증도를 높이지 않았다.

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 하나 이상의 약물-관련 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 위약 + 화학방사선요법 군과 동일하였다 (각 군에서 96.0%) [Table 2.7.4-cervical4: 6]. 가장 빈번하게 보고된 약물-관련 이상사례(발생률 ≥30%)에 대해 관찰된 발생률은 모두 펨브롤리주맙과 관련이 있다고 알려진 면역-매개 이상사례인 갑상선기능저하증(17.6% vs 3.6%) 및 갑상선기능항진증(10.2% vs 2.1%)을 제외하면 두 치료군 간에 대체로 비슷하였다[Table 2.7.4-cervical4: 6]. 이러한 이상사례는 펨브롤리주맙의 잘 확립된 안전성 프로파일과 일치하며 새로운 안전성 우려사항을 나타내지 않는다.

약물-관련 이상사례 발생률은 두 치료군 모두에서 모든 독성 등급에 걸쳐 대체로 비슷하였다.

약물-관련 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 높았는데 (73.7% vs 96.0%) 이는 펨브롤리주맙에 화학방사선요법을 추가한 것 및 펨브롤리주맙에 대한 노출 기간이 더 긴 것 때문일 가능성이 높다 [Table 2.7.4-cervical4: 6].

다음의 약물-관련 이상사례 발생률은 RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 높았다 (20 % 포인트 이상 차이): 빈혈, 오심, 설사, WBC 수 감소, 호중구 수 감소, 구토, 백혈구감소증, 혈소판 수 감소, 호중구감소증 [Table 2.7.4-cervical4: 6]. 차이는 투여된 화학방사선요법의 알려진 안전성 프로파일과 일치한다.

Dysuria	60	(11.4)	49	(9.2)	4	(0.1)
Hyperthyroidism	54	(10.2)	11	(2.1)	82	(2.9)
Weight decreased	52	(9.8)	53	(10.0)	60	(2.1)
Lymphopenia	48	(9.1)	47	(8.9)	14	(0.5)
Hyponatraemia	43	(8.1)	44	(8.3)	17	(0.6)
Blood creatinine increased	39	(7.4)	42	(7.9)	35	(1.3)
Urinary tract infection	35	(6.6)	33	(6.2)	5	(0.2)
Pyrexia	33	(6.3)	22	(4.2)	126	(4.5)

Table 2.7.4-cervical4: 6
약물-관련 이상사례를 경험한 시험대상자(하나 이상의 치료군에서 발생률 ≥5%)권장용어 내림차순 순
(APaT 집단)

	KN-A18 Pembrolizumab+ CCRT		KN-A18 Placebo+CCRT		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[#]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	528		530		2,799	
with one or more adverse events	507	(96.0)	509	(96.0)	2,062	(73.7)
with no adverse events	21	(4.0)	21	(4.0)	737	(26.3)
Anaemia	313	(59.3)	292	(55.1)	94	(3.4)
Nausea	302	(57.2)	315	(59.4)	304	(10.9)
Diarrhoea	266	(50.4)	271	(51.1)	343	(12.3)
White blood cell count decreased	172	(32.6)	181	(34.2)	14	(0.5)
Neutrophil count decreased	153	(29.0)	148	(27.9)	15	(0.5)
Vomiting	132	(25.0)	150	(28.3)	107	(3.8)
Leukopenia	125	(23.7)	92	(17.4)	15	(0.5)
Platelet count decreased	116	(22.0)	108	(20.4)	12	(0.4)
Neutropenia	113	(21.4)	92	(17.4)	8	(0.3)
Hypothyroidism	93	(17.6)	19	(3.6)	213	(7.6)
Hypomagnesaemia	89	(16.9)	86	(16.2)	19	(0.7)
Decreased appetite	82	(15.5)	85	(16.0)	255	(9.1)
Alanine aminotransferase increased	80	(15.2)	57	(10.8)	97	(3.5)
Fatigue	80	(15.2)	93	(17.5)	678	(24.2)
Asthenia	75	(14.2)	63	(11.9)	218	(7.8)
Aspartate aminotransferase increased	74	(14.0)	48	(9.1)	94	(3.4)
Hypokalaemia	72	(13.6)	57	(10.8)	18	(0.6)
Thrombocytopenia	72	(13.6)	58	(10.9)	23	(0.8)
Constipation	69	(13.1)	64	(12.1)	90	(3.2)
Lymphocyte count decreased	67	(12.7)	82	(15.5)	24	(0.9)
Arthralgia	32	(6.1)	30	(5.7)	297	(10.6)
Radiation skin injury	32	(6.1)	30	(5.7)	1	(0.0)
Abdominal pain	30	(5.7)	33	(6.2)	65	(2.3)
Pelvic pain	27	(5.1)	27	(5.1)	3	(0.1)
Hypocalcaemia	26	(4.9)	28	(5.3)	21	(0.8)
Rash	26	(4.9)	18	(3.4)	395	(14.1)
Tinnitus	26	(4.9)	33	(6.2)	1	(0.0)
Myalgia	22	(4.2)	17	(3.2)	146	(5.2)
Pruritus	22	(4.2)	15	(2.8)	483	(17.3)
Dysgeusia	21	(4.0)	28	(5.3)	27	(1.0)
Vitiligo	2	(0.4)	0	(0.0)	159	(5.7)

Every participant is counted a single time for each applicable row and column.
A system organ class or specific adverse event appears on this report only if its incidence in one or more of the columns meets the incidence criterion in the report title, after rounding.
Grades for KN-A18 are based on NCI CTCAE version 5.0
Non-serious adverse events up to 30 days of last dose and serious adverse events up to 90 days of last dose are included.
[#] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab in KN001 Part B1, B2, B3, D, C, F1, F2, F3, KN002 (original phase), KN006, and KN010.
Database cutoff date for Cervical Cancer (KN-A18: 09JAN2023). The list of studies and database cutoff dates for the aggregate safety datasets within this table are provided in the appendix of Module 2.7.4.

(4) 강도별 이상사례

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 3-5 등급 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 위약 + 화학방사선요법 군과 비슷하였다 (74.6% vs 68.7%)[Table 2.7.4-cervical4: 7].

3-5 등급 이상사례의 유형 및 발생률은 두 치료군 간에 비슷하였고 위약 + 화학방사선요법에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법에서 위험 차이가 더 큰 3-5 등급 이상사례는 없었다(즉 치료 차이에 대한 95% CI 하한 >0).

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 시험대상자에서 가장 빈번하게 보고된 3-5 등급 이상사례(발생률 ≥5%)는 전형적으로 화학방사선요법과 관련된 반응인 빈혈, WBC 수 감소, 호중구 수 감소, 림프구 수 감소, 백혈구감소증, 호중구감소증, 림프구감소증 및 저칼륨혈증을 포함하였다[Table 2.7.4-cervical4: 7].

첫 번째 3-5 등급 이상사례 발생까지의 시간 중앙값은 두 치료군 간에 비슷하였다 (17.5 일 vs 16.0 일).

3-5 등급 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 높았다(45.5% vs 74.6%) [Table 2.7.4-cervical4: 7]. RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 발생률이 더 높았던 3-5 등급 이상사례(차이 ≥10%)는 빈혈, WBC 수 감소, 호중구 수 감소, 림프구 수 감소, 백혈구감소중 및 호중구감소증이었다. 이러한 이상사례는 시스플라틴-기반 화학방사선요법의 잘 확립된 안전성 프로파일과 일치하며 새로운 안전성 우려사항을 나타내지 않는다.

약물-관련 3-5 등급 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군과 위약 + 화학방사선요법 군에서 비슷하였다 (67.0% vs 68.6%)[Table 2.7.4-cervical4: 8].

약물-관련 3-5 등급 이상사례의 유형 및 발생률은 두 치료군 간에 대체로 비슷하였다. 두 치료군에서 가장 빈번하게 보고된(발생률 ≥ 10%) 이상사례는 전형적으로 시스플라틴-기반 화학방사선요법과 관련된 반응인 WBC 수 감소, 빈혈, 호중구 수 감소, 백혈구감소증, 림프구 수 감소 및 호중구감소증이었다[Table 2.7.4-cervical4: 8].

약물-관련 3-5 등급 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 펨브롤리주맙 단일요법 RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 높았다 (13.8% vs 67.0%)[Table 2.7.4-cervical4: 8].

RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 발생률이 더 높았던 약물-관련 3-5 등급 이상사례(차이 ≥ 10%)는 WBC 수 감소, 빈혈, 호중구 수 감소, 백혈구감소증, 림프구 수 감소 및 호중구감소증이었다 [Table 2.7.4-cervical4: 8]. 이러한 이상사례는 펨브롤리주맙의 잘 확립된 안전성 프로파일과 일치하며 새로운 안전성 우려사항을 나타내지 않는다.

Table 2.7.4-cervical4: 7
3-5 등급 이상사례를 경험한 시험대상자(하나 이상의 치료군에서 발생률 ≥ 5%)권장용어 내림차순 순
(APaT 집단)

	KN-A18 Pembrolizumab+ CCRT		KN-A18 Placebo+CCRT		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[g]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	528		530		2,799	
with one or more adverse events	394	(74.6)	364	(68.7)	1,273	(45.5)
with no adverse events	134	(25.4)	166	(31.3)	1,526	(54.5)
Anaemia	119	(22.5)	115	(21.7)	90	(3.2)
White blood cell count decreased	104	(19.7)	113	(21.3)	2	(0.1)
Neutrophil count decreased	81	(15.3)	80	(15.1)	3	(0.1)
Lymphocyte count decreased	73	(13.8)	85	(16.0)	12	(0.4)
Leukopenia	69	(13.1)	58	(10.9)	4	(0.1)
Neutropenia	61	(11.6)	56	(10.6)	5	(0.2)
Lymphopenia	46	(8.7)	44	(8.3)	6	(0.2)
Hypokalaemia	29	(5.5)	20	(3.8)	25	(0.9)

Every participant is counted a single time for each applicable row and column.
A system organ class or specific adverse event appears on this report only if its incidence in one or more of the columns meets the incidence criterion in the report title, after rounding.
Grades for KN-A18 are based on NCI CTCAE version 5.0
Non-serious adverse events up to 30 days of last dose and serious adverse events up to 90 days of last dose are included.
MedDRA 25.1 preferred terms "Neoplasm Progression", "Malignant Neoplasm Progression" and "Disease Progression" not related to the drug are excluded.
[g] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab in KN001 Part B1, B2, B3, D, C, F1, F2, F3, KN002 (original phase), KN006, and KN010.
Database cutoff date for Cervical Cancer (KN-A18: 09JAN2023). The list of studies and database cutoff dates for the aggregate safety datasets within this table are provided in the appendix of Module 2.7.4.

Table 2.7.4-cervical4: 8
약물-관련 3-5 등급 이상사례를 경험한 시험대상자(하나 이상의 치료군에서 발생률 ≥ 1%)권장용어 빈도 내림차순(APaT 집단)

	KN-A18 Pembrolizumab+ CCRT		KN-A18 Placebo+CCRT		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[g]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	528		530		2,799	
with one or more adverse events	354	(67.0)	321	(60.6)	386	(13.8)
with no adverse events	174	(33.0)	209	(39.4)	2,413	(86.2)
White blood cell count decreased	102	(19.3)	111	(20.9)	0	(0.0)
Anaemia	99	(18.8)	84	(15.8)	13	(0.5)
Neutrophil count decreased	77	(14.6)	78	(14.7)	2	(0.1)
Leukopenia	67	(12.7)	57	(10.8)	3	(0.1)
Lymphocyte count decreased	63	(11.9)	75	(14.2)	4	(0.1)
Neutropenia	56	(10.6)	51	(9.6)	3	(0.1)
Lymphopenia	44	(8.3)	39	(7.4)	2	(0.1)
Platelet count decreased	25	(4.7)	13	(2.5)	1	(0.0)
Diarrhoea	22	(4.2)	23	(4.3)	25	(0.9)
Hypokalaemia	22	(4.2)	15	(2.8)	7	(0.3)
Hypomagnesaemia	12	(2.3)	11	(2.1)	0	(0.0)
Alanine aminotransferase increased	9	(1.7)	5	(0.9)	14	(0.5)
Febrile neutropenia	8	(1.5)	5	(0.9)	0	(0.0)
Gamma-glutamyltransferase increased	8	(1.5)	2	(0.4)	6	(0.2)
Nausea	7	(1.3)	9	(1.7)	10	(0.4)
Thrombocytopenia	7	(1.3)	6	(1.1)	3	(0.1)
Hypocalcaemia	6	(1.1)	4	(0.8)	0	(0.0)
Urinary tract infection	6	(1.1)	2	(0.4)	0	(0.0)
Hyponatraemia	5	(0.9)	7	(1.3)	11	(0.4)
Fatigue	4	(0.8)	4	(0.8)	30	(1.1)
Colitis	3	(0.6)	2	(0.4)	27	(1.0)
Vomiting	3	(0.6)	7	(1.3)	9	(0.3)
Pneumonitis	2	(0.4)	0	(0.0)	32	(1.1)

(5) 사망

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 시험대상자에서 사망을 초래한 이상사례는 기저질환 및 펨브롤리주맙 단일요법과 화학방사선요법의 기 확립된 안전성 프로파일과 대체로 일치하였다. 새로운 안전성 우려사항은 확인되지 않았다. 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 사망을 초래한 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 위약 + 화학방사선요법 군과 비슷하였고 (0.9% vs 1.1%) RSD(3.9%)와 대체로 일치하였다.

전반적으로, 이상사례로 인해 사망한 시험대상자는 각각 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 5 명 및 위약 + 화학방사선요법 군 6 명이었다. 이들 중 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 시험대상자 2 명(0.4%) (면역-매개 위염 및 대장 천공) 및 위약 + 화학방사선요법 군 2 명(0.4%) (골수부전 및 호중구감소성 대장염)의 이상사례는 시험자 평가에 따라 약물과 관련이 있다고 간주되었다.

Table 14.3-26
Participants With Adverse Events Resulting in Death
(Incidence > 0% in One or More Treatment Groups)
(APaT Population)

	Pembrolizumab + CCRT		Placebo + CCRT	
	n	(%)	n	(%)
Participants in population	528		530	
with one or more adverse events	5	(0.9)	6	(1.1)
with no adverse events	523	(99.1)	524	(98.9)
Blood and lymphatic system disorders	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.2)**
Bone marrow failure	0	(0.0)	1	(0.2)
Cardiac disorders	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.2)**
Acute myocardial infarction	0	(0.0)	1	(0.2)
Gastrointestinal disorders	**2**	**(0.4)**	**1**	**(0.2)**
Immune-mediated gastritis	1	(0.2)	0	(0.0)
Large intestine perforation	1	(0.2)	0	(0.0)
Neutropenic colitis	0	(0.0)	1	(0.2)
General disorders and administration site conditions	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.2)**
Death	0	(0.0)	1	(0.2)
Infections and infestations	**2**	**(0.4)**	**0**	**(0.0)**
Sepsis	1	(0.2)	0	(0.0)
Urosepsis	1	(0.2)	0	(0.0)
Psychiatric disorders	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.2)**
Completed suicide	0	(0.0)	1	(0.2)
Reproductive system and breast disorders	**1**	**(0.2)**	**1**	**(0.2)**
Vaginal haemorrhage	1	(0.2)	1	(0.2)

Table 14.3-27
Participants With Drug-Related Adverse Events Resulting in Death
(Incidence > 0% in One or More Treatment Groups)
(APaT Population)

	Pembrolizumab + CCRT		Placebo + CCRT	
	n	(%)	n	(%)
Participants in population	528		530	
with one or more adverse events	2	(0.4)	2	(0.4)
with no adverse events	526	(99.6)	528	(99.6)
Blood and lymphatic system disorders	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.2)**
Bone marrow failure	0	(0.0)	1	(0.2)
Gastrointestinal disorders	**2**	**(0.4)**	**1**	**(0.2)**
Immune-mediated gastritis	1	(0.2)	0	(0.0)
Large intestine perforation	1	(0.2)	0	(0.0)
Neutropenic colitis	0	(0.0)	1	(0.2)

Every participant is counted a single time for each applicable row and column.
Serious adverse events up to 90 days of last dose are included.
MedDRA V25.1 preferred terms "Neoplasm progression", "Malignant neoplasm progression" and "Disease progression" not related to the drug are excluded.
Database Cutoff Date: 09JAN2023

(6) 시험요법 중단으로 이어진 TEAE

시험치료 영구중단을 초래한 약물-관련 이상사례의 유형 및 발생률은 펨브롤리주맙 단일요법 및 시스플라틴기반 화학방사선요법의 기 확립된 안전성 프로파일과 대체로 일치하였다.

시험치료 영구중단을 초래한 약물-관련 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 두 치료군 모두에서 비슷하였다 (15.3% vs 12.6%).

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 시험대상자에서 시험치료 영구중단을 초래한, 가장 빈번하게 보고된 약물-관련 이상사례(발생률 ≥1%)는 호중구감소증, 백혈구감소증, 호중구 수 감소, WBC 수 감소 및 설사였으며 위약 + 화학방사선요법 군에서 보고된 발생률과 비슷하였다.

시험치료 영구중단을 초래한 약물-관련 이상사례를 경험한 시험대상자 전체 발생률은 RSD 보다 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 높았다 (5 % 포인트 이상 차이) (5.2% vs 15.3%). 이러한 차이는 펨브롤리주맙에 화학방사선요법을 추가함으로써 예견되었다.

펨브롤리주맙/위약 투여 영구중단을 초래한 모든 약물-관련 이상사례는 시험대상자의 <1%에서 발생하였다.

펨브롤리주맙/위약 투여 영구중단을 초래한 약물-관련 이상사례는 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군(6.1%)과 RSD(5.2%) 간에 일치하였다. 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 펨브롤리주맙 투여 영구중단을 초래한, 가장 빈번하게 보고된 약물-관련 이상사례(2 명 이상[발생률 0.4%])은 대장염, 설사, 폐렴증, ALT 증가 및 AST 증가였다. 이러한 반응은 면역-매개 이상사례거나 펨브롤리주맙과 관련이 있다고 알려진 관련 증상 또는 실험실적 비정상치이다.

약물-관련 이상사례로 인해 방사선 요법을 영구중단한 시험대상자는 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 단지 1 명(0.2%), 위약 + 화학방사선요법 군에서 단지 3 명(0.6%)이었다.

Table 14.3-36
Participants With Drug-Related Adverse Events Resulting in Treatment Discontinuation of Pembrolizumab /Placebo
(Incidence > 0% in One or More Treatment Groups)
(APaT Population)

	Pembrolizumab + CCRT		Placebo + CCRT	
	n	(%)	n	(%)
Participants in population	528		530	
with one or more adverse events	32	(6.1)	10	(1.9)
with no adverse events	496	(93.9)	520	(98.1)
Cardiac disorders	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.2)**
Myocarditis	0	(0.0)	1	(0.2)
Endocrine disorders	**1**	**(0.2)**	**0**	**(0.0)**
Hyperthyroidism	1	(0.2)	0	(0.0)
Silent thyroiditis	1	(0.2)	0	(0.0)
Gastrointestinal disorders	**11**	**(2.1)**	**2**	**(0.4)**
Colitis	2	(0.4)	0	(0.0)
Diarrhoea	4	(0.8)	1	(0.2)
Immune-mediated enterocolitis	1	(0.2)	0	(0.0)
Immune-mediated gastritis	1	(0.2)	0	(0.0)
Large intestine perforation	1	(0.2)	0	(0.0)
Neutropenic colitis	0	(0.0)	1	(0.2)
Rectal haemorrhage	1	(0.2)	0	(0.0)
Stomatitis	1	(0.2)	0	(0.0)
Hepatobiliary disorders	**1**	**(0.2)**	**1**	**(0.2)**
Hepatic function abnormal	0	(0.0)	1	(0.2)
Liver disorder	1	(0.2)	0	(0.0)
Immune system disorders	**1**	**(0.2)**	**0**	**(0.0)**
Sarcoidosis	1	(0.2)	0	(0.0)
Infections and infestations	**3**	**(0.6)**	**0**	**(0.0)**
Encephalitis	1	(0.2)	0	(0.0)
Hepatitis C	1	(0.2)	0	(0.0)
Pneumonia	1	(0.2)	0	(0.0)
Investigations	**7**	**(1.3)**	**5**	**(0.9)**
Alanine aminotransferase increased	3	(0.6)	3	(0.6)
Aspartate aminotransferase increased	4	(0.8)	0	(0.0)
Blood bilirubin increased	0	(0.0)	1	(0.2)
Neutrophil count decreased	0	(0.0)	1	(0.2)
Transaminases increased	1	(0.2)	0	(0.0)
Metabolism and nutrition disorders	**1**	**(0.2)**	**0**	**(0.0)**
Hyperamylasaemia	1	(0.2)	0	(0.0)
Musculoskeletal and connective tissue disorders	**1**	**(0.2)**	**0**	**(0.0)**
Arthritis	1	(0.2)	0	(0.0)
Nervous system disorders	**3**	**(0.6)**	**0**	**(0.0)**
Brain oedema	1	(0.2)	0	(0.0)
Guillain-Barre syndrome	1	(0.2)	0	(0.0)
Neuropathy peripheral	1	(0.2)	0	(0.0)
Reproductive system and breast disorders	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.2)**
Female genital tract fistula	0	(0.0)	1	(0.2)
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	**3**	**(0.6)**	**0**	**(0.0)**
Pneumonitis	3	(0.6)	0	(0.0)
Skin and subcutaneous tissue disorders	**1**	**(0.2)**	**0**	**(0.0)**
Pruritus	1	(0.2)	0	(0.0)

Every participant is counted a single time for each applicable row and column.
MedDRA V25.1 preferred terms "Neoplasm progression", "Malignant neoplasm progression" and "Disease progression" not related to the drug are excluded.
Non-serious adverse events up to 30 days of last dose and serious adverse events up to 90 days of last dose are included.
Adverse events with action taken 'Drug Withdrawn' are included.
Drug-related pertains to Pembrolizumab /Placebo.
Database Cutoff Date: 09JAN2023

Source: [PA18V01MK3475: adam-adsl; adae]

(7) 특별 관심대상 이상사례

특별 관심대상 이상사례 전체 발생률은 RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 더 높았다(5% 포인트 이상 차이) (21.5% vs 32.6%)[Table 2.7.4-cervical4: 12]. 이는 주로 낮은 등급 반응인 갑상선기능저하증 및 갑상선기능항진증에 의해 주로 발생하였다. RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 시험치료에 대해 더 긴 노출 기간이 이러한 관찰사항에 기여한 인자일 가능성이 높다. 노출에 대해 보정하는 경우 이러한 비율은 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군과 RSD 간에 비슷하였다. 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 및 위약 + 화학방사선요법 군 사이의 특별 관심대상 이상사례 용어, 특히 갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증 및 대장염의 중복은 기본 집단에서 이러한 반응의 발생률 증가가 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 특별 관심대상 이상사례의 더 높은 발생률에도 기여할 수 있음을 시사한다.

특별 관심대상 이상사례 프로파일은 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군과 RSD 간에 대체로 비슷하였으며 3-5 등급 이상사례, 3-5 등급 약물-관련 이상사례, 중대한 이상사례, 약물-관련 중대한 이상사례 및 영구중단(이상사례, 약물-

관련 이상사례, 중대한 이상사례 및 약물-관련 중대한 이상사례로 인함) 발생률도 비슷하였는데 이는 화학방사선요법 추가가 펨브롤리주맙-특이적 면역-매개 반응 위험을 증가시키지 않았음을 시사한다.

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 시험대상자에서 가장 빈번하게 보고된 특별 관심대상 이상사례(발생률 ≥1%)는 갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증, 대장염 및 폐렴증이었다. 이들 중 갑상선기능항진증(3.4% vs 11.4%)과 갑상선기능저하증(8.4% vs 19.1%)은 RSD 에 비해 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군 시험대상자에서 더 높은 비율로 발생하였다. 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 보고된 대부분의 특별 관심대상 이상사례는 경증 내지 중등증으로 (1 등급 또는 2 등급 심각하지 않았고 보조치료, 치료 일시중단, 전신작용 코르티코스테로이드 투여 및/또는 호르몬 대체요법으로 관리되었으며 시험치료 영구중단을 초래하지 않았다.

펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 펨브롤리주맙 첫 번째 투여 후 특별 관심대상 이상사례 첫 번째 발생까지의 시간 및 기간 중앙값은 대체로 RSD 와 일치하였다. 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 특별 관심대상 이상사례를 치료하기 위한 전신작용 코르티코스테로이드 사용은 펨브롤리주맙 단일요법 RSD 와 일치하였다.

데이터마감일 시점에 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군과 RSD 간에 해소된(39.5% vs 44.6%), 후유증을 남기고 해소된(각각 1.2%), 해소 중(22.1% vs 3.7%) 및 해소되지 않은(37.2% vs 47.8%) 특별 관심대상 이상사례를 경험한 시험대상자 발생률은 대체로 일치하였다.

Table 2.7.4-cervical4: 12
이상사례 요약
특별 관심대상 이상사례의 경우 (APaT 집단)

	KN-A18 Pembrolizumab+ CCRT		KN-A18 Placebo+CCRT		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[g]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Subjects in population	528		530		2,799	
with one or more adverse events	172	(32.6)	62	(11.7)	601	(21.5)
with no adverse event	356	(67.4)	468	(88.3)	2,198	(78.5)
with drug-related[a] adverse events	156	(29.5)	52	(9.8)	516	(18.4)
with toxicity grade 3-5 adverse events	22	(4.2)	6	(1.1)	155	(5.5)
with toxicity grade 3-5 drug-related adverse events	21	(4.0)	6	(1.1)	131	(4.7)
with serious adverse events	15	(2.8)	6	(1.1)	162	(5.8)
with serious drug-related adverse events	15	(2.8)	6	(1.1)	141	(5.0)
who died	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(0.1)
who died due to a drug-related adverse event	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(0.1)
discontinued drug due to an adverse event	12	(2.3)	2	(0.4)	86	(3.1)
discontinued drug due to a drug-related adverse event	12	(2.3)	2	(0.4)	85	(3.0)
discontinued drug due to a serious adverse event	7	(1.3)	1	(0.2)	69	(2.5)
discontinued drug due to a serious drug-related adverse event	7	(1.3)	1	(0.2)	68	(2.4)

[a] Determined by the investigator to be related to the drug. Grades for KN-A18 are based on NCI CTCAE version 5.0
Non-serious adverse events up to 30 days of last dose and serious adverse events up to 90 days of last dose are included.
[g] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab in KN001 Part B1, B2, B3, D, C, F1, F2, F3, KN002 (original phase), KN006, and KN010.
Database cutoff date for Cervical Cancer (KN-A18: 09JAN2023). The list of studies and database cutoff dates for the aggregate safety datasets within this table are provided in the appendix of Module 2.7.4.

6.5.7. 유효성 결과에 대한 요약 및 결론

- KEYNOTE-A18 에서 화학방사선요법과 병용한 펨브롤리주맙 투여는 위약 + 화학방사선요법과 비교하여 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있는 PFS 의 개선을 나타냈다. PFS 의 결과는 대체로 분석된 모든 하위군에 걸쳐 일관적인 펨브롤리주맙+화학방사선요법의 혜택을 뒷받침했다. OS 데이터는 정보를 제공하며 생존에 전반적인 해를 끼치지 않고 PFS 에서 관찰된 혜택을 뒷받침한다.

6.5.8. 안전성 결과에 대한 요약 및 결론

- 펨브롤리주맙 + 화학방사선요법 군에서 관찰된 이상반응은 화학방사선요법 및 펨브롤리주맙 단일요법의 기 확립된 안전성 프로파일과 일치하였다.

6.6. 가교자료

- 해당사항 없음

6.7. 임상에 대한 심사자의견

- 용량 설정의 타당성
  - 3상 임상시험에서 용법용량은 200 mg 3주 1회 5회 주입 후 400 mg 6주 1회 15회 주입으로 해당용량은 내약성이 양호하였음
  - 400 mg 6주 1회 요법을 투여 시작부터 적용하는 용법용량은 해당 임상시험에서 적용되지 않았으나 다양한 암종을 대상으로하는 임상시험에서 200 mg 3주 1회 용법과 병행하여 투여하고 있고 기 제출자료에서 약동학적 분석을 통해 차이가 없음을 확인하였으며 유지치료기에 단독요법으로 400 mg Q6W으로 변경하는 설계이므로 해당 용법에 대한 안전성도 확립되었다고 볼 수 있음
- 유효성의 타당성
  - 1차 평가변수인 시험자가 판단한 무진행 생존은 시험군에 유리한 유의성 있는 결과를 보였음
  - 효능효과의 대상환자군을 Stage III, IVA로 제한하였으며 해당 환자군에서 OS의 HR은 0.51(0.31, 0.83)로 유효성이 확립되었음을 확인함
- 안전성의 타당성
  - 노출기간의 중앙값은 시험군에서 약간 길었고 자궁경부암의 비교적 초기 환자인 점에서 기존 보고된 다른 암종에서의 노출 중앙값보다 2배 이상 노출을 보였음
  - 흔하게 발생한 이상사례는 백혈구 감소증, 저칼륨혈증, AST 증가, 갑상선 기능 저하증 및 항진증으로 기 보고된 이상사례 범주 안에 있음
  - 3-5등급 이상사례는 빈혈, 백혈구 감소증으로 화학방사선요법에서 보고된 일반적인 이상사례임
  - 사망은 면역-매개 위장관 질환으로 인해 발생하였으며 면역-매개 질환은 펨브롤리주맙의 알려진 이상반응임

[담도암]

6.1. 임상시험자료의 신뢰성(GCP 준수)

- 자료제출증명서 제출

6.2. 임상시험자료집 개요 (CTD 5.2)

- 임상 1상 0건, 2상 0건, 3상 1건 제출
- 신청 적응증을 입증하는 핵심 임상시험은 KEYNOTE-966임

6.4. 임상약리시험

- 펨브롤리주맙의 임상약리학 및 5 배 용량 범위에서 잘 확립된 수평한 E-R 프로파일의 견고한 이해에 근거하여, 400 mg 매 6 주 1 회 용량처방의 안전성 및 유효성은 모든 치료 설정에서 승인된 용량처방인 200 mg 매 3 주 1 회(또는 2 mg/kg 매 3 주 1 회)와 유사할 것으로 예측된다. 따라서, 400 mg 매 6 주 1 회 용량처방은 담도암 시험대상자에서 펨브롤리주맙의 임상적 사용에서 200 mg 매 3 주 1 회(또는 2 mg/kg 매 3 주 1 회) 용량처방과 유사한 혜택-위험 프로파일을 가질 것이다.

6.5. 유효성 및 안전성 (CTD 5.3.5)

6.5.1. 유효성·안전성시험 개요

단계 임상시험 (번호/ 저널명)	임상시험 제목 및 디자인	투여용량 투여기간	평가항목
KEYNOTE-966	진행성 및/또는 절제불가능 담도암 환자를 대상으로 1차 선택 요법으로서의 펨브롤리주맙+젬시타빈/시스플라틴을 위약+젬시타빈/시스플라틴과 비교 평가하기 위한 제3상, 무작위배정, 이중-눈가림 임상시험	• 펨브롤리주맙+화학요법: 펨브롤리주맙 200 mg 매 3 주마다 제 1 일에 정맥 투여 + 젬시타빈 1000 mg/m2 및 시스플라틴 25 mg/m2 매 3 주마다 제 1 일 및 제 8 일에 정맥 투여 • 위약+화학요법: 위약 (식염수) 매 3 주마다 제 1 일에 정맥 투여 + 젬시타빈 1000 mg/m2 및 시스플라틴 25 mg/m2 매 3 주마다 제 1 일 및 제 8 일에 정맥 투여	1차 : OS, PFS 2차 : ORR, DOR, 안전성

6.5.2. 핵심임상시험(Pivotal studies)

1) 임상시험설계

(1) 일반사항

KEYNOTE-966 임상시험은 진행 중으로, 근치적 치료(예: 수술 및/또는 방사선)에 적합하지 않으면서 이전에 진행성 질병 환경에서 전신 요법으로 치료를 받지 않았던 진행성 담도암 환자를 대상으로 펨브롤리주맙 + 화학요법을 위약 + 화학요법과 비교하여 평가하는 제 3 상, 무작위배정, 위약-대조, 다기관, 이중-눈가림 임상시험이다.

시험대상자는 두 치료군 중 하나에 1:1 의 비율로 무작위배정되었다:

• 펨브롤리주맙+화학요법:

펨브롤리주맙 200 mg 매 3 주마다 제 1 일에 정맥 투여 + 젬시타빈 1000 mg/m2 및 시스플라틴 25 mg/m2 매 3 주마다 제 1 일 및 제 8 일에 정맥 투여

• 위약+화학요법:

위약 (식염수) 매 3 주마다 제 1 일에 정맥 투여 + 젬시타빈 1000 mg/m2 및 시스플라틴 25 mg/m2 매 3 주마다 제 1 일 및 제 8 일에 정맥 투여


참고: 시스플라틴은 최대 8 주 동안 투여되었고 젬시타빈은 질병 진행 또는 허용할 수 없는 독성 발생 시까지 지속될 수 있었다.

무작위배정은 다음에 의해 층화되었다:

- 지역 (아시아 vs 비-아시아)
- 국소 진행성 vs 전이성
- 기원 부위 (담낭, 간내 또는 간외)

본 제출은 시험대상자 1069 명(펨브롤리주맙 + 화학요법 군 533 명, 위약 + 화학요법 군 536 명)이 등록된 글로벌 코호트에 근거한다. 글로벌 부분 등록이 완료된 후 임상시험은 지역 규제 요건을 충족하기 위해 중국에서 총 158 명이 글로벌 파트 및 확장 파트에 걸쳐 등록될 때까지 추가적으로 46 명이 중국에만(중국 확장 코호트) 등록할 수 있도록 공개 상태를 유지하였다.

Figure 2.7.3-btc1: 1
KEYNOTE-966 임상시험 디자인



(2) 통계적 방법

The study will randomize 788 participants in a 1:1 ratio into the pembrolizumab plus gemcitabine/cisplatin or placebo plus gemcitabine/cisplatin arms. PFS and OS are primary endpoints for the study, with ORR as the key secondary endpoint.

For the OS endpoint, based on a target number of 598 events and 3 interim analyses, the study has approximately 93% power to detect an HR of 0.75 at an overall alpha level of 0.0215 (1-sided).


For the PFS endpoint, based on the expected number of 617 events at the final analysis and 1 interim analysis, the study has approximately 95% power to detect an HR of 0.70 at an overall alpha level of 0.0025 (1-sided).

The sample size and power calculations for PFS and OS assume the following:

- PFS follows an exponential distribution with a median of 6 months for the control group.
- OS follows an exponential distribution in both arms with a median of 12 months for the control group.
- Enrollment period of 28 months.
- An annual dropout rate drop-out rate of 11% and 1.2% for PFS and OS, respectively.
- A follow-up period of 9 and 18 months for PFS and OS, respectively, after the last participant enrolls.

The ORR power calculation is based on the following assumptions: 1) under an overall alpha level of 0.001; 2) the underlying ORR is 25% in the placebo + gemcitabine/cisplatin arm [Valle, J., et al 2010]. The study has ~49% to detect a true ORR rate difference of 10% (pembrolizumab + gemcitabine/cisplatin versus placebo + emcitabine/cisplatin). The power is ~71% and 92% if the true ORR rate difference is 12% and 15% respectively.

Figure 2.7.3-btc1: 2
KEYNOTE-966 임상시험의 1종 오류 제어를 위한 다중도 다이어그램



2) 등록된 환자군 정보

(1) 선정기준

최소 18세 이상으로 조직학적으로 진행성 담도암 진단이 확인되었고 RECIST1.1에 따라 측정 가능한 질

병을 가지고 있으며 신보조/보조 요법을 제외하고 이전에 전신요법을 받지 않았으며 ECOG 활동도 상태 0점 또는 1점인 남성 및 여성 시험대상자가 포함되었다. 조절된 HBV 및 과거 또는 현재 HCV 감염을 가지고 있는 시험대상자가 본 임상시험에 적합하였다.

1. Has histologically confirmed diagnosis of advanced (metastatic) and/or unresectable (locally advanced) biliary tract cancer (intra-or extrahepatic cholangiocarcinoma or gallbladder cancer). 2. Have measurable disease based on RECIST 1.1, as determined by the site investigator. Lesions situated in a previously treated area by either radiotherapy, photodynamic therapy, or arterial embolization are considered measurable if progression has been demonstrated in such lesions and they meet criteria for measurable disease. 3. Participants with past or ongoing HCV infection are eligible for the study. Treated participants must have completed their treatment at least 1 month prior to starting study intervention. Untreated or incompletely treated HCV participants may initiate anti-viral therapy for HCV if liver function remains stable for at least 3 months on study intervention. 4. Participants with controlled hepatitis B are eligible for the study , as long as they meet the following criteria: ㉠ Participants with chronic HBV infection, defined as HBsAg positive and/or detectable HBV DNA, must be given antiviral therapy for HBV for at least 4 weeks prior to the first dose of study intervention and HBV viral load must be less than 100 IU/mL prior to first dose of study treatment. Participants on active HBV therapy with viral loads under 100 IU/mL should stay on the same therapy throughout study intervention. Antiviral therapy after completion of study intervention should follow local guidelines. ㉡ Participants with clinically resolved HBV infection, defined as HBsAg negative and anti-HBc positive, and who have an undetectable HBV viral load at screening should be checked every 6 weeks for HBV viral load and treated for HBV if viral load is over 100 IU/mL. Antiviral therapy after completion of study intervention should follow local guidelines.

(2) 인구통계

데이터마감일인 2022 년 12 월 15 일 기준으로, 1069 명의 시험대상자가 글로벌 임상시험에 무작위배정되었다 (펨브롤리주맙 + 화학요법 군 533 명, 위약 + 화학요법 군 536 명). 무작위배정된 시험대상자 중에서 1063 명이 치료를 받았다 (펨브롤리주맙 + 화학요법 군 529 명, 위약 + 화학요법 군 534 명).

- 전체 연령 중앙값(범위): 64.0 세(23 세~85 세).
- 성별: 여성 522 명 (51.6%) male, 남성 517 명 (48.4%)
- 민족성: 비-히스패닉/비-라티노 882 명(82.5%), 히스패닉/라티노 111 명(10.4%), 보고되지 않음/알 수 없음/누락됨 76 명(7.1%)
- 인종: 백인 524 명(49.0%), 아시아인 495 명(46.3%), 흑인 또는 아프리카계 미국인 14 명(1.3%), 다인종 7 명(0.7%), 아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 3 명(0.3%), 보고되지 않음/알 수 없음/누락됨 25 명(2.3%)

	Pembrolizumab + Chemotherapy		Placebo + Chemotherapy		Total	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	533		536		1,069	
Sex						
Male	280	(52.5)	272	(50.7)	552	(51.6)
Female	253	(47.5)	264	(49.3)	517	(48.4)
Age (Years)						
< 65	269	(50.5)	298	(55.6)	567	(53.0)
>= 65	264	(49.5)	238	(44.4)	502	(47.0)
Mean	63.3		61.8		62.5	
SD	10.3		11.0		10.7	
Median	64.0		63.0		64.0	
Range	23 to 85		28 to 84		23 to 85	
Race						
American Indian Or Alaska Native	2	(0.4)	1	(0.2)	3	(0.3)
Asian	245	(46.0)	250	(46.6)	495	(46.3)
Black Or African American	11	(2.1)	3	(0.6)	14	(1.3)
Multiple	5	(0.9)	2	(0.4)	7	(0.7)
American Indian Or Alaska Native, Black Or African American	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.1)
American Indian Or Alaska Native, Black Or African American, White	0	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.1)
Black Or African American, White	2	(0.4)	1	(0.2)	3	(0.3)
White, Asian	2	(0.4)	0	(0.0)	2	(0.2)
Native Hawaiian Or Other Pacific Islander	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.1)
White	256	(48.0)	268	(50.0)	524	(49.0)
Missing	13	(2.4)	12	(2.2)	25	(2.3)
Ethnicity						
Hispanic Or Latino	59	(11.1)	52	(9.7)	111	(10.4)
Not Hispanic Or Latino	433	(81.2)	449	(83.8)	882	(82.5)
Not Reported	32	(6.0)	31	(5.8)	63	(5.9)
Unknown	5	(0.9)	3	(0.6)	8	(0.7)
Missing	4	(0.8)	1	(0.2)	5	(0.5)
Geographic Region (by Stratification Factor)						
Asia	242	(45.4)	244	(45.5)	486	(45.5)
Non-Asia	291	(54.6)	292	(54.5)	583	(54.5)
Geographic Region						
North America	45	(8.4)	40	(7.5)	85	(8.0)
Western Europe	151	(28.3)	151	(28.2)	302	(28.3)
Rest of the World	337	(63.2)	345	(64.4)	682	(63.8)
Prior Adjuvant Therapy						
Yes	47	(8.8)	48	(9.0)	95	(8.9)
No	486	(91.2)	488	(91.0)	974	(91.1)
Prior Neo-adjuvant Therapy						
Yes	3	(0.6)	1	(0.2)	4	(0.4)
No	530	(99.4)	535	(99.8)	1,065	(99.6)
Prior Surgery						
Yes	157	(29.5)	162	(30.2)	319	(29.8)
No	376	(70.5)	374	(69.8)	750	(70.2)
Prior Radiation						
Yes	21	(3.9)	28	(5.2)	49	(4.6)
No	512	(96.1)	508	(94.8)	1,020	(95.4)
Prior Chemotherapy						
Yes	50	(9.4)	48	(9.0)	98	(9.2)
No	483	(90.6)	488	(91.0)	971	(90.8)
Prior PDT						
No	533	(100.0)	536	(100.0)	1,069	(100.0)
PD-L1 Status (CPS>=1)						
CPS<1	113	(21.2)	110	(20.5)	223	(20.9)
CPS>=1	363	(68.1)	365	(68.1)	728	(68.1)
Indeterminate	57	(10.7)	61	(11.4)	118	(11.0)
PD-L1 Status (CPS>=10)						
CPS<10	273	(51.2)	289	(53.9)	562	(52.6)
CPS>=10	203	(38.1)	186	(34.7)	389	(36.4)
Indeterminate	57	(10.7)	61	(11.4)	118	(11.0)
MSI Status						
MSI-H	6	(1.1)	4	(0.7)	10	(0.9)
MSS	433	(81.2)	422	(78.7)	855	(80.0)
Indeterminate	94	(17.6)	110	(20.5)	204	(19.1)
ECOG Performance Status						
0	258	(48.4)	228	(42.5)	486	(45.5)
1	274	(51.4)	308	(57.5)	582	(54.4)
>=2	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.1)
Site of Origin						
Gallbladder	115	(21.6)	118	(22.0)	233	(21.8)
Intrahepatic	320	(60.0)	313	(58.4)	633	(59.2)
Extrahepatic	98	(18.4)	105	(19.6)	203	(19.0)
Disease Status						
Locally Advanced	60	(11.3)	66	(12.3)	126	(11.8)
Metastatic	473	(88.7)	470	(87.7)	943	(88.2)
Hepatitis B Status						
Chronic HBV Infection	14	(2.6)	16	(3.0)	30	(2.8)
Clinically Resolved HBV Infection	150	(28.1)	149	(27.8)	299	(28.0)
Negative	366	(68.7)	366	(68.3)	732	(68.5)
Missing	3	(0.6)	5	(0.9)	8	(0.7)
Any Viral Hepatitis B						
HBV Infection	164	(30.8)	165	(30.8)	329	(30.8)
Negative	366	(68.7)	366	(68.3)	732	(68.5)
Missing	3	(0.6)	5	(0.9)	8	(0.7)
Hepatitis C Status						
HCV Infection	1	(0.2)	1	(0.2)	2	(0.2)
Prior HCV Infection	18	(3.4)	13	(2.4)	31	(2.9)
Negative	514	(96.4)	520	(97.0)	1,034	(96.7)
Missing	0	(0.0)	2	(0.4)	2	(0.2)
Any Viral Hepatitis C						
HCV Infection	19	(3.6)	14	(2.6)	33	(3.1)
Negative	514	(96.4)	520	(97.0)	1,034	(96.7)
Missing	0	(0.0)	2	(0.4)	2	(0.2)
Smoking Status						
Never Smoker	272	(51.0)	295	(55.0)	567	(53.0)
Former Smoker	205	(38.5)	191	(35.6)	396	(37.0)
Current Smoker	56	(10.5)	49	(9.1)	105	(9.8)
Missing	0	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.1)
Alcohol Use Status						
Never Used Alcohol	282	(52.9)	316	(59.0)	598	(55.9)
Used/Using Alcohol	251	(47.1)	219	(40.9)	470	(44.0)
Missing	0	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.1)
Disease Overall Stage						
I	3	(0.6)	2	(0.4)	5	(0.5)
II	19	(3.6)	15	(2.8)	34	(3.2)
III	36	(6.8)	47	(8.8)	83	(7.8)
IV	475	(89.1)	472	(88.1)	947	(88.6)
Biliary Stent/Biliary Drain						
Yes	33	(6.2)	41	(7.6)	74	(6.9)
No	500	(93.8)	495	(92.4)	995	(93.1)
Antibiotics within 1 month of study start						
Yes	291	(54.6)	273	(50.9)	564	(52.8)
No	242	(45.4)	263	(49.1)	505	(47.2)

3) 유효성 결과

KEYNOTE-966 임상시험에서 OS 에 대한 분석은 최종분석(데이터마감일 2022 년 12 월 15 일) 데이터에 근거하였다. 최종분석 데이터마감일 시점에 857 건의 OS 사건이 관찰되었다. PFS, ORR 및 DOR(이차 평가변수)에 대한 분석은 1 차 중간분석 데이터(데이터마감일 2021 년 12 월 15 일)를 기반으로 계획서에 사전 지정되었다

(1) 전체 생존

- 펨브롤리주맙+화학요법은 위약+화학요법에 비해 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있는 OS 개선을 제공하였고 위험비(HR)는 0.83(95% CI: 0.72, 0.95; p-값=0.0034)이었는데 이는 사망 위험의 17% 감소를 나타낸다 [Table 2.7.3-btc1: 2].
- OS 중앙값은 펨브롤리주맙+화학요법 군 및 위약+화학요법 군 각각에서 12.7 개월(95% CI: CI: 11.5, 13.6) 및 10.9 개월(95% CI: 9.9, 11.6)이었다 [Table 2.7.3-btc1: 2].
- OS KM 곡선에 따르면 약 2 개월부터 명확하게 분리되기 시작하여 평가기간 내내 분리 상태를 유지하여 펨브롤리주맙+화학요법에 우호적이었는데 이는 펨브롤리주맙 + 화학요법의 임상적으로 의미 있는 장기 혜택을 시사한다 [Figure 2.7.3-btc1: 3].
- KM 추정에 따르면 12 개월 및 24 개월의 OS 비율은 위약+화학요법 군에 비해 펨브롤리주맙 + 화학요법 군에서 더 높았다 [Table 2.7.3btc1: 3].
- 펨브롤리주맙+화학요법으로 인한 OS 개선은 사전 지정된 하위군에 걸쳐 대체로 일관되었다 [Figure 2.7.3-btc1: 4].

Table 2.7.3-btc1: 2
전체생존기간 분석
(ITT 집단)

Treatment	N	Number of Events (%)	Person-month	Event Rate/100 Person-months	Median OS [a] (months) (95% CI)
Pembrolizumab + Chemotherapy	533	414 (77.7)	7473.3	5.5	12.7 (11.5, 13.6)
Placebo + Chemotherapy	536	443 (82.6)	6799.6	6.5	10.9 (9.9, 11.6)
Pairwise Comparisons			Hazard Ratio[b] (95% CI)[b]		p-Value
Pembrolizumab + Chemotherapy vs. Placebo + Chemotherapy			0.83 (0.72, 0.95)		0.0034[c]

Figure 2.7.3-btc1: 3
전체생존기간에 대한 카플란-마이어 추정치 (ITT 집단)




Figure 2.7.3-btc1: 4
하위군 요인 별 전체생존기간 위험비 숲그림 도표 (ITT 집단)




Table 2.7.3-btc1: 3
시간 경과에 따른 전체생존기간 비율 요약
(ITT 집단)

	Pembrolizumab + Chemotherapy (N=533) % (95% CI)[a]	Placebo + Chemotherapy (N=536) % (95% CI)[a]
Summary of Overall Survival rate at time point		
6 months	80.7 (77.1, 83.8)	73.7 (69.7, 77.2)
12 months	51.6 (47.3, 55.7)	44.1 (39.9, 48.3)
18 months	33.0 (29.1, 37.0)	28.0 (24.3, 31.9)
24 months	24.9 (21.2, 28.8)	18.1 (14.8, 21.7)
a From product-limit (Kaplan-Meier) method for censored data. Database Cutoff Date: 15DEC2022.		

(2) RECIST 1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한 무진행 생존기간

- 펨브롤리주맙+화학요법 투여는 위약+화학요법과 비교할 때 PFS 에서 통계적 유의성을 충족하지 못하였다. PFS HR 은 0.86(95% CI: 0.75, 1.00; p-값=0.0225)으로 펨브롤리주맙+화학요법에 우호적이었다[Table 2.7.3-btc1: 4].
- PFS 중앙값은 각각 펨브롤리주맙+화학요법 군의 경우 6.5 개월(95% CI: 5.7, 6.9), 위약+화학요법 군의 경우 5.6 개월(95% CI: 5.1, 6.6)이었다 [Table 2.7.3-btc1: 4].
- PFS 에 대한 KM 곡선은 약 3 개월(이차 예정 스캔 시점)부터 조기에 분리되기 시작하여 펨브롤리주맙+화학요법에 우호적이었으며 이후 분리 상태를 유지하였다[Figure 2.7.3-btc1: 5].

Table 2.7.3-btc1: 4
RECIST 1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한
1 차 중간분석(일차 중도절단 규칙) 시점의 무진행생존 분석
(ITT 집단)

Treatment	N	Number of Events (%)		Person-month	Event Rate/100 Person-months	Median PFS [a] (months) (95% CI)
Pembrolizumab + Chemotherapy	533	361 (67.7)		3283.0	11.0	6.5 (5.7, 6.9)
Placebo + Chemotherapy	536	391 (72.9)		3069.8	12.7	5.6 (5.1, 6.6)
Pairwise Comparisons				Hazard Ratio[b] (95% CI)[b]		p-Value
Pembrolizumab + Chemotherapy vs. Placebo + Chemotherapy				0.86 (0.75, 1.00)		0.0225[c]

Figure 2.7.3-btc1: 5
RECIST1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한
1 차 중간분석(일차 중도절단 규칙) 시점의
무진행생존 카플란-마이어 추정치 (ITT 집단)




Figure 11-4
Forest Plot of Progression-Free Survival Hazard Ratio by Subgroup Factors at IA1
Based on BICR Assessment per RECIST 1.1 (Primary Censoring Rule)
(ITT Population)




Table 11-4
Summary Of Progression-Free Survival Rate Over Time at IA1 Based on BICR Assessment per RECIST 1.1 (Primary Censoring Rule)
(ITT Population)

	Pembrolizumab + Chemotherapy (N=533) % (95% CI)[a]	Placebo + Chemotherapy (N=536) % (95% CI)[a]
Summary of Progression-Free Survival rate at time point		
6 months	52.3 (47.8, 56.6)	46.1 (41.7, 50.4)
9 months	34.9 (30.5, 39.4)	29.2 (25.1, 33.6)
12 months	25.4 (21.1, 29.9)	19.8 (15.9, 24.0)
15 months	19.4 (15.0, 24.2)	13.1 (9.4, 17.5)
18 months	11.9 (7.8, 17.0)	8.4 (4.8, 13.4)

[a] From product-limit (Kaplan-Meier) method for censored data.
BICR = Blinded independent central review.
Database Cutoff Date: 15DEC2021.

(3) 반응률

- 펨브롤리주맙+화학요법 투여는 위약+화학요법과 비교할 때 ORR(RECIST 에 따른 BICR 에 의함)에서 통계적 유의성을 충족하지 못하였다 [Table 2.7.3-btc1: 5]. 확인된 ORR(RECIST 에 따른 BICR 에 의함)은 각각 펨브롤리주맙+화학요법 군의 경우 28.7%(95% CI: 24.9, 32.8), 위약+화학요법 군의 경우 28.5% (95% CI: 24.8, 32.6)였다.
- 펨브롤리주맙+화학요법의 ORR 결과는 사전 지정된 하위군에 걸쳐 대체로 일관되었다.

Table 2.7.3-btc1: 5
RECIST 1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한
1 차 중간분석 시점의 확인된 객관적반응률 분석
(ITT 집단)

Treatment	N	Number of Objective Responses	Objective Response Rate (%) (95% CI)	Difference in % vs. Placebo + Chemotherapy	
				Estimate (95% CI)[a]	p-Value[b]
Pembrolizumab + Chemotherapy	533	153	28.7 (24.9, 32.8)	0.2 (-5.2, 5.6)	0.4735
Placebo + Chemotherapy	536	153	28.5 (24.8, 32.6)		

Table 2.7.3-btc1: 6
RECIST 1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한
1 차 중간분석 시점의 확인된 최우수 전체 반응 요약 (ITT 집단)

Response Evaluation	Pembrolizumab + Chemotherapy			Placebo + Chemotherapy		
	n	(%)	(95% CI)[a]	n	(%)	(95% CI)[a]
Participants in population	533			536		
Complete Response (CR)	11	2.1	(1.0, 3.7)	7	1.3	(0.5, 2.7)
Partial Response (PR)	142	26.6	(22.9, 30.6)	146	27.2	(23.5, 31.2)
Objective Response Rate (CR+PR)	**153**	**28.7**	**(24.9, 32.8)**	**153**	**28.5**	**(24.8, 32.6)**
Stable Disease (SD)[b]	246	46.2	(41.9, 50.5)	254	47.4	(43.1, 51.7)
Disease Control (CR+PR+SD)	**399**	**74.9**	**(71.0, 78.5)**	**407**	**75.9**	**(72.1, 79.5)**
Progressive Disease (PD)	102	19.1	(15.9, 22.7)	96	17.9	(14.8, 21.4)
Non-evaluable (NE)	8	1.5	(0.7, 2.9)	9	1.7	(0.8, 3.2)
No Assessment	24	4.5	(2.9, 6.6)	24	4.5	(2.9, 6.6)

(4) 반응까지의 시간 및 반응 기간

- 반응까지의 시간 중앙값은 두 투여군 모두에서 2.8 개월이었다 [Table 2.7.3-btc1: 7].
- DOR 중앙값은 위약+화학요법 군에 비해 펨브롤리주맙+화학요법 군에서 더 길었다 (6.9 개월 vs 9.7 개월) [Table 2.7.3-btc1: 7].
- KM 추정에 따르면, 12 개월을 초과하는 확장된 DOR 을 가지는 반응자 비율은 위약+화학요법 군에 비해 펨브롤리주맙+화학요법 군에서 더 높게 유지되었다[Table 2.7.3-btc1: 7].
- DOR 에 대한 KM 곡선은 초기에 분리되어 평가기간 내내 분리 상태를 유지하였으며 펨브롤리주맙+화학요법에 우호적이었다 [Figure 2.7.3-btc1: 6].


Table 2.7.3-btc1: 7
확인된 반응을 나타낸 시험대상자에서 1 차 중간분석 시점에
RECIST 1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한 반응까지의 시간 및 반응 기간 요약
(ITT 집단)

	Pembrolizumab + Chemotherapy (N=533)	Placebo + Chemotherapy (N=536)
Number of participants with response[a]	153	153
Time to Response (months)		
Mean (SD)	3.1 (2.0)	3.0 (1.6)
Median (Range)	2.8 (1.1-11.1)	2.8 (1.2-10.0)
Response Duration[b] (months)		
Median (Range)	9.7 (1.2+ - 22.7+)	6.9 (0.0+ - 19.2+)
Number (%[b]) of Participants with Extended Response Duration:		
≥3 months	132 (93.1)	123 (90.8)
≥6 months	68 (66.5)	55 (55.5)
≥9 months	37 (51.0)	27 (38.5)
≥12 months	21 (41.0)	15 (28.3)
≥15 months	10 (27.4)	4 (16.5)
≥18 months	5 (24.7)	1 (8.3)

[a] Includes participants with confirmed complete response or partial response
[b] From product-limit (Kaplan-Meier) method for censored data.
"+" indicates there is no progressive disease by the time of last disease assessment. BICR = Blinded independent central review. Database Cutoff Date: 15DEC2021

Source: [P966V01MK3475IA1: adam-adsl; adrs; adtte]

Figure 2.7.3-btc1: 6
확인된 반응을 나타낸 시험대상자에서 1 차 중간분석 시점에
RECIST1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한 반응 기간에 대한 카플란-마이어 추정치
(ITT 집단)



Number of participants at risk

Pembrolizumab + Chemotherapy	153	148	119	68	44	28	21	10	8	5	4	2	0	0
Placebo + Chemotherapy	153	144	108	55	34	21	15	4	3	1	0	0	0	0

Table 2.7.3-btc1: 8
확인된 반응을 나타낸 시험대상자에서 최종분석 시점에
RECIST 1.1 에 따른 BICR 평가에 근거한 반응까지의 시간 및 반응 기간 요약
(ITT 집단)

	Pembrolizumab + Chemotherapy (N=533)	Placebo + Chemotherapy (N=536)
Number of participants with response[a]	156	152
Time to Response (months)		
Mean (SD)	3.4 (3.0)	3.2 (2.0)
Median (Range)	2.8 (1.1-26.2)	2.8 (1.2-12.5)
Response Duration[b] (months)		
Median (Range)	8.3 (1.2+ - 33.0+)	6.8 (1.1+ - 30.0+)
Number (%[b]) of Participants with Extended Response Duration:		
≥3 months	141 (93.5)	134 (90.0)
≥6 months	93 (64.6)	77 (54.7)
≥9 months	61 (45.8)	44 (35.5)
≥12 months	47 (38.0)	33 (27.3)
≥15 months	34 (27.5)	17 (18.1)
≥18 months	22 (24.2)	9 (14.4)
≥21 months	16 (20.5)	4 (7.7)
≥24 months	10 (17.6)	3 (5.7)

4) 안전성 결과

(1) 노출정도

임상시험에서 시험약 투여를 영구중단한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙+화학요법 군의 경우 92.4%, 위약+화학요법 군의 경우 94.4%였다. 이 진행성 질병 집단에서 예상된 대로 두 군에서 가장 흔한 투여 영구중단 사유는 질병 진행이었다. 임상시험을 중단한 시험대상자는 펨브롤리주맙+화학요법 군(77.7%)에 비해 위약+화학요법 군(83.2%)에서 더 많았으며 두 투여군에서 가장 흔한 사유는 사망이었다.

데이터마감일 시점에 추적조사 기간 중앙값(무작위배정부터 사망 또는 데이터마감일 중 선행하는 시점까지의 시간 중앙값으로 정의됨)은 펨브롤리주맙+화학요법 군의 경우 12.7 개월(범위: 02, 37.5), 위약+화학요법 군의 경우 10.9 개월이었다.

ITT 집단에서 데이터마감일까지의 시간(무작위배정부터 데이터베이스 마감일까지의 시간으로 정의됨) 중앙값은 25.6 개월(범위: 18.3, 38.4)이었다.

Table 2.7.4-btc1: 2
약물 노출 요약
(APaT 집단)

	KN966 Pembrolizumab + Chemotherapy[d] (N=529)	KN966 Placebo + Chemotherapy[d] (N=534)	KN361 Pembrolizumab + Chemotherapy[f] (N=155)	Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[e] (N=2799)
Duration of Exposure (month)				
Mean	8.04	7.29	11.12	6.51
Median	6.37	5.54	8.31	4.17
SD	6.868	6.319	7.785	5.932
Range	0.03 to 36.40	0.03 to 30.62	0.03 to 26.42	0.03 to 30.39
Number of Administrations				
Mean	20.35	18.89	15.97	11.10
Median	16.00	16.00	12.00	7.00
SD	16.276	15.474	10.923	9.642
Range	1.00 to 102.00	1.00 to 80.00	1.00 to 35.00	1.00 to 59.00

Duration of exposure is the time from the first dose date to the last dose date.
[d] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab or Chemotherapy in KN966.
[e] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab in KN001 Part B1, B2, B3, D, C, F1, F2, F3, KN002 (original phase), KN006, and KN010.
[f] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab + Chemotherapy (Gem/Cis) in KN361.
Database cutoff date for Melanoma (KN001-Melanoma: 18APR2014, KN002: 28FEB2015, KN006: 03MAR2015)
Database cutoff date for Lung (KN001-NSCLC: 23JAN2015, KN010: 30SEP2015)
Database cutoff date for Bladder (KN361: 29APR2020)
Database cutoff date for BTC (KN966: 15DEC2022)

(2) 이상사례

전반적으로, KEYNOTE-966 임상시험의 안전성 프로파일은 펨브롤리주맙 단독요법 RSD 의 확립된 안전성 프로파일 및 화학요법의 안전성 프로파일과 대체로 일치하였다[Table 2.7.4-btc1: 5]. 이상사례, 약물-관련 이상사례, 3-5 등급 이상사례, 약물-관련 3-5 등급 이상사례, 중대한 이상사례, 약물-관련 중대한 이상사례 및 시험중재 투여 영구중단을 초래한 이상사례를 경험한 시험대상자 비율은 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군과 위약+화학요법 군에서 대체로 비슷하였다[Table 2.7.4-btc1: 5]. 노출에 대해 보정하는 경우 이상사례 범주 발생률은 KEYNOTE-966 임상시험에서 연구된 두 투여군 간에 대체로 비슷함을 유지하였다 [Table 2.7.4-btc1: 6].

대부분의 이상사례 범주에서 전체 비율은 RSD 에 비해 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙 + 화학요법 군에서 더 높았다. KEYNOTE-966 임상시험의 두 투여군에서 시험약 투여 영구중단의 가장 흔한 사유는 [Sec. 2.7.4-btc1: 2.1.4.1]에서 설명된 대로 화학요법-관련 독성과 일치하였다. 화학요법을 펨브롤리주맙에 추가하는 경우 독성 증가가 예상된다.

KEYNOTE-966 임상시험에서 새로운 적증응-특이적, 면역-매개 사례는 펨브롤리주맙 투여와 관련되지 않았다. AEOSI 특성(유형, 중증도, 결과)은 RSD 의 확립된 전반적인 안전성 프로파일과 대체로 비슷하였고[Sec. 2.7.4-btc1: 2.1.4.3] 시험약 투여 일시중단 또는 영구중단 및/또는 코르티코스테로이드 사용 또는 지지 치료로 대체로 관리가 가

능하였다[Sec. 2.7.4-btc1: 2.1.4.3]. AEOSI 간염의 낮은 발생률이 확인되었는데 이는 RSD 와 일치하였다.

Table 2.7.4-btc1: 5
이상사례 요약
(APaT 집단)

	KN966 Pembrolizumab + Chemotherapy[d]		KN966 Placebo + Chemotherapy[d]		KN361 Pembrolizumab + Chemotherapy[f]		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[e]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	529		534		155		2,799	
with one or more adverse events	524	(99.1)	532	(99.6)	154	(99.4)	2,727	(97.4)
with no adverse event	5	(0.9)	2	(0.4)	1	(0.6)	72	(2.6)
with drug-related[a] adverse events	493	(93.2)	500	(93.6)	149	(96.1)	2,062	(73.7)
with toxicity grade 3-5 adverse events	451	(85.3)	449	(84.1)	133	(85.8)	1,273	(45.5)
with toxicity grade 3-5 drug-related adverse events	377	(71.3)	370	(69.3)	105	(67.7)	386	(13.8)
with serious adverse events	276	(52.2)	263	(49.3)	85	(54.8)	1,042	(37.2)
with serious drug-related adverse events	121	(22.9)	84	(15.7)	42	(27.1)	282	(10.1)
who died	31	(5.9)	49	(9.2)	13	(8.4)	110	(3.9)
who died due to a drug-related adverse event	8	(1.5)	3	(0.6)	1	(0.6)	10	(0.4)
discontinued any drug due to an adverse event	138	(26.1)	122	(22.8)	54	(34.8)	334	(11.9)
discontinued pembrolizumab or placebo	77	(14.6)	66	(12.4)	20	(12.9)	334	(11.9)
discontinued any chemotherapy	124	(23.4)	113	(21.2)	47	(30.3)	--	
discontinued any drug due to a drug-related adverse event	102	(19.3)	81	(15.2)	43	(27.7)	146	(5.2)
discontinued pembrolizumab or placebo	47	(8.9)	26	(4.9)	11	(7.1)	146	(5.2)
discontinued any chemotherapy	90	(17.0)	73	(13.7)	39	(25.2)	--	
discontinued any drug due to a serious adverse event	76	(14.4)	61	(11.4)	29	(18.7)	253	(9.0)
discontinued pembrolizumab or placebo	61	(11.5)	54	(10.1)	16	(10.3)	253	(9.0)
discontinued any chemotherapy	67	(12.7)	52	(9.7)	21	(13.5)	--	
discontinued any drug due to a serious drug-related adverse event	41	(7.8)	20	(3.7)	15	(9.7)	101	(3.6)
discontinued pembrolizumab or placebo	32	(6.0)	14	(2.6)	7	(4.5)	101	(3.6)
discontinued any chemotherapy	35	(6.6)	17	(3.2)	11	(7.1)	--	

Table 2.7.4-btc1: 6
노출-보정 이상사례 요약
(다중 발생 사례 포함)
(APaT 집단)

	Event Count and Rate (Events/100 person-months)[a]			
	KN966 Pembrolizumab + Chemotherapyd	KN966 Placebo + Chemotherapyd	KN361 Pembrolizumab + Chemotherapyf	Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Datasete
Number of Participants exposed	529	534	155	2799
Total exposureb in person-months	4757.41	4405.50	1872.74	20506.03
Total events (rate)				
adverse events	10282 (216.13)	10031 (227.69)	3133 (167.30)	30375 (148.13)
drug-relatedc adverse events	6434 (135.24)	6046 (137.24)	1701 (90.83)	9844 (48.01)
toxicity grade 3-5 adverse events	2066 (43.43)	2012 (45.67)	507 (27.07)	2460 (12.00)
toxicity grade 3-5 drug-related adverse events	1450 (30.48)	1350 (30.64)	329 (17.57)	509 (2.48)
serious adverse events	556 (11.69)	506 (11.49)	192 (10.25)	1824 (8.89)
serious drug-related adverse events	172 (3.62)	118 (2.68)	79 (4.22)	367 (1.79)
adverse events leading to death	31 (0.65)	49 (1.11)	14 (0.75)	111 (0.54)
drug-related adverse events leading to death	8 (0.17)	3 (0.07)	1 (0.05)	10 (0.05)
adverse events resulting in drug discontinuation	163 (3.43)	140 (3.18)	81 (4.33)	352 (1.72)
drug-related adverse events resulting in drug discontinuation	124 (2.61)	92 (2.09)	65 (3.47)	154 (0.75)
serious adverse events resulting in drug discontinuation	78 (1.64)	63 (1.43)	32 (1.71)	266 (1.30)
serious drug-related adverse events resulting in drug discontinuation	43 (0.90)	21 (0.48)	17 (0.91)	106 (0.52)

[a] Event rate per 100 person-months of exposure=event count *100/person-months of exposure.
[b] Drug exposure is defined as the interval between the first dose date + 1 day and the earlier of the last dose date + 30 or the database cutoff date.
[c] Determined by the investigator to be related to the drug.
MedDRA preferred terms "Neoplasm progression", "Malignant neoplasm progression" and "Disease progression" not related to the drug are excluded. Non-serious adverse events up to 30 days of last dose and serious adverse events up to 90 days of last dose are included. Grades are based on NCI CTCAE version 4.03, with the exception of KN966 (version 5.0)
[d] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab or Chemotherapy in KN966. [e] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab in KN001 Part B1, B2, B3, D, C, F1, F2, F3, KN002 (original phase), KN006, and KN010.
[f] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab + Chemotherapy (Gem/Cis) in KN361.
Database cutoff date for Melanoma (KN001-Melanoma: 18APR2014, KN002: 28FEB2015, KN006: 03MAR2015)
Database cutoff date for Lung (KN001-NSCLC: 23JAN2015, KN010: 30SEP2015)
Database cutoff date for Bladder (KN361: 29APR2020)
Database cutoff date for BTC (KN966: 15DEC2022)

(3) 흔하게 발생한 이상사례

KEYNOTE-966 임상시험에서 가장 빈번하게 보고된 이상사례(발생률 ≥10%)는 펨브롤리주맙+화학요법 군 시험대상자에서 비율이 더 높았던 발진, 발열 및 소양증을 제외하면 펨브롤리주맙+화학요법 군과 위약+화학요법 군 사이에 대체로 비슷하였다[Table 2.7.4-btc1: 7]. 발진 및 소양증은 펨브롤리주맙에 대해 알려진 이상사례이기 때문에 펨브롤리주맙+화학요법 군에서도 예상된다.

예상한 대로, 호중구 수 감소, 혈소판 수 감소, WBC 수 감소, 저마그네슘혈증 및 탈모 등 일반적으로 화학요법과 관련된 이상사례는 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군과 위약+화학요법 군 사이에 비슷하였다.

또한 KEYNOTE-966 임상시험의 진행성 담도암 집단에서 예상한 대로 ALT 증가 및 AST 증가 이상사례를 경험한 시험대상자 비율은 RSD 에 비해 펨브롤리주맙+화학요법 군에서 더 높았다 [Table 2.7.4btc1: 7]. 이러한 이상사례 대부분은 1 등급 또는 2 등급이었으며 5 등급 이상사례는 보고되지 않았다.

전반적으로, KEYNOTE-966 임상시험에서 약물-관련 이상사례(시험중재와 관련이 있다고 시험자가 평가함)를 한 가지 이상 경험한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙+화학요법 군과 위약+화학요법 군에서 비슷하였다 (93.2% vs 93.6%) [Table 2.7.4-btc1: 8]. 특정 약물관련 이상사례를 경험한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙 단독요법에 대해 알려진 이상사례인 발진을 제외하면 군 간에 대체로 비슷하였다.

임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군 모두에서의 흔한 약물-관련 이상사례에는 흔한 화학요법-관련 독성인 호중구 수 감소, 빈혈, 혈소판 수 감소, 오심, WBC 감소, 피로, 식욕감소, 구토, 변비 및 발진이 포함되었다 [Table 2.7.4-btc1: 8].

Table 2.7.4-btc1: 7
이상사례를 경험한 시험대상자, 발생률 내림차순
(하나 이상의 투여군에서 발생률 ≥ 10%)
(APaT 집단)

	KN966 Pembrolizumab + Chemotherapy[a]		KN966 Placebo + Chemotherapy[a]		KN361 Pembrolizumab + Chemotherapy[a]		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[c]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	529		534		155		2,799	
with one or more adverse events	524	(99.1)	532	(99.6)	154	(99.4)	2,727	(97.4)
with no adverse events	5	(0.9)	2	(0.4)	1	(0.6)	72	(2.6)
	330	(62.4)	327	(61.2)	39	(25.2)	21	(0.8)
Neutrophil count decreased								
Anaemia	323	(61.1)	313	(58.6)	89	(57.4)	347	(12.4)
Nausea	233	(44.0)	246	(46.1)	91	(58.7)	685	(24.5)
Platelet count decreased	211	(39.9)	212	(39.7)	30	(19.4)	29	(1.0)
Fatigue	187	(35.3)	172	(32.2)	75	(48.4)	1,044	(37.3)
Constipation	186	(35.2)	190	(35.6)	54	(34.8)	498	(17.8)
Decreased appetite	144	(27.2)	155	(29.0)	52	(33.5)	630	(22.5)
White blood cell count decreased	141	(26.7)	127	(23.8)	33	(21.3)	28	(1.0)
Pyrexia	139	(26.3)	104	(19.5)	32	(20.6)	357	(12.8)
Vomiting	122	(23.1)	128	(24.0)	42	(27.1)	387	(13.8)
Diarrhoea	103	(19.5)	98	(18.4)	42	(27.1)	625	(22.3)
Abdominal pain	92	(17.4)	122	(22.8)	12	(7.7)	274	(9.8)
Rash	90	(17.0)	49	(9.2)	29	(18.7)	508	(18.1)
Aspartate aminotransferase increased	88	(16.6)	98	(18.4)	20	(12.9)	168	(6.0)
Alanine aminotransferase increased	87	(16.4)	113	(21.2)	18	(11.6)	172	(6.1)
Hypomagnesaemia	79	(14.9)	79	(14.8)	22	(14.2)	80	(2.9)
Pruritus	77	(14.6)	51	(9.6)	36	(23.2)	580	(20.7)
Asthenia	75	(14.2)	95	(17.8)	31	(20.0)	362	(12.9)
Oedema peripheral	73	(13.8)	85	(15.9)	21	(13.5)	285	(10.2)
Blood creatinine increased	57	(10.8)	58	(10.9)	42	(27.1)	108	(3.9)
Alopecia	55	(10.4)	68	(12.7)	20	(12.9)	52	(1.9)
Back pain	54	(10.2)	73	(13.7)	24	(15.5)	344	(12.3)
Dyspnoea	53	(10.0)	55	(10.3)	20	(12.9)	534	(19.1)
Headache	53	(10.0)	46	(8.6)	20	(12.9)	400	(14.3)
Hyponatraemia	52	(9.8)	52	(9.7)	18	(11.6)	146	(5.2)
Weight decreased	51	(9.6)	63	(11.8)	12	(7.7)	220	(7.9)
Blood bilirubin increased	50	(9.5)	65	(12.2)	2	(1.3)	51	(1.8)
Hypokalaemia	48	(9.1)	67	(12.5)	17	(11.0)	124	(4.4)
Hypothyroidism	46	(8.7)	14	(2.6)	16	(10.3)	236	(8.4)
Abdominal pain upper	40	(7.6)	57	(10.7)	7	(4.5)	115	(4.1)
Arthralgia	39	(7.4)	41	(7.7)	19	(12.3)	636	(22.7)
Cough	36	(6.8)	37	(6.9)	22	(14.2)	615	(22.0)
Urinary tract infection	36	(6.8)	27	(5.1)	38	(24.5)	162	(5.8)
Dyspepsia	33	(6.2)	55	(10.3)	13	(8.4)	66	(2.4)
Dizziness	32	(6.0)	50	(9.4)	26	(16.8)	244	(8.7)
Neuropathy peripheral	21	(4.0)	29	(5.4)	17	(11.0)	76	(2.7)
Acute kidney injury	16	(3.0)	20	(3.7)	21	(13.5)	40	(1.4)
Haematuria	7	(1.3)	7	(1.3)	27	(17.4)	39	(1.4)
Neutropenia	1	(0.2)	0	(0.0)	53	(34.2)	17	(0.6)
Thrombocytopenia	0	(0.0)	0	(0.0)	33	(21.3)	50	(1.8)

Table 2.7.4-btc1: 8
약물-관련 이상사례를 경험한 시험대상자, 발생률 내림차순
(하나 이상의 투여군에서 발생률 ≥ 5%)
(APaT 집단)

	KN966 Pembrolizumab + Chemotherapy[a]		KN966 Placebo + Chemotherapy[a]		KN361 Pembrolizumab + Chemotherapy[a]		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[c]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	529		534		155		2,799	
with one or more adverse events	493	(93.2)	500	(93.6)	149	(96.1)	2,062	(73.7)
with no adverse events	36	(6.8)	34	(6.4)	6	(3.9)	737	(26.3)
Neutrophil count decreased	321	(60.7)	320	(59.9)	37	(23.9)	15	(0.5)
Anaemia	278	(52.6)	269	(50.4)	78	(50.3)	94	(3.4)
Platelet count decreased	199	(37.6)	197	(36.9)	27	(17.4)	12	(0.4)
Nausea	195	(36.9)	219	(41.0)	78	(50.3)	304	(10.9)
Fatigue	154	(29.1)	147	(27.5)	62	(40.0)	678	(24.2)
White blood cell count decreased	139	(26.3)	124	(23.2)	29	(18.7)	14	(0.5)
Decreased appetite	103	(19.5)	104	(19.5)	36	(23.2)	255	(9.1)
Vomiting	86	(16.3)	101	(18.9)	34	(21.9)	107	(3.8)
Constipation	85	(16.1)	74	(13.9)	22	(14.2)	90	(3.2)
Rash	73	(13.8)	37	(6.9)	26	(16.8)	395	(14.1)
Alanine aminotransferase increased	56	(10.6)	71	(13.3)	12	(7.7)	97	(3.5)
Pyrexia	55	(10.4)	35	(6.6)	15	(9.7)	126	(4.5)
Alopecia	53	(10.0)	65	(12.2)	19	(12.3)	24	(0.9)
Diarrhoea	53	(10.0)	55	(10.3)	28	(18.1)	343	(12.3)
Pruritus	52	(9.8)	31	(5.8)	25	(16.1)	483	(17.3)
Asthenia	51	(9.6)	81	(15.2)	29	(18.7)	218	(7.8)
Hypomagnesaemia	49	(9.3)	61	(11.4)	15	(9.7)	19	(0.7)
Aspartate aminotransferase increased	45	(8.5)	60	(11.2)	11	(7.1)	94	(3.4)
Hypothyroidism	41	(7.8)	11	(2.1)	14	(9.0)	213	(7.6)
Blood creatinine increased	39	(7.4)	39	(7.3)	31	(20.0)	35	(1.3)
Oedema peripheral	31	(5.9)	32	(6.0)	11	(7.1)	54	(1.9)
Malaise	30	(5.7)	27	(5.1)	5	(3.2)	23	(0.8)
Dysgeusia	29	(5.5)	27	(5.1)	11	(7.1)	27	(1.0)
Leukopenia	25	(4.7)	12	(2.2)	15	(9.7)	15	(0.5)
Mucosal inflammation	24	(4.5)	23	(4.3)	11	(7.1)	23	(0.8)
Peripheral sensory neuropathy	24	(4.5)	21	(3.9)	8	(5.2)	12	(0.4)
Hyponatraemia	20	(3.8)	20	(3.7)	11	(7.1)	17	(0.6)
Lymphocyte count decreased	20	(3.8)	27	(5.1)	6	(3.9)	24	(0.9)
Stomatitis	19	(3.6)	27	(5.1)	6	(3.9)	33	(1.2)
Neuropathy peripheral	16	(3.0)	23	(4.3)	14	(9.0)	26	(0.9)
Tinnitus	16	(3.0)	14	(2.6)	9	(5.8)	1	(0.0)
Myalgia	15	(2.8)	12	(2.2)	5	(3.2)	146	(5.2)
Paraesthesia	15	(2.8)	14	(2.6)	8	(5.2)	24	(0.9)
Hyperkalaemia	12	(2.3)	4	(0.7)	8	(5.2)	7	(0.3)
Acute kidney injury	9	(1.7)	9	(1.7)	12	(7.7)	8	(0.3)
Arthralgia	9	(1.7)	11	(2.1)	9	(5.8)	297	(10.6)
Vitiligo	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	159	(5.7)
Neutropenia	1	(0.2)	0	(0.0)	52	(33.5)	8	(0.3)
Thrombocytopenia	0	(0.0)	0	(0.0)	31	(20.0)	23	(0.8)

(4) 강도별 이상사례

3-5 등급 이상사례를 한 가지 이상 경험한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙+화학요법 군과 위약+화학요법 군에서 대체로 비슷하였다 (85.3% vs 84.1%) [Table 2.7.4-btc1: 9].

펨브롤리주맙+화학요법 군에서 가장 빈번하게(발생률 ≥5%) 보고된 3-5 등급 이상사례는 호중구 수 감소, 빈혈, 혈소판 수 감소, WBC 수 감소 및 담관염이었다. 3-5 등급 이상사례(발생률 ≥5%)에서 임상적으로 의미 있는 위험 차이는 펨브롤리주맙+화학요법 군과 위약+화학요법 군 간에 관찰되지 않았다.

RSD 에 비해 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군에서 좀 더 빈번하게 보고된 3-5 등급 이상사례(발생률≥5%)에는 호중구 수 감소, 빈혈, 혈소판 수 감소, WBC 수 감소 및 담관염이 포함되었다 [Table 2.7.4-btc1: 9]. 담관염을 제외하면 이러한 이상사례는 흔하고 알려진 화학요법-관련 독성이다. 담관염은 기저 질환과 관련이 있다. 이러한 이상사례 중 새로운 안전성 우려사항을 나타내는 이상사례는 없었다.

KEYNOTE-966 임상시험에서, 3-5 등급 약물-관련 이상사례를 한 가지 이상 경험한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙+화학요법 군과 위약+화학요법 군에서 대체로 비슷하였다 (71.3% vs 69.3%) [Table 2.7.4-btc1: 10]. 두 투여군에서 가장 빈번하게 보고된 3-5 등급 약물-관련 이상사례(발생률 ≥5%)는 호중구 수 감소, 빈혈, 혈소판 수 감소 및 WBC 수 감소였다.

RSD 에 비해 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군에서 좀 더 빈번하게 보고된 3-5 등급 약물-관련 이상사례에는 호중구 수 감소, 빈혈, 혈소판 수 감소 및 WBC 수 감소가 포함되었다 [Table 2.7.4-btc1: 10]. 앞서 고

찰된 바와 같이, 이러한 이상사례의 더 높은 발생률은 화학요법이 펨브롤리주맙에 추가되는 경우에 예상되며 새로운 안전성 우려사항을 나타내지 않는다.

Table 2.7.4-btc1: 9
3-5 등급 이상사례를 경험한 시험대상자, 발생률 내림차순
(하나 이상의 투여군에서 발생률 ≥ 5%)
(APaT 집단)

	KN966 Pembrolizumab + Chemotherapy[d]		KN966 Placebo + Chemotherapy[d]		KN361 Pembrolizumab + Chemotherapy[f]		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[e]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	529		534		155		2,799	
with one or more adverse events	451	(85.3)	449	(84.1)	133	(85.8)	1,273	(45.5)
with no adverse events	78	(14.7)	85	(15.9)	22	(14.2)	1,526	(54.5)
Neutrophil count decreased	257	(48.6)	253	(47.4)	28	(18.1)	3	(0.1)
Anaemia	152	(28.7)	154	(28.8)	40	(25.8)	90	(3.2)
Platelet count decreased	94	(17.8)	107	(20.0)	14	(9.0)	3	(0.1)
White blood cell count decreased	61	(11.5)	47	(8.8)	9	(5.8)	2	(0.1)
Cholangitis	29	(5.5)	23	(4.3)	0	(0.0)	0	(0.0)
Pulmonary embolism	17	(3.2)	14	(2.6)	9	(5.8)	46	(1.6)
Hyponatraemia	14	(2.6)	13	(2.4)	11	(7.1)	62	(2.2)
Urinary tract infection	10	(1.9)	7	(1.3)	18	(11.6)	14	(0.5)
Acute kidney injury	5	(0.9)	12	(2.2)	10	(6.5)	17	(0.6)
Neutropenia	0	(0.0)	0	(0.0)	38	(24.5)	5	(0.2)
Thrombocytopenia	0	(0.0)	0	(0.0)	13	(8.4)	10	(0.4)

Table 2.7.4-btc1: 10
3-5 등급 약물-관련 이상사례를 경험한 시험대상자, 발생률 내림차순
(하나 이상의 투여군에서 발생률 ≥ 5%)
(APaT 집단)

	KN966 Pembrolizumab + Chemotherapy[d]		KN966 Placebo + Chemotherapy[d]		KN361 Pembrolizumab + Chemotherapy[f]		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[e]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	529		534		155		2,799	
with one or more adverse events	377	(71.3)	370	(69.3)	105	(67.7)	386	(13.8)
with no adverse events	152	(28.7)	164	(30.7)	50	(32.3)	2,413	(86.2)
Neutrophil count decreased	247	(46.7)	246	(46.1)	27	(17.4)	2	(0.1)
Anaemia	123	(23.3)	131	(24.5)	35	(22.6)	13	(0.5)
Platelet count decreased	85	(16.1)	99	(18.5)	14	(9.0)	1	(0.0)
White blood cell count decreased	61	(11.5)	46	(8.6)	8	(5.2)	0	(0.0)
Neutropenia	0	(0.0)	0	(0.0)	37	(23.9)	3	(0.1)
Thrombocytopenia	0	(0.0)	0	(0.0)	13	(8.4)	3	(0.1)

(5) 사망

KEYNOTE-966 임상시험에서 사망(>2 명)을 초래한, 가장 빈번하게 보고된 이상사례는 펨브롤리주맙+화학요법 군의 경우 폐렴(0.8%), 사망(0.6%) 및 패혈증이었고 위약 + 화학요법 군의 경우에는 패혈증(1.1%), 사망(0.9%), COVID-19(0.7%), 뇌경색(0.6%) 및 폐색전증(0.6%)이었다 [Table 2.7.4-btc1: 11].

약물-관련 이상사례로 인한 사망은 펨브롤리주맙+화학요법 군의 1.5% 및 위약+화학요법 군의 0.6%에서 보고되었다. 시험자에 의해 시험중재와 관련이 있다고 간주된, 펨브롤리주맙+화학요법 군의 사망 8 건 중에서 5 건(담관염, 하기도감염, 심근경색, 바이러스성 폐렴, 패혈성 쇼크)은 화학요법과, 2 건(복부 농양 및 악성 신생물 진행)은 펨브롤리주맙과, 1 건은 화학요법(젬시타빈) 및 펨브롤리주맙(폐렴증) 모두와 관련이 있다고 간주되었다.

Table 2.7.4-btc1: 11
사망을 초래한 이상사례를 경험한 시험대상자, 발생률 내림차순
(하나 이상의 투여군에서 발생률 >0%)
(APaT 집단)

	KN966 Pembrolizumab + Chemotherapy[d]		KN966 Placebo + Chemotherapy[d]		KN361 Pembrolizumab + Chemotherapy[f]		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[e]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	529		534		155		2,799	
with one or more adverse events	31	(5.9)	49	(9.2)	13	(8.4)	110	(3.9)
with no adverse events	498	(94.1)	485	(90.8)	142	(91.6)	2,689	(96.1)
Pneumonia	4	(0.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	11	(0.4)
Death	3	(0.6)	5	(0.9)	3	(1.9)	17	(0.6)
Sepsis	3	(0.6)	6	(1.1)	0	(0.0)	1	(0.0)
Biliary tract infection	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Euthanasia	2	(0.4)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Abdominal abscess	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Abdominal infection	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
COVID-19	1	(0.2)	4	(0.7)	0	(0.0)	0	(0.0)
Cardiac arrest	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Cholangitis	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Fungal sepsis	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Gastrointestinal haemorrhage	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Lower respiratory tract infection	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Malignant neoplasm progression	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Myocardial infarction	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Pneumocystis jirovecii pneumonia	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Pneumonia aspiration	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Pneumonia viral	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Pneumonitis	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.1)
Pulmonary embolism	1	(0.2)	3	(0.6)	0	(0.0)	3	(0.1)
Septic shock	1	(0.2)	1	(0.2)	0	(0.0)	3	(0.1)
Shock haemorrhagic	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Acute coronary syndrome	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Acute kidney injury	0	(0.0)	2	(0.4)	0	(0.0)	2	(0.1)
Acute myocardial infarction	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.0)
Acute respiratory failure	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	1	(0.0)
Adenocarcinoma gastric	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Anaemia	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Aspiration	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Biliary sepsis	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Brain oedema	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
COVID-19 pneumonia	0	(0.0)	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)
Cachexia	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Cardiac failure	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Cardiac failure congestive	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Cardiac tamponade	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Cardio-respiratory arrest	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	1	(0.0)
Cardiopulmonary failure	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Cellulitis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Cerebral haemorrhage	0	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.6)	0	(0.0)
Cerebral infarction	0	(0.0)	3	(0.6)	0	(0.0)	0	(0.0)
Cerebral venous sinus thrombosis	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Cerebrovascular accident	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(1.3)	2	(0.1)
Cholangitis infective	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Cholecystitis	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Completed suicide	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	2	(0.1)
Device related sepsis	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	0	(0.0)
Diarrhoea	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Diffuse alveolar damage	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Dyspnoea	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Embolism	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.1)
Gastrointestinal perforation	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
General physical health deterioration	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	6	(0.2)
Generalised oedema	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Haemoptysis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Haemorrhagic infarction	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Haemorrhagic stroke	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Haemothorax	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Hepatic failure	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.1)
Hepatic infection	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Hepatorenal syndrome	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Hypoxia	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Ileus	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Infectious pleural effusion	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Interstitial lung disease	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	1	(0.0)
Intestinal obstruction	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Intestinal perforation	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Liver abscess	0	(0.0)	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)
Liver injury	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	0	(0.0)
Lung abscess	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Lung neoplasm malignant	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Lymphangiosis carcinomatosa	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Mental status changes	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Metastatic malignant melanoma	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Multiple organ dysfunction syndrome	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Oesophageal varices haemorrhage	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Pneumococcal sepsis	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Pneumonia acinetobacter	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Pneumonia bacterial	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Pneumothorax	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Post procedural complication	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Pulmonary haemorrhage	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Pulmonary oedema	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Respiratory distress	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Respiratory failure	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	6	(0.2)
Scrotal infection	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	0	(0.0)
Soft tissue infection	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Spinal cord compression	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Spontaneous bacterial peritonitis	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Sudden death	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	0	(0.0)
Traumatic intracranial haemorrhage	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Upper gastrointestinal haemorrhage	0	(0.0)	2	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.0)

Every participant is counted a single time for each applicable row and column.
A system organ class or specific adverse event appears on this report only if its incidence in one or more of the columns meets the incidence criterion in the report title, after rounding.
Non-serious adverse events up to 30 days of last dose and serious adverse events up to 90 days of last dose are included.
MedDRA preferred terms "Neoplasm Progression", "Malignant Neoplasm Progression" and "Disease Progression" not related to the drug are excluded.
[d] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab or Chemotherapy in KN966. [e] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab in KN001 Part B1, B2, B3, D, C, F1, F2, F3, KN002 (original phase), KN006, and KN010.
[f] Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab + Chemotherapy (Gem/Cis) in KN361. Database cutoff date for Melanoma (KN001-Melanoma: 18APR2014, KN002: 28FEB2015, KN006: 03MAR2015)
Database cutoff date for Lung (KN001-NSCLC: 23JAN2015, KN010: 30SEP2015)
Database cutoff date for Bladder (KN361: 29APR2020)
Database cutoff date for BTC (KN966: 15DEC2022)

(6) 시험요법 중단으로 이어진 TEAE

펨브롤리주맙+화학요법 군에서 모든 시험약 투여 영구중단을 초래하는 이상사례를 한 가지 이상 경험한 시험대상

자 비율은 위약+화학요법 군과 대체로 비슷하였다 (26.1% vs 22.8%). 특정 이상사례 발생률은 KEYNOTE-966 임상시험의 두 투여군 간에 비슷하였다. 담관염으로 인해 모든 시험약 투여를 영구중단한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙+화학요법 군 및 위약+화학요법 군 모두에서 낮았다 (각각 0.4% 및 0.6%).

펨브롤리주맙+화학요법 군에서 가장 빈번하게 (≥1%) 보고된 이상사례는 피로, 혈중 크레아티닌 증가, 호중구 수 감소 및 혈소판 수 감소로 이는 흔한 화학요법-관련 독성을 반영한다. 예상한 대로, 모든 시험약 투여 영구중단을 초래한 이상사례를 경험한 시험대상자 비율은 RSD 에 비해 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군에서 더 높았는데 (11.9% vs 26.1%) 이는 부분적으로는 화학요법-관련 독성(호중구 수 감소 및 혈소판 수 감소) 때문이었다.

KEYNOTE-966 임상시험에서, 모든 시험약 투여 영구중단을 초래한 약물-관련 이상사례를 경험한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙+화학요법 군과 위약+화학요법 군에서 대체로 비슷하였다 (19.3% vs 15.2%). 두 투여군에서 모든 시험약 투여 영구중단을 초래한, 가장 빈번하게 보고된 이상사례(발생률 ≥1%)는 호중구 수 감소 및 혈중 크레아티닌 증가였다.

모든 시험약 투여 일시중단을 초래한 이상사례를 한 가지 이상 경험한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙+화학요법 군 및 위약+화학요법 군에서 비슷하였다 (70.5% vs 70.6%). 두 군에서 가장 빈번하게 보고된 이상사례(≥5%)는 호중구 수 감소, 혈소판 수 감소, WBC 수 감소 및 빈혈이었으며, 이는 흔한 화학요법-관련 독성을 반영한다.

모든 시험약 투여 일시중단을 초래한 약물-관련 이상사례를 경험한 시험대상자 비율은 펨브롤리주맙+화학요법 군과 위약+화학요법 군에서 비슷하였다 (56.9% vs 57.1%).

약물-관련 이상사례로 인해 투여를 일시중단한 시험대상자 비율은 RSD 에 비해 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군에서 더 높았다 (각각 12.5% vs 56.9%). 차이는 부분적으로 화학요법-관련 이상사례(호중구 수 감소, 혈소판 수 감소, WBC 수 감소 및 빈혈)의 더 높은 발생률 때문이었다.

(7) 특별 관심대상 이상사례

KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군 시험대상자의 14.9%에서 AEOSI 최대 등급은 1 등급 또는 2 등급이었다. 시험대상자의 7.2%에서 최대 등급은 3-5 등급으로 치명적 AEOSI 폐렴증을 경험한 시험대상자 1 명을 포함하였다. 최악의 AEOSI 결과는 데이터마감일 시점에 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군에서 각각 시험대상자의 37.6% 및 18.8%에서 해소됨 또는 해소중으로 보고되었다.

노출에 대해 보정하는 경우 전체 AEOSI 비율은 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군 (3.32 건/100 명-월), KEYNOTE-361 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군 (3.31 건/100 명-월) 및 RSD (4.06 건/100 명-월)에서 비슷하였다.

KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙+화학요법 군에서 가장 빈번하게 보고된 AEOSI 범주는 갑상선기능저하증 (8.7%), 폐렴증(4.9%) 및 갑상선기능항진증(3.6%)이었다[Table 2.7.4-btc1: 14].

AEOSI 범주 이상사례인 간염을 경험한 시험대상자 비율은 KEYNOTE-966 임상시험의 펨브롤리주맙 + 화학요법 군과 RSD 에서 비슷하였고 (각각 1.7% vs 0.6%) 경화성 담관염, 자가면역 담관염 또는 면역-매개 담관염 이상사례는 보고되지 않았다 [Table 2.7.4-btc1: 14].

Table 2.7.4-btc1: 14
AEOSI 범주 및 권장용어 별 특별 관심대상 이상사례를 경험한 시험대상자
(하나 이상의 투여군에서 발생률 >0%)
(APaT 집단)

	KN966 Pembrolizumab + Chemotherapy[d]		KN966 Placebo + Chemotherapy[d]		KN361 Pembrolizumab + Chemotherapy[f]		Pembrolizumab Monotherapy Reference Safety Dataset[e]	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	529		534		155		2,799	
with one or more adverse events	117	(22.1)	69	(12.9)	40	(25.8)	601	(21.5)
with no adverse events	412	(77.9)	465	(87.1)	115	(74.2)	2,198	(78.5)
Adrenal Insufficiency	**3**	**(0.6)**	**2**	**(0.4)**	**4**	**(2.6)**	**22**	**(0.8)**
Adrenal insufficiency	3	(0.6)	2	(0.4)	3	(1.9)	20	(0.7)
Adrenocortical insufficiency acute	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	1	(0.0)
Secondary adrenocortical insufficiency	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Arthritis	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.6)**	**0**	**(0.0)**
Autoimmune arthritis	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	0	(0.0)
Colitis	**9**	**(1.7)**	**6**	**(1.1)**	**2**	**(1.3)**	**48**	**(1.7)**
Autoimmune colitis	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Colitis	6	(1.1)	5	(0.9)	2	(1.3)	45	(1.6)
Colitis microscopic	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Enterocolitis	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Immune-mediated enterocolitis	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Encephalitis	**2**	**(0.4)**	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.0)**
Encephalitis	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Guillain-Barre Syndrome	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**2**	**(0.1)**
Axonal neuropathy	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Guillain-Barre syndrome	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Hepatitis	**9**	**(1.7)**	**7**	**(1.3)**	**0**	**(0.0)**	**18**	**(0.6)**
Autoimmune hepatitis	3	(0.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	12	(0.4)
Drug-induced liver injury	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	2	(0.1)
Hepatitis	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	5	(0.2)
Immune-mediated hepatitis	5	(0.9)	6	(1.1)	0	(0.0)	0	(0.0)
Hyperthyroidism	**19**	**(3.6)**	**10**	**(1.9)**	**6**	**(3.9)**	**96**	**(3.4)**
Hyperthyroidism	19	(3.6)	10	(1.9)	6	(3.9)	96	(3.4)
Hypoparathyroidism	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.2)**	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.0)**
Hypoparathyroidism	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.0)
Hypophysitis	**2**	**(0.4)**	**2**	**(0.4)**	**1**	**(0.6)**	**17**	**(0.6)**
Hypophysitis	2	(0.4)	1	(0.2)	1	(0.6)	9	(0.3)
Hypophysitis	**2**	**(0.4)**	**2**	**(0.4)**	**1**	**(0.6)**	**17**	**(0.6)**
Hypopituitarism	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	8	(0.3)
Hypothyroidism	**46**	**(8.7)**	**14**	**(2.6)**	**16**	**(10.3)**	**237**	**(8.5)**
Hypothyroidism	46	(8.7)	14	(2.6)	16	(10.3)	236	(8.4)
Myxoedema	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Primary hypothyroidism	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Infusion Reactions	**8**	**(1.5)**	**6**	**(1.1)**	**4**	**(2.6)**	**70**	**(2.5)**
Anaphylactic reaction	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.1)
Anaphylactoid reaction	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Cytokine release syndrome	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Drug hypersensitivity	1	(0.2)	1	(0.2)	1	(0.6)	13	(0.5)
Hypersensitivity	0	(0.0)	2	(0.4)	2	(1.3)	22	(0.8)
Infusion related hypersensitivity reaction	3	(0.6)	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)
Infusion related reaction	3	(0.6)	1	(0.2)	1	(0.6)	29	(1.0)
Myasthenic Syndrome	**1**	**(0.2)**	**1**	**(0.2)**	**0**	**(0.0)**	**2**	**(0.1)**
Myasthenia gravis	1	(0.2)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Myasthenic syndrome	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Myelitis	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.0)**
Myelitis transverse	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Myocarditis	**1**	**(0.2)**	**1**	**(0.2)**	**1**	**(0.6)**	**0**	**(0.0)**
Myocarditis	1	(0.2)	1	(0.2)	1	(0.6)	0	(0.0)
Myositis	**1**	**(0.2)**	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.6)**	**11**	**(0.4)**
Myopathy	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.1)
Myositis	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	7	(0.3)
Rhabdomyolysis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Nephritis	**2**	**(0.4)**	**1**	**(0.2)**	**1**	**(0.6)**	**9**	**(0.3)**
Acute kidney injury	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Autoimmune nephritis	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	1	(0.0)
Nephritis	2	(0.4)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
Renal failure	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Tubulointerstitial nephritis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(0.1)
Optic Neuritis	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.0)**
Optic neuritis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Pancreatitis	**4**	**(0.8)**	**6**	**(1.1)**	**0**	**(0.0)**	**9**	**(0.3)**
Autoimmune pancreatitis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Pancreatitis	4	(0.8)	4	(0.7)	0	(0.0)	7	(0.3)
Pancreatitis acute	0	(0.0)	2	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.0)
Pneumonitis	**26**	**(4.9)**	**10**	**(1.9)**	**7**	**(4.5)**	**94**	**(3.4)**
Immune-mediated lung disease	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Interstitial lung disease	1	(0.2)	2	(0.4)	3	(1.9)	7	(0.3)
Pneumonitis	23	(4.3)	8	(1.5)	4	(2.6)	87	(3.1)
Sarcoidosis	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.6)**	**2**	**(0.1)**
Sarcoidosis	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	2	(0.1)
Severe Skin Reactions	**10**	**(1.9)**	**3**	**(0.6)**	**4**	**(2.6)**	**39**	**(1.4)**
Cutaneous vasculitis	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Dermatitis bullous	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Dermatitis exfoliative	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
Dermatitis exfoliative generalised	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	2	(0.1)
Erythema multiforme	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.1)
Exfoliative rash	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Lichen planus	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Pemphigoid	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Pemphigus	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Pruritus	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	4	(0.1)
Pruritus genital	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Rash	3	(0.6)	2	(0.4)	1	(0.6)	11	(0.4)
Rash erythematous	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Rash maculo-papular	3	(0.6)	0	(0.0)	1	(0.6)	7	(0.3)
Rash pruritic	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.0)
Rash pustular	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.6)	1	(0.0)
Stevens-Johnson syndrome	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Toxic skin eruption	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
Thyroiditis	**3**	**(0.6)**	**0**	**(0.0)**	**1**	**(0.6)**	**16**	**(0.6)**
Autoimmune thyroiditis	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	5	(0.2)
Thyroiditis	2	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.6)	11	(0.4)
Type 1 Diabetes Mellitus	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**0**	**(0.0)**	**6**	**(0.2)**
Diabetic ketoacidosis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Type 1 diabetes mellitus	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	5	(0.2)
Uveitis	**0**	**(0.0)**	**2**	**(0.4)**	**0**	**(0.0)**	**14**	**(0.5)**
Choroidal effusion	0	(0.0)	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)
Iridocyclitis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Iritis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)
Uveitis	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	10	(0.4)
Vasculitis	**2**	**(0.4)**	**1**	**(0.2)**	**2**	**(1.3)**	**2**	**(0.1)**
Vasculitis	2	(0.4)	1	(0.2)	2	(1.3)	2	(0.1)

Every participant is counted a single time for each applicable row and column.
A system organ class or specific adverse event appears on this report only if its incidence in one or more of the columns meets the incidence criterion in the report title, after rounding.
Non-serious adverse events up to 30 days of last dose and serious adverse events up to 90 days of last dose are included.
MedDRA preferred terms "Neoplasm Progression", "Malignant Neoplasm Progression" and "Disease Progression" not related to the drug are excluded.
[d]Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab or Chemotherapy in KN966. [e]Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab in KN001 Part B1, B2, B3, D, C, F1, F2, F3, KN002 (original phase), KN006, and KN010.
[f]Includes all participants who received at least one dose of Pembrolizumab + Chemotherapy (Gem/Cis) in KN361.
Database cutoff date for Melanoma (KN001-Melanoma: 18APR2014, KN002: 28FEB2015, KN006: 03MAR2015)
Database cutoff date for Lung (KN001-NSCLC: 23JAN2015, KN010: 30SEP2015)
Database cutoff date for Bladder (KN361: 29APR2020)
Database cutoff date for BTC (KN966: 15DEC2022)

6.5.7. 유효성 결과에 대한 요약 및 결론

- 국소 진행성 또는 전이성 담도암 환자를 대상으로 한 KEYNOTE-966 임상시험의 유효성 데이터 분석에 따르면 1 차 선택 환경에서의 펨브롤리주맙+화학요법 병용 투여는 화학요법 단독 투여에 비해 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있는 OS 의 개선을 제공한다.

6.5.8. 안전성 결과에 대한 요약 및 결론

- KEYNOTE-966 임상시험의 안전성 데이터 분석에 따르면 펨브롤리주맙+화학요법과 관련된 새로운 안전성 우려사항은 없었다.

6.6. 가교자료

- 해당사항 없음

6.7. 임상에 대한 심사자의견

- 용량 설정의 타당성
- 3상 임상시험에서 용법용량은 200 mg 3주 1회 주입임
- 신청된 용법용량 변경이 없으므로 기승인된 용법용량에 따라 200 mg 3주 1회, 400 mg 6주 1회 중 초기부터 선택하여 투여할 수 있음, 해당 질환 환자에서 안전성・유효성은 평가되지 않았으나 수평한 E-R 프로파일을 근거로 백금계 약물과 병용한 다양한 암종에서 기승인되어 있는 점을 참고하였을 때, 타당함
- 유효성의 타당성

- 1차 평가변수인 OS는 시험군에 유리한 유의성 있는 결과(HR 0.83)를 보였으며 12.7개월의 기간은 문헌보고된 다른 약물의 OS 기간 범위 내에 있음
- PFS, ORR 평가를 위한 방사선학적 분석이 담도암에서 어려울 수 있다는 문헌근거를 제시하였음. 최종 평가변수인 OS에서 분명한 유효성을 보였으며 PFS의 HR이 1을 넘지 않으므로 ORR에서 나타난 시험군과 대조군의 차이 없음이 유효성을 판단하는데 주요인자는 아니며 방사선학적 분석의 어려움에서 기인했을 가능성이 있다는 설명은 인정가능함

• 안전성의 타당성

- 흔하게 발생한 이상사례 중, 발진, 발열, 소양증은 시험군에서 대조군보다 많이 발생하였으나 이는 펨브롤리주맙의 알려진 이상사례임
- 3-5등급 이상사례는 호중구 수 감소, 빈혈, 혈소판 수 감소, WBC 수 감소 및 담관염이 빈발하였으나 담관염은 질병 관련, 혈구수 이상은 화학약물 병용에 의한 것으로 생각됨
- 사망은 폐렴, 패혈증이 원인이었으며 병용하는 화학약물에서 기 보고된 중증 이상사례에 해당함

7. 외국의 사용현황에 관한 자료

• 미국(FDA) : 2014.09.04. 최초허가(자궁경부암 2024.1.12., 담도암 2023.10.31.)
• 유럽(EMA) : 2015.07.17. 최초허가(자궁경부암 검토중, 담도암 2023.11.9.)

8. 국내유사제품과의 비교검토 및 당해 의약품등의 특성에 관한 자료

• 해당사항 없음 (기허가시 제출자료로 갈음)