생물학적동등성시험 심사결과 공개양식

2016년 5월 24일

담당자	사무관	연구관	과 장
백지영	강신국	정주연	박상애

① 신청자	유니메드제약(주)
② 접수번호	20140214245(2014.12.5.), 20150202303(2015.11.19.)
③ 제품명	암발산정 10/160밀리그램, 암발산정5/160밀리그램
④ 원료약품 분량	1정(315mg) 중 암로디핀베실산염(USP) 13.87mg(암로디핀으로서 10mg), 발사르탄(USP) 160mg 1정(315mg) 중 암로디핀베실산염(USP) 6.94mg(암로디핀으로서 5mg), 발사르탄(USP) 160mg
⑤ 효능·효과	암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압
⑥ 용법·용량	이 약의 권장용량은 1일 1회 1정으로, 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. 가능하면 매일 같은 시간(예 : 아침)에 복용할 것이 권장된다. 이 약을 투여하기 전에 개개의 성분(암로디핀 또는 발사르탄)으로 용량을 조절할 것이 권장되나, 다음과 같이 개개의 성분에 대한 단독요법으로 혈압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 바로 전환하는 것을 고려할 수 있다. ·5/80밀리그람 : 암로디핀 5밀리그람 또는 발사르탄 80밀리그람 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다. ·5/160밀리그람 : 암로디핀 5밀리그람 또는 발사르탄 160밀리그람 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다. ·10/160밀리그람 : 암로디핀 10밀리그람 또는 발사르탄 160밀리그람 단독요법 또는 5/160밀리그람으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다. 발사르탄과 암로디핀을 병용으로 복용하고 있는 환자인 경우, 복용의 편리함을 위하여 이 약(개개의 주성분 함량이 동일한 복합제)으로 전

	환할 수 있다. 신장애 환자 : 경증 및 중등도의 신장애 환자(creatinine clearance 10mL/min이상)인 경우 용량조절이 필요치 않으나, 중증의 신장애 환자(creatinine clearance 10mL/min 미만) 및 투석환자는 이 약을 투여하지 않는다. 중등도 신장애 환자인 경우, 칼륨 수치 및 크레아티닌에 대한 모니터링이 권장된다. 간장애 환자 : 경도 및 중등도 간장애 환자의 경우 발사르탄 1일 투여량은 80mg을 초과해서는 안 된다. 중증의 간장애, 담즙성 간경변, 담도폐쇄 · 담즙 분비정지 환자에게 이 약을 투여하지 않는다. 65세 이상의 고령자 : 용량 증량시 주의해야 한다. 소아 : 만 18세 미만의 소아환자에 대한 안전성 · 유효성이 확립되어 있지 않아 이 약의 투여가 권장되지 않는다.
⑦ 저장방법 및 사용(유효)기간	기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월
⑧ 관련조항	·의약품의 품목허가·신고·심사규정(식약처고시 제2015-105호, 2015.12.24.) ·의약품동등성시험기준 (식약처고시 제2014-188호, 2014.11.24.) ·생물학적동등성시험 관리기준(식약처고시 제2014-49호, 2014.2.12.)
⑩ 제출자료	생물학적동등성시험결과보고서 (대조약 : 한국노바티스(주) 엑스포지정10/160밀리그램) 비교용출시험결과보고서 (대조약 : 유니메드제약㈜, 암발산정10/160밀리그램)
⑪ 검토결과	적합

※ 참고사항 : 의약품 제조판매품목 허가

- 암로디핀베실산염 : 의약품동등성확보필요대상 [별표 1] 상용의약품 15번
- 발사르탄 : 의약품동등성확보필요대상 [별표 1] 상용의약품 266번

※ 붙임 1. 생물학적동등성시험 검토요약 보고서

<붙임 1> 생물학적동등성시험 검토요약 보고서

<제출자료 목록>

○ 관련규정

·의약품의 품목허가·신고·심사규정(식약처고시 제2016-58호, 2016.6.30.)
·의약품동등성시험기준 (식약처고시 제2014-188호, 2014.11.24.)
- 제17조제2항 및 제7조제2항
·생물학적동등성시험 관리기준(식약처고시 제2014-49호, 2014.2.12.)

○ 제출자료 목록

1. 생물학적동등성시험에 관한 자료
2. 비교용출시험에 관한 자료

<생물학적동등성시험 검토 요약>

○ 심사자의 종합적 검토의견

· 신청품목 유니메드제약㈜ 암발산정10/160밀리그램은 의약품의 품목허가·신고·심사규정 제25조제2항제3호나목에 해당하는 품목으로서 공고대조약인 한국노바티스㈜ 엑스포지정10/160밀리그램과 생물학적동등성을 입증하였고, 암발산정5/160밀리그램은 의약품동등성시험기준 제7조제2항에 따라 이미 생동성을 인정받은 동일 제조업자의 고함량 제제인 암발산정10/160밀리그램과의 비교용출시험자료를 제출하였으며, 검토결과 적합함

1. 생물학적동등성시험에 관한 자료

시험약 암발산정10/160밀리그램(유니메드제약㈜)과 대조약 엑스포지정10/160밀리그램(한국노바티스㈜)을 2x2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 48명의 혈중 암로디핀과 발사르탄을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC_t, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였음.

구분 (암로디핀)		비교평가항목		참고평가항목	
		$AUC_{0\text{-}144hr}$ (ng·hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T_{max}(hr)	$t_{1/2}$(hr)
대조약	엑스포지정10/160밀리그램 (한국노바티스㈜)	234.38±60.28	4.66±1.06	6.06±1.20	44.25±10.00
시험약	암발산정10/160밀리그램 (유니메드제약㈜)	235.49±62.99	4.71±1.08	6.79±1.58	43.18±10.43
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		*log 0.97~1.04*	*log 0.96~1.05*	-	-

(평균값±표준편차, n=48)

AUC_t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max} : 최고혈중농도
T_{max} : 최고혈중농도 도달시간
$t_{1/2}$: 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

구분 (발사르탄)		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC_{0-48hr} (ng·hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T_{max}(hr)	$t_{1/2}$(hr)
대조약	엑스포지정10/160밀리그램 (한국노바티스㈜)	25985.59±13643.31	3719.42±1782.89	3.26±1.31	5.61±1.93
시험약	암발산정10/160밀리그램 (유니메드제약㈜)	24754.49±12666.71	3692.20±1815.05	2.98±1.00	5.66±1.81
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		*log 0.88~1.04*	*log 0.86~1.12*	-	-

(평균값±표준편차, n=48)

AUC_t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max} : 최고혈중농도
T_{max} : 최고혈중농도 도달시간
$t_{1/2}$: 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

2. 비교용출시험에 관한 자료

1) 유효성분의 선형소실약물동태 입증자료

· 해당 없음

2) 비교용출시험자료

· 시험약 암발산정5/160밀리그램(유니메드제약㈜)은 대조약 암발산정10/160밀리그램(유니메드제약㈜)과의 의약품동등성시험기준 조건에 따른 비교용출시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출양상이 동등함. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였음.