

<별지3>

생물학적동등성시험 심사결과 공개양식

2015년 3월 9일

담당자	사무관	과 장
이윳모	강신국	서경원

① 신청자	(주)종근당
② 접수번호	20100082331 (2010.8.2), 20150022563 (2015.2.2.)
③ 제품명	코스비토캡슐 200, 100 밀리그램
④ 원료약품 분량	1캡슐(334.0 mg) 중 세레콕시브(별규) 200.0 mg 1캡슐(135 mg) 중 세레콕시브(별규) 100.0 mg
⑤ 효능·효과	(캡슐제) 1. 골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화 2. 류마티스관절염의 증상이나 징후의 완화 3. 강직척추염의 증상 및 징후의 완화 4. 성인의 급성 통증 완화(수술후, 발치후 진통) 5. 원발월경통
⑥ 용법·용량	(캡슐제) 이 약의 최소 권장량은 환자에 따라 조절되어야 하며, 식사와 관계없이 투여할 수 있다. ○ 성인 : 1. 골관절염(퇴행관절염) : 세레콕시브로서 200 mg을 1일 1회, 또는 1회 100 mg씩 1일 2회로 나누어 복용한다. 2. 류마티스관절염 : 세레콕시브로서 1회 100 mg 또는 200 mg을 1일 2회 복용한다. 3. 강직척추염(AS) : 세레콕시브로서 200 mg을 1일 1회, 또는 1회 100 mg씩 1일 2회로 나누어 투여한다. 6 주 후에 효과가 관찰되지 않으면, 1일 400 mg 까지 투여할 수도 있다. 1일 400 mg 투여한지 6 주 후에 효과가 관찰되지 않으면, 다른 치료 방법을 고려해야 한다. 4. 급성 통증 및 원발월경통 : 초기 권장 투여량은 세레콕시브로서

	<p>400 mg이며 필요시 투여 첫날에 200 mg을 추가로 투여한다. 투여 둘째 날부터는 필요시 권장량으로서 1회 200 mg씩 1일 2회 투여한다.</p> <p>○ 간장애 환자 : 중등도의 간장애(Child-Pugh Class II) 환자에 대해서는 용량을 1일 권장량의 약 50%로 감소시켜야 한다.</p>
⑦ 저장방법 및 사용(유효)기간	<p>밀폐용기, 실온(15~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월</p>
⑧ 관련조항	<p>· 의약품의 품목허가·신고·심사규정(식약처고시 제2014-178호, 2014.10.31)</p> <p>· 의약품동등성시험기준 (식약처고시 제2014-188호, 2014.11.24)</p> <p>· 생물학적동등성시험 관리기준(식약처고시 제2014-49호, 2014.2.12)</p>
⑩ 제출자료	<p>생물학적동등성시험결과보고서 (대조약 : (주) 한국화이자 세레브렉스캡슐 200밀리그램)</p> <p>비교용출시험결과보고서 (대조약 : (주) 종근당 코스비토캡슐 200밀리그램)</p>
⑪ 검토결과	<p>적합</p>
<p>※ 참고사항 : 의약품 제조판매품목 허가 세레콕시브: 의약품동등성 확보 필요대상 의약품[별표1]상용의약품 50번</p> <p>※ 붙임 1. 생물학적동등성시험 검토요약 보고서</p>	

<붙임 1> 생물학적동등성시험 검토요약 보고서

<제출자료 목록>

○ 관련규정

- 의약품의 품목허가·신고·심사규정(식약처고시 제2014-178호, 2014.10.31.)
- 의약품동등성시험기준 (식약처고시 제2014-188호, 2014.11.24.)
- 생물학적동등성시험 관리기준(식약처고시 제2014-49호, 2014.2.12.)

○ 제출자료 목록

1. 생물학적동등성시험에 관한 자료 - 생물학적동등성시험 결과보고서
2. 비교용출시험에 관한 자료 - 비교용출시험 결과보고서

<생물학적동등성시험 검토 요약>

○ 심사자의 종합적 검토의견

- 신청품목 (주) 종근당 콕스비토캡슐 200 밀리그램은 의약품의 품목허가·신고·심사규정 제25조제2항제3호나목에 해당하는 품목으로서 공고대조약인 (주)한국화이자 세레브렉스캡슐 200밀리그램(세레코시브)과 생물학적동등성을 입증하였으며, 콕스비토캡슐 100 밀리그램은 의약품동등성시험기준 제7조제2항에 따라 이미 생동성을 인정받은 동일 제조업자의 고함량 제제인 콕스비토캡슐 200 밀리그램과의 비교용출시험자료를 제출하였으며, 검토결과 적합함.

1. 생물학적동등성시험에 관한 자료

시험약 콕스비토캡슐 200 밀리그램(주)종근당)과 대조약 세레브렉스캡슐 200 밀리그램(주)한국화이자)을 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 39명의 혈중 세레코시브를 측정 한 결과, 비교평가항목치(AUC_t, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였음.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	(주) 한국화이자 세레브렉스캡슐 200밀리그램	3980±1500	564±257	2.97±1.54	10.98±10.17
시험약	(주) 종근당 콕스비토캡슐 200 밀리그램	3880±1400	535±290	2.55±1.06	10.96±6.24
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.92 ~ 1.03	log 0.81 ~ 1.05	-	-

(평균값±표준편차, n=39)

AUC_t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max} : 최고혈중농도

T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

$t_{1/2}$: 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

2. 비교용출시험에 관한 자료

1) 비교용출시험자료

- 시험약 콕스비토캡슐 100 mg(쥬중근당)은 대조약 콕스비토캡슐 200 mg(쥬중근당)과의 의약품 동등성시험기준에 따른 비교용출시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출양상이 동등함. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였음.