



8 806452 028904

행맥정80밀리그램

(은행엽엑스)

일반의약품

분류번호 219

원료약품 및 그 분량 1정 중

- 유효성분: 은행엽엑스(생규) 80.0mg
- 첨가제(타르색소): 황색203호, 청색1호, 청색2호
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 폴로이드산이산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨, 스테아르산마그네슘, 오파드라이트그린I85F41079

성상

녹색의 원형 필름코팅정

효능·효과

1. 주요효능 효과

- 1) 말초동맥순환장애(간헐성파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

용법·용량

- 성인

- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림): 은행엽엑스로서 1회 40밀리그램($\frac{1}{2}$ 정) 1일 3회 또는 1회 80밀리그램(1정) 1일 2회 경구투여합니다(먹습니다).
 - 2) 기질성 뇌기능장애: 은행엽엑스로서 1회 40-80밀리그램($\frac{1}{2}$ -1정) 1일 3회 또는 1회 120밀리그램(1 $\frac{1}{2}$ 정) 1일 2회 경구투여합니다(먹습니다).
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자.
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이상반응

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로서 큰 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
 - 어지러움
 - 가려움증

3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.

4. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(투광을 꼭 닫아)하여 보관합니다.
- 2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 3) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고 원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

저장방법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위

30정, 300정

취급상의 주의사항

- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부서 개경일자(2018년 07월 27일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일 : 2018. 07. 27
1807-01

A PROGEN

에 이 프 로 제 약 (주)
경기도 화성시 양감면 두머리길 16

판매자 : (주)신진약품 / 경상남도 진주시 진주성로178번길 12