

판토스탁[®] 정 20mg

판토프라졸나트륨세스키히드레이트 (판토프라졸 20mg)

판토스탁 정 20mg의 주성분인 판토프라졸은 PPI 제제로서, 프로톤펌프 시스템인기에 직접적으로 결합하여 위산분비를 억제하므로 효과가 우수할 뿐만 아니라, 효과가 안정적으로 유지됩니다. 경증의 역류성식도질환 치료 및 역류성식도염 재발방지, NSAID에 의한 위십이지장궤양의 예방을 위한 소화성궤양 용제로 약물상호작용이 없어 안전하게 사용할 수 있는 약물입니다.

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

판토프라졸나트륨세스키히드레이트(USP)..... 22.55mg
(판토프라졸로서 20mg)
· 첨가제(동물유래) : 유당수화물

■ 성상 : 황색의 장용성 제제를 한 타원형 정제

■ 효능·효과

- 경증의 위식도역류 질환 및 관련 증상(속쓰림, 산역류, 연하통)치료
- 역류성식도염의 재발방지를 위한 장기유지요법
- 지속적으로 비스테로이드소염진통제를 투여해야 하는 환자에서 비스테로이드소염진통제에 의한 위십이지장궤양의 예방

■ 용법·용량

- 경증의 역류성 식도질환 및 관련증상 치료 : 판토프라졸로서 1일 1회 20mg을 아침 식전 경구 투여합니다. 증상경감은 일반적으로 2~4주내에 이루어지며, 통상 4주 복용으로 치유될 수 있습니다. 만일 치유되지 않는 경우 추가 4주 복용으로 치유될 수 있습니다.
- 역류성 식도염의 재발방지를 위한 장기유지요법 : 판토프라졸로서 1일 1회 20mg을 아침식전 투여합니다. 만일 재발한 경우 1일 판토프라졸로서 40mg으로 증량하였다가 치유 후 다시 1일 20mg으로 감량합니다.
- 지속적으로 비스테로이드소염진통제를 투여해야 하는 환자에서 비스테로이드소염진통제에 의한 위십이지장궤양의 예방 : 판토프라졸로서 1일 1회 20mg을 투여합니다.

○고령자나 신기능장애가 있는 환자에 있어서 투여량 조절은 필요하지 않습니다.

○간장애 환자

중증의 간장애 환자에게는 이 약으로서 1일 1회 20mg을 초과하지 않습니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤즈이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- 아타자나버를 투여중인 환자('4. 상호작용' 참조)
- 임신 1기인 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 수유부
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이상반응

- 기관계별 이상반응

발현빈도 기관계	자주 1% ~ 10% 미만	때때로 0.1% ~ 1% 미만	드물게 0.01% ~ 0.1% 미만	매우 드물게 0.01% 미만 또는 단독보고
위장관계	상복부통, 변비, 고창(복부 팽만감), 설사	구역/구토, 트림, 입안건조		
전신계		피로, 무력증, 권태	부종(투약중단시 사라짐), 체온상승(투약중단시 사라짐)	발열
간담관계		간효소치(아미노전달효소, γ-GTP) 상승	빌리루빈 상승, 간부전을 동반하거나 동반하지 않는 황달을 유발시키는 심각한 간세포성 손상	
면역계			아나필락시스 쇼크를 포함하는 아나필락시스 반응	
근골격계, 결합조직계			관절통, 근육통(투약중단시 사라짐)	횡문근융해 뼈골절
신경계	두통	어지럼, 시력장애(시야 흐림)	미각이상	
정신계	불면	수면장애	우울증(투약중단시 사라짐), 환각, 착란, 방향감각장애	
신장 및 요로계			간질신장염	
피부 및 피하조직계		가려움증이나 피부발적과 같은 알레르기 반응	두드러기, 혈관부종 피부점막 안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 다형성홍반, 독성 표피괴사(리엘증후군)과 같은 심각한 피부 증상, 광감수성	
내분비계			고혈당증	
혈액 및 임파계			무과립구증	백혈구감소증, 혈소판감소증, 범혈구감소증
생식기계			여성형유방	
대사 및 영양계			고지혈증과 지질증가(트리글리세라이드, 콜레스테롤), 체중 변화	저나트륨혈증, 저마그네슘혈증, CK (creatinine kinase) 상승

- 이 약과의 인과관계에 상관없이 1%이상에서 추가로 발생한 이상반응은 다음과 같습니다 :
불안, 관절통, 무기력증, 요통, 기관지염, 흉통, 기침증가, 소화불량, 호흡곤란, 독감증상(flu syndrome), 위장염, 위장장애, 고지혈증, 긴장과도, 감염, 편두통, 경부통, 통증, 인두염, 직장장애, 비염, AST 상승, 부비동염, 상기도감염, 빈뇨, 요로감염

- 이 약과의 인과관계는 명확하지 않으나, 이 약 투여 후 1% 미만에서 추가로 발생한 이상반응은 다음과 같습니다.

- 전신계 : 중기, 알레르기반응, 오한, 피냉, 안면부종, 일반적인 부종, 열감, 탈장, 임상실험 실험사이상, 권태감, 모닐리아증, 종양, 불특이성약물반응
 - 심혈관계 : 심전도이상, 협심증, 부정맥, 심방세동, 관상동맥질환, 흉통, 울혈성심부전, 출혈, 고혈압, 저혈압, 심근경색, 심근허혈, 심계항진, 망막혈관질환, 실신, 빈맥, 정맥염, 혈전증, 혈관확장
 - 소화기계 : 식욕감퇴, 아프타성 구내염, 대장염, 십이지장염, 연하장애, 장염, 식도출혈, 식도염, 위십이지장 종양, 위십이지장 출혈, 위십이지장 모닐리아증, 치은염, 구취, 토혈, 식욕증가, 흑색변, 구내궤양, 구내 궤양, 구내 모닐리아증, 치주농양, 치주염, 직장출혈, 위궤양, 배변이상, 허의 변색, 궤양성 대장염
 - 내분비계 : 당뇨, 갑상선증
 - 간 및 담도계 : 담낭통, 고빌리루빈증, 담낭염, 담석증, 황달, 간염, ALP 상승
 - 혈액계 : 빈혈, 반상출혈, 호산구증가증, 철결핍성빈혈, 백혈구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증
 - 대사 및 영양계 : 탈수, 통풍, 갈증, 체중증가, 체중감소
 - 근골격계 : 관절염, 골질환, 관절질환, 다리경련, 활액낭염, 건초염
 - 신경계 : Abnormal dream, 혼돈, 경련, 입마름, 구어장애, 환각, 활동과다, 성욕감퇴, 초조, 신경통, 신경염, 신경장애, 이상감각, 반사작용감소, 수면장애, 졸림, 이상지각, 진전
 - 호흡기계 : 천식, 코피, 딸꾹질, 후두염, 호흡장애, 폐렴, 목소리변형
 - 피부/부속기계 : 여드름, 탈모증, 접촉성피부염, 습진, 균성피부염, 출혈, 단순포진, 대상포진, 태선모양피부염, 반구진성 발진, 피부질환, 피부궤양, 발한
 - 특수감각 : 약시, 백내장, 난청, 복시증, 이통, 마비, 녹내장, 외이도염, 미각이상, 이명
 - 비뇨기계 : 알부민뇨, 귀두염, 유방통, 방광염, 월경불순, 배뇨장애, 부고환염, 혈뇨, 발기부전, 신장결석, 신장통, 야뇨증, 전립선장애, 신우신장염, 음낭부종, 요도통, 요도질환, 비뇨이상, 질염
- 시판 후 조사에서 나타난 이상반응
 - 대사 및 영양계
빈도 불명 : 저마그네슘혈증
 - 감염
빈도 불명 : 클로스트리듐 디피실레스 설사

3. 일반적 주의

- 이 약으로 인해 약성증양의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 약성 증양이 의심되는 경도 증상(의도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 토혈, 흑색변

- 등)이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 약성이 아님을 확인하고 투여해야 합니다.
- 2) 이 약으로 장기간 치료할 경우(특히 1년 이상) 환자는 정기적으로 검사를 받아야 합니다.
 - 3) 중증의 간장애환자에 대하여 투약하는 경우 1일 투여량은 20mg을 초과하지 않습니다. 또한 장기투여시 투약기간중 간효소치를 정기적으로 관찰하고 만일, 수치가 높아진 경우에는 투약을 중지합니다.
 - 4) 이 약은 신경성 위질환 같은 경미한 위통증 및 장통증에는 사용하지 않습니다.
 - 5) 이 약의 장기투여로 인해 저염산증 또는 무위산증에 의해 비타민 B12(cyanocobalamin) 흡수 장애가 나타날 가능성이 있습니다.
 - 6) 지속적으로 비스테로이드소염진통제 치료를 받아야 하는 환자와 위장관 복합장애가 발생할 위험성이 증가하는 경우에는 사용을 제한하여야 합니다. 위험성 증가는 65세 이상 연령이나 위궤양, 십이지장궤양 또는 위장관 출혈 등 개인적 위험성에 따라 평가합니다.
 - 7) 일부 해외 역학연구에서 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료가 고관절, 손목 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었습니다. 골절의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었습니다.
 - 8) 3개월 이상 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에게서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났습니다. 대부분의 환자들에게 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요합니다. 장기간 치료가 필요하거나 디곡신 또는 저마그네슘혈증을 유발하는 약물(예: 이노제)을 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주기적 마그네슘 수치 모니터링이 필요합니다. 중대한 이상반응은 강직, 부정맥, 발작을 포함합니다.
 - 9) 프로톤펌프억제제로 인해 위내 산도가 감소하면 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 증가합니다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듐 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할 수 있습니다. 이것은 클로스트리듐 디피실레균성 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었습니다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 합니다.
 - 10) 적절한 치료 후에도 증상이 지속되는 경우에는 추가적인 조사가 고려되어야 합니다.
 - 11) 어지럼이나 시력장애같은 이상반응이 나타날 수 있으며 그러한 경우 반응하는 능력이 떨어질 수 있습니다.
 - 12) 메토크세이트 : 프로톤펌프 억제제와 메토크세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크세이트의 '사용상의 주의사항' 참조)를 병용하는 경우 메토크세이트 그리고/또는 그 대사체의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토크세이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었습니다. 고용량의 메토크세이트를 사용하는 경우, 프로톤펌프 억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있습니다.('4. 상호작용' 참조)
 - 13) 치료시 경과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 합니다.

4. 상호작용

- 1) 이 약물은 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(예: 케토코나졸, 암피실린에스테르, 철분 제제)의 흡수를 감소 또는 증가시킬 수 있습니다.
- 2) 이 약물은 CYP-450 효소계를 통해 간에서 대사되므로, 간에서 CYP-450 효소계를 거쳐 대사하는 다른 약물과의 상호작용에 주의하여야 합니다.
그러나 다음과 같은 약물과의 유효할 만한 임상적 상호작용은 없었습니다. : 디아제팜, 와르파린, 테오필린, 페니토인, 디곡신, 안티피린, 니페디핀, 페노프로쿠몬, 디클로페낙, 카르바마제핀, 카페인, 에탄올, 글리벤클라미드, 메토프롤롤, 경구용피임제, 제산제, 나프록센, 피록시캄
- 3) 임상적 약동학 자료에서 펜프로쿠오몬이나 와르파린의 병용투여시의 상호작용은 없었으나, 시판 후 조사 기간 동안 INR(International Normalized Ratio)수치에 변화를 보인 몇몇의 사례가 있었습니다. 프로트롬빈시간/INR의 증가는 비정상적 출혈, 심지어 사망까지 초래할 수 있습니다. 그러므로 쿠마린계 항응고제를 복용하고 있는 환자에서 판토프라졸의 사용을 개시 혹은 종료시점 이후, 혹은 비정기적으로 프로트롬빈시간/INR을 모니터링 할 것을 권장합니다.
- 4) 건강한 지원자에게 오메프라졸(40mg 1일 1회 투여)과 아타자나버 300mg/리토나비어 100mg을 병용투여 했을 때 아타자나버의 노출이 감소했으며(AUC, Cmax, Cmin이 약 75% 감소), 혹은 란소프라졸(60mg, 일회용량)과 아타자나버 400mg을 병용투여 했을 때 아타자나버의 생체이용률이 상당량 감소했습니다. 아타자나버의 흡수는 pH에 의하여 변합니다. 그러므로 판토프라졸을 포함하는 프로톤 펌프 저해제들은 아타자나비어 및 넬피나버와 병용투여할 수 없습니다. PPI와 병용투여시 이 두 약물(아타나자비어, 넬피나비어)의 혈장농도가 감소하며 그 결과로 치료효과와 손실과 약물내성이 나타날 수 있습니다.
- 5) 건강한 지원자에게 이 약과 클로피도그렐을 병용투여시 클로피도그렐활성대사체나 클로피도그렐에 의해 유도된 혈소판억제작용에 대한 노출에 대해 임상적으로 중요한 영향은 없습니다.
- 6) 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor)를 투여중인 환자에서 tetrahydrocannabinol(THC)에 대한 소변선별검사서서 위양성판정이 있었습니다. 양성결과를 증명하기 위한 확실한 대체방법이 고려되어야 할 것입니다.
- 7) 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토크세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크세이트의 '사용상의 주의사항' 참조)와 프로톤펌프 억제제를 병용하는 경우 메토크세이트 그리고/또는 그 대사체인 히드록시메토크세이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토크세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었습니다. 그러나 고용량의 메토크세이트와 프로톤펌프억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았었습니다.('3. 일반적 주의' 참조).

5. 임부 및 수유부의 투여

- 1) 이 약은 랫드 암컷을 이용한 수태능 및 일반생식독성 시험의 고용량(450mg/kg/day)에서 분만 지연 및 출생자의 사망률 증가와 성장지연이 나타났으며 주산, 수유기 시험의 10 mg/kg/day이상 투여군에서 출생자의 출생후 체중감소가 나타났으므로 임신초기 3개월간은 투여하지 않으며 그 외 기간에도 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 2) 동물 생식연구에서는 5mg/kg이상의 용량에서 약한 태아독성의 증상이 관찰되었습니다.
- 3) 이 약은 동물실험에서 유즙으로 분비되었으며 사람에게서 모유로 이행된다고 보고되었습니다. 따라서 수유중인 여성에게 투여하지 않습니다.

6. 소아에 대한 투여

12세 이하의 소아에 투여경험이 제한적이므로 사용이 권장되지 않습니다.

7. 과량투여시의 처치

인체를 대상으로 한 과량복용시의 증상에 대하여는 알려진 바가 없으나 판토프라졸 240mg을 2분간 정맥주사 하여도 이상반응은 없었습니다. 과량투여로 인하여 중독증상이 나타나는 경우에는 대증요법을 실시합니다.

8. 적응상의 주의

- 1) 이 약을 복용할 때는 씹거나 부수지 말고 그대로 복용하십시오.
- 2) 이 약은 수년간 복용하는 경우에 대한 안전성이 완전히 확립되어 있지 않으므로 역류성 식도염의 재발방지를 위한 장기용법의 경우 1년 이상 투여하려면 이익/위험비를 신중히 고려하여야 합니다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

10. 기타

실험동물 랫드를 이용한 발암성시험(2년)에서 이 약에 기인한 위종양, 간세포선종 및 암종(50mg/kg/day 이상), 갑상선여포성 세포종양(200mg/kg/day)병변이 관찰되었습니다.

■ **저장방법** : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **사용(유효)기간** : 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** : 28정

® = 등록상표

※ 본 제품은 GMP규정에 따라 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한의 경과, 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

■ **제품문의처** : 고객센터전화(080-405-1238)

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 이 첨부문서 개정일자 (2014년 9월 26일) 이후 변경된 내용은 www.whanin.com이나 고객센터전화(080-405-1238)에서 확인하실 수 있습니다.

문안최종개정일자 : 2014. 09. 26
3018121-8