


진해거담제 뮤코다인캡슐 200mg

(아세틸시스테인)

- **성분·함량** : 1캡슐 중
아세틸시스테인(KP) 200mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호
- **성상** : 흰색의 내용물이 든 상,하부 청색의 경질캡슐제
- **효능·효과**
 1. 주효능 효과
 - 1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성성염증
 - 2) 인 · 후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염
- **용법·용량**
아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.
 1. 급성질환
성인 : 1회 200mg 1일 3회
소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회
 2. 만성질환
성인 : 1회 200mg 1일 2회
소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회
 3. 낭성성염증
소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
- **사용상의 주의사항**
 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 위 · 십이지장궤양 환자
 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)
 3. 부작용
 - 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.
 - 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 골해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다. : 호흡곤란
 4. 상호작용
경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다 (적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).
 5. 임부에 대한 투여
임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
 6. 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
 7. 적용상의 주의사항
이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.
- **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- **사용기간** : 제조일로부터 36개월
- **포장단위** : 자사포장단위
- **제조판매자** : (주)테라젠이텍스 (경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58(초지동))



- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의 깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.com에서 확인할 수 있습니다.