



NOFEN STRONG Cataplasma Ketoprofen

노펜® 스트롱

관절염

외상(상체)후통증

그 밖의 통

카타플라스마 (케토프로펜 41.14mg)

분류번호	264
진통·진양·수렴·소염제	

【원료약품의 분량】 1매(12×8cm², 6.9g) 중

케토프로펜(KP)..... 41.14mg

【성상】 이 약은 무색 또는 담황색의 점착성의 고체를 부직포 위에 도포(바르다)하고 부직점착테이프를 고정시킨 후 박리지를 덮은 카타플라스마제입니다.

【용법·용량】 약면의 박리지를 떼어낸 후 환부(질화부위)에 1일 2회 부착하십시오.

【효능·효과】 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염), 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건(힘줄염)·건초염(힘줄윤활막염), 건주위염, 상완골상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창(부기)·동통(통증)

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

- ① 이 약 및 이 약 성분에 고민중 및 광과민증의 병력이 있는 환자
- ② 아스피린 천식/바스타로이드성 소염항염증제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자 천식발작을 일으킬 수 있습니다)
- ③ 다음의 약물에 고민중의 병력이 있는 환자 : 티아로프렌산, 페도피브라이트, 베타브라이트, 시프로로비테트, 옥시벤존, 디프로판과 교차과민증의 유발할 수 있습니다)
- ④ 임신기 6개월 이상인 일부 : 임신기간의 젖먹이 이 약을 경구 투여할 때, 복통(통증) 실험에서 태자의 동맥혈관수축이 보고되었습니다. 임신후기에 투여경구, 주사, 직장공주사, 직장주입시 지속 태아손상, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있습니다.
- ⑤ 15세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- ① 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)
- ② 의사의 치료를 받고 있는 환자
- ③ 임부 또는 수유부 (안전성이 확립되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용은 피하십시오.)

3. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오

- ① 드물게 색, 아나필락시안 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사증상)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오.
- ② 천식발작을 유발할 수 있으므로 건선 수포형(거품소), 천형(습을 뺀백거름), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타납니다.
- ③ 피부 : 때때로 발적증현되어 붉어짐, 발진, 가려움, 수포(물집), 잔물집, 지루를 자극 및 종창(부기) 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있습니다. 또한 직사광선(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부발진이 전신(온몸)으로 확대될 수 있습니다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지하십시오.

④ 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- ① 이 약을 사용 중지하거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 옥외활동을 피하고, 일사
외출할 때에는 이 약의 도포(바르다)부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로
차지 자외선에 노출되지 않도록 하십시오. 햇빛이 많은 옷은 자외선을 투과시킬 수
있으므로 유색 옷을 입으십시오.(자외선에 의해, 사용 중 또는 사용 후 피부가 붉어지거나 나타
났다는 보고가 있습니다.)
- ② 이 약에 의한 치료는 원인이 아닌 대증요법(증상병별 치료하는 방법)입니다.
- ③ 피부감염증에 드러나지 않게 잘 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는
적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께복용, 사용)하고 충분히 관찰하여 부작용 발현
드러냄, 드러내보임에 유의하십시오.
- ④ 만성질환(또는 만성질환(골관절염) 등에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려
하십시오.) 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의하십시오.
- ⑤ 눈 및 점막에는 사용하지 마십시오.
- ⑥ 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운
통증을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의하십시오.
- ⑦ 무릎, 배선 등에는 사용하지 마십시오.
- ⑧ 미발부대변을 사용하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항 ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오

【저장방법】 기밀용기 식온보관(1~30℃) 【포장단위】 자사·포장단위 OTHER

※본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주시요 ■ 연락처 고객보호팀 1588-2675

※ 첨부문서 작성년월일 : 2012. 5. 14 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

【제 조 자】  tds® 티디에스팜 【제조의리자】
초보 음성교 음성은 하북로 69번길 12-13

【제조의뢰자】 JW 중외제약

제이더블유중외제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진길 56

제조번호 :

사용기한 :

