

※ 이 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

잇몸 질환 치료제

의반약반일

덴트큐 캡슐

DENTQ capsule

■ 원료약품 및 그 분량 : 1캡슐(391mg) 중

리소짐염산염(KP)	30mg
카르바조크롬(KP)	2mg
직타용아스코르브산97%(별규)	154.64mg
(아스코르브산으로서 150mg)	
토코페롤아세데이트 2배산(BP)	10mg
(비타민E로서 5U)	
첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호	
첨가제(동물유래) : 리소짐염산염(닭 : 난백)	

■ 성 상

연한 분홍색 가루가 든 상하부 청색의 경질캡슐제

■ 효능·효과

치은염(잇몸염)·치조(이들)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부기·출혈·통증)의 완화

■ 용법·용량

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부접막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은반점), 가려움, 안충혈, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상양(불을 덴 듯한 모양)의 수종등의 중증(심한 증상)의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증(심한 증상)의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오용(잘못사용)을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **사용기간** : 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** : 10캡슐, 240캡슐

■ **소비자상담** : 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성일(2015년 5월 14일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색'란을 참조하세요.

제조사 : **알리코제약주** 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21

제조의뢰자·판매원 : **코오롱제약주** 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

최초 작성연월일 : 20140114

최종 개정연월일 : 20150514

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45