

혈액순환개선제

강코탄

연질캡슐 120mg

은행엽엑스 120mg

【성분·함량】 1캡슐중

은행엽엑스(KPC).....120.0mg

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호

【성 상】 황갈색의 내용물이 든 녹색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

이명, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

성인 : 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

고지단백혈증, 당뇨병성 고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 부작용

드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 마십시오.
- 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에는 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생이 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용 경험이 적습니다.

6. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 마십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사단위

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【소비자상담 전화번호】 080-700-0052

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자(2009년 11월) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.ktda.go.kr/kida2>)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자 : 2009. 11

제조회사이자

한국프라임제약

전북 완주군 봉동읍 둔산리 865-1,2

제조자



경기도 화성시 향남읍 상산리 906-6

알앤피코리아(주)

최대응제의 계열사

판매원



유희메디칼

서울시 영등포구 도림동 32-11