

고함량 간세포 보호제

리버폴 350

(밀크시슬엑스)

연질
캡슐

【성분 · 함량】 (1캡슐 중)

밀크시슬엑스(KPC)	350mg
(실리마린으로서)	196mg
첨가제(타르색소) : 청색 1호, 적색 40호	

【성 상】 황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

【효능 · 효과】 다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

【용법 · 용량】 1일 1회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
 - 이 약의 과민증 환자
 - 12세 이하의 소아
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사 와 상의하십시오.
 - 임신, 수유부
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 드물게 위통 또는 설사
 - 알레르기 반응
- 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지키십시오.
 - 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제료 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전 하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 하십시오.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사 용 기 간】 외부포장에 표기

【포 장 단 위】 자사포장단위

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질,변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

【제 품 문 의】 02)2211-6700, www.sinilpharm.com

제조외주자 :  신일제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272번지
공장 : 충청북도 충주시 앙성면 복성골길 28번지

제조사 : (주)알피코프
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

코스닥상장
 신일제약(주)
충청북도 충주시 앙성면 복성골길 28번지

