

※ 의약품을 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상・환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

모니맥정

MORNIMC Tab. 350mg

정 (모니플루메이트)

전문의약품

분류번호:114

【원료약품의 보형】 1정(450mg)중
모니플루메이트(불규)..... 350mg
【성 성】 크람색의 장병형 정제
【효능・효과】 다음 질환 및 증상의 진통,소염
－ 호흡기질환(후두염,기관염,기관지염)
－ 이비인후과질환(부비동염,이염,편도염,인두염)
－ 골관절질환

【용법・용량】
성 인: 초회용량으로 모니플루메이트로서 1일 2회, 1회 350밀리그램을 복용한다. 환자에 따라 최대 1일 2회, 1회 700밀리그램까지 복용할 수 있다. 본 제는 낮은 용량에서 시작하여 유효용량까지 증량하는 것이 바람직하다. 연령 및 증상에 따라 적절한 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
1) 메일 세전 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
2) 심혈관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 중대한 심혈관계 질환 현상, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험 인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수도 있다. 의사와 환자는 이러한 심혈관계 증상의 발현에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 이는 심혈관계 질환의 발현에 있는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 환자는 중대한 심혈관계 독성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발견되는 경우 취할 조치에 대하여 사전에 알아야 한다.
3) 위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 과거병력이나 경고 증상 없이 어느 때나 발생할 수 있다. 고령자는 이러한 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있으며, 더 빠른 결과를 나타낼 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 궤양 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링 하여야 하며, 증상의 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 한다. 비스테로이드성 소염진통제는 중증의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투여 중단하는 것을 치료법이 될 수 있다. 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.
4) 다른 비스테로이드성 소염제처럼 이 약의 약리학적 특성상 염증의 다른 증상과 징후를 불연성화하여 통증성 및 비감염성 조건하에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 수 있다.
5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 유당분해효소(lactase) 결핍, 갈락토오스 혈증 또는 갈루코스/갈락토오스 흡수장애증후군 환자는 주의를 요한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 소화성궤양 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 위장관 출혈이 있는 환자 및 그 병력이 있는 환자
- 3) 심한 혈액 이상 환자
- 4) 심한 간장애 환자
- 5) 심한 신장애 환자
- 6) 심한 심기능부전 환자
- 7) 심한 고혈압 환자
- 8) 이 약의 구성성분에 과민증이 있는 환자
- 9) 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 대하여 천식, 두드러기 또는 알레르기 반응 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여후 치명적인 중증의 아나필락시양 반응이 발생할 수 있다.)
- 10) 골관절염 후외로슬(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료
- 11) 임부 및 수유부
- 12) 어린이 및 유·소아(어린이 및 유·소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.)
- 13) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(galactose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하여야 안 된다.

3. 다음 환자에 신중히 투여할 것.

- 1) 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 혈색소강이 있는 환자(혈소판기능이상)이 생길 수 있다.)
- 3) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 4) 신장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 5) 고혈압의 병력이 있는 환자
- 6) 신기능이 저하되기 쉬운 환자 (심기능에 손상, 이뇨제 투여 중인 환자, 복수를 수반하는 간경변 환자, 대수술, 고령자 등에서 유호 순환혈류량을 저하시켜 신혈류량이 저하되기 쉬우므로 신부전을 일으킬 수 있다)
- 7) 고혈압환자 (프로스타글란딘 합성저해작용에 의해 Na⁺ 수분자류 균형이 있으므로 혈압을 상승시킬 수 있다)
- 8) 심기능 부전 환자(프로스타글란딘 합성저해작용에 의해 Na⁺ 수분자류 균형이 있으므로 심기능을 악화시킬 수 있다)
- 9) SLE(전신성 홍반성 루푸스)환자 및 혼합 결합조직 질환(MCTD) 환자(SLE증상(신장해 등)을 악화시킬 수 있다)
- 10) 기관지 천식 환자(기관지천식 환자증에는 아스피린천식 환자도 포함될 수 있으므로 이러한 환자에는 심한 천식발작을 일으킬 수 있다.)

- 11) 궤양성 대장염 환자(증상이 악화되었다는 보고가 있다)
- 12) 크론병 환자 (증상이 악화되었다는 보고가 있다)
- 13) 석도 통과장애 환자 (석도에 저류되어 석도궤양을 일으킬 수 있다)
- 14) 고령자

4. 이상반응
1) 속: 드물게 속증상 (홍내고인, 냉한, 호흡곤란, 사지마비감, 혈압저하, 부종, 발진, 가려움증 등)이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.
2) 소화기계: 오심, 구토, 위통, 가슴앓이, 설사등이 나타날 수 있으며, 이러한 증상은 약물 용량에 의존적이며, 대부분 과용량 투여시 발생한다. 장기간투여시 출혈이나 천공을 포함한 소화성 궤양, 위장출혈(토혈, 혈변, 출혈, 설사), 석도궤양이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지한다. 또한 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 위통, 소화불량, 흑변, 아프타성 구내염, 구강건조, 입맛저하, 혈액성 설사, 식욕변화, 체중감, 대장염, 설사 복통증, 복부팽만감, 위부불쾌감, 매우 드물게 아프타성 위염, 설염, 석도병변, 황갈색의 소장염적, 구내염, 구각염, 구갈, 변비, 소화・대장의 궤양이 있는 환자, 허부장관장애(비특이성 출혈성 대장염, 크론병 또는 궤양성 대장염의 악화)등이 나타날 수 있다.
3) 혈액: 드물게 과립구 감소, 해모글로빈 감소, 백혈구 감소, 혈소판 감소, 빈혈, 적색불광성 빈혈, 용혈성 빈혈, 무과립구증, 출혈경향, 혈소판기능저하(출혈시간 연장), 호산구 증가 등이 나타날 수 있다.
4) 피부: 드물게 피부발진, 두드러기, 대수포성 포진, 백색(백말성 피부염), 자반, 알레르기성자반, 스티븐스-존슨 증후군(피부정형학 증후군), 리플 증후군(중독성 표피괴사증), 광과민증, 발적, 가려움, 습진, 피부부종, 혈관부종, 다형성 홍반, 홍조, 심출성 피부염이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.
5) 간장: 드물게 간염, 황달을 동반한 간염, 황달, 때때로 간장애, AST・ALT・ALP 상승 등이 나타날 수 있다. 아주 드물게 격발성 간염이 나타날 수 있다. 특히 급성폐렴과 병용 투여시 주의한다.
6) 신장: 드물게 급성 신부전(간질성신염, 신유두괴사 등)(증상: 검사소견: 림노, 혈노, 단백뇨) 증상, 간질성 증후군을 일으킬 수 있으며 고갈증혈증, 저알부민 혈증, 내과적 신장, 신증후군, 드물게 혈중 크레아티닌 상승, 때때로 BUN 상승 등이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.
7) 과민증: 아주 드물게 맥관염, 폐렴, 드물게 천식발작, 혈관부종, 저혈압을 포함한 아나필락시양 전신반응 등의 과민증은, 때때로 발진, 두드러기 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.
8) 전신성경: 드물게 무관성 수막염이 보고되어 있으므로 심한 두통, 구역, 구토, 불면, 목이 뻣뻣함, 발열 또는 의식장애 등의 증상이 나타나면 즉시 투여를 중단하고 의사와 상의하며, 특히 자간역질혈(ILE, MCTD)환자에게는 신중히 투여한다. 특히 발열, 우울, 자각 과민성, 불면, 복통이 나타날 수 있다. 드물게 기가장증, 항항간각 증상, 악몽, 진전, 전신발작 반응, 두통, 출음, 어지러움, 신경과민, 마비, 착란, 환각, 경련 등이 나타날 수 있다.
9) 감각기계: 드물게 시야혼탁, 이명, 청각장애, 미각장애, 일광성의 동통, 건조감, 가려움, 포충각막염 등이 나타날 수 있다.
10) 순환기계: 드물게 혈압상승, 혈압안정, 심계항진, 빈맥, 월열성 심부전, 심실성기외수축, 심근경색, 흉통 등이 나타날 수 있다.
11) 호흡기계: 때때로 비출혈, 종종 천식 발작, 인두부종, 간질성 폐렴 등이 나타날 수 있다.
12) 비노생식기계: 드물게 림노, 혈노, 단백뇨, 빈뇨, 아노증, 발기부전, 질출혈, 유두괴사가 나타날 수 있다.
13) 근골격계: 원본근음해증(급격한 신기능 약화와 병행하여 나타날 수 있으며, 증상으로서는 근육통, 탈각성, 크레아틴 키나제(creatine kinase) 상승, 혈중 노는 노증의 미오글로빈변성 등 이 있다.)이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.
14) 기타: 때때로 부종, 말초, 드물게 전신관대감, 발한, 발열, 흉통 등이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간동안 최소 유효용량으로 투여한다.
2) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법에만 유의한다.
3) 만성질환에 사용되는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
① 이 약을 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 혈액검사(노감사, 전혈구 검사(CBC) 및 이화학적 검사 등)를 행할 수 있다. (심기능 검사 등)를 실시하고 이상이 있을 경우 간염, 혈액의 적절한 조치를 한다. 간질환 또는 신질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발견되거나 비정상적인 간기능 검사는 검사 또는 신기능 검사 결과가 지속되거나 악화된다. 이 약의 투여를 중단해야 한다.
② 약물요법 이외의 치료법도 고려한다.
4) 고혈압환에 사용되는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
① 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
② 원적적으로 동일한 약물의 장기투여를 피한다.
③ 원인요법이 있으면 그것을 실시시킨다.
④ 감기, 인후두염에 사용되는 경우 투여기간을 원칙적으로 5 일 이내로 한다.
5) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 이상반응의 발현에 유의한다. 과도한 체온 하강, 허혈, 사지냉각 등의 증상이 나타날 수 있으므로 고혈압 및 고령자 및 소염진통환의 환자에는 투여 후의 환자의 상태에 특히 유의한다.

- 6) 이 약의 약리학적 특성상 염증의 다른 증상과 징후를 불연성화하여 통증성 및 비감염성 조건하에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 수 있다. 이 약을 감염에 의해 생성된 통증 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.
7) 위장관계 질환의 증후를 나타내거나, 위장관 궤양의 병력이 있는 환자, 궤양성 대장염, 크론씨병 환자, 간기능 부전환자에게는 세밀한 의학적 관찰이 수행되어야 한다.
8) 간성 프로피린증이 있는 환자에서 이 약 사용으로 발작을 일으킬 수 있으므로 주의해야 한다.
9) 위장관계 이상반응: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 궤양성 질환의 병력이 있는 환자에게 처방시 극심한 주의를 기울여야 한다. 소화성 궤양 질환 및/또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여 시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자로는 경구용 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진통제의 장기 사용 알콜 섭취, 고령, 허약한 건강상태 등이 있다. 치명적인 위장관계 이상반응에 대한 자발적 보고에 대부분은 고령자 및 허약자에 대한 것이므로, 이러한 환자에게 이 약을 투여시 특별히 주의하여야 한다.
10) 고혈압: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사태의 발생률이 증가될 수 있다. 치자치게 이뇨제 또는 루프형 이뇨제를 복용중인 환자가 비스테로이드성 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여해야 한다. 이 약의 투여 초기와 투여기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 한다.
11) 출혈성상부전 및 부종: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일부 환자에서 출혈 지류 및 부종이 관찰되었다. 이 약은 제핵지류 또는 심부전이 있는 환자에서 신중히 투여해야 한다.
12) 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용시 신장유두괴사나 기타 신장 손상이 일어날 수 있다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글란딘의 역할이 중요하므로, 신장이나 신기능이 손상된 환자, 심부전 환자, 신기능 부전 환자, 간기능 부전 환자, 이뇨제나 ACE 저해제를 투여 중인 환자, 고령자 및 중요 외과수술 전후 등 어떤 원인으로 세포조직의 감소가 있는 환자 등에서는 특별한 주의가 필요하다. 이러한 경우에 이 약을 사용할 때는 예방적으로 투여로 신기능을 검사해야 한다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복된다.
13) 전염된 신질환: 전염된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 전염된 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이 약의 투여를 개시해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 한다.
14) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 간기능 수치의 상승이 나타날 수 있다. 이러한 비정상적인 검사수치는 치료기 작용에 따라 유발되거나 변화되거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황달, 치명적 전적성 간염, 간괴사, 간부전(일부는 치명적임)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간염은 전구증상 없이도 발생할 수 있다.
간기능 이상을 명시하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상적이거나 악화된 환자에 있어서는 투여기간 동안 간기능에 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발견되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.
15) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 장기 투여에 의해 빈혈의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 해모글로빈치 또는 헤마토크리탈치사를 해야 한다. 비스테로이드성 소염진통제는 혈소판 응집을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈 시간을 연장시키는 것이 확인되었다. 아스피린과 달리 이 약의 혈소판 기능에 대한 영향은 상대적으로 작고 지기간이 짧으며 가역적이다. 응고 관련 질환이 있거나 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 변경에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자 또는 지혈작용에 결함이 있는 환자는 이 약 투여시 신중히 모니터링 하여야 한다.
16) 아나필락시양 반응: 눈개름, 입술, 입안, 두드러기, 부종, 두드러기, 천식, 기관지염, 혈압저하 등의 아나필락시양 반응은 약물에 노출된 환자에서 없는 환자에서도 일어날 수 있다. 이러한 비특이적 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 비특이 증상을 동반하거나 동반하지 않거나 또는 잠재적으로 치명적인 중증의 기관지 경련을 나타내는 전신 환자에게 전형적으로 발생한다. 이러한 아나필락시양 반응이 나타나는 경우 응급치료를 실시하여야 한다.
17) 피부반응: 이 약은 탈락성 피부염, 스티븐스-존슨 증후군 및 독성 표피괴사 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이들 중대한 이상반응은 경고 증상 없이 발생할 수 있다. 대부분의 경우 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 중대한 피부 발현 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상을 알고 투여를 중단해야 한다.
18) 천식: 천식 중 일부는 아스피린 민감장애와 병행할 수 있다. 아스피린 민감성 천식 환자에게 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지경련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피린 민감성 환자에게서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지경련을 포함하는 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 투여하지 않도록 하며, 천식환자에게는 주의가 감 사용되어야 한다.
19) 이 약은 코르티코이드 제제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 없다. 코르티코스테로이드의 감작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드－병용성 질환의 악화를 초래할 수 있다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다.
6. 상호작용
1) 다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직하다. (다른 비스테로이드성 소염진통제와 병용투여시 위장 출혈, 소화성 궤양의 위험이 상승하며, 전신적 비스테로이드성 소염진통제의 병용은 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여 후의 환자의 상태에 특히 유의한다.)
2) 당질 코르티코이드와 병용투여시 위장 출혈, 소화성궤양의 위험

- 이 상승한다.
3) ACE 저해제: 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE 저해제의 항고혈압효과가 감소될 수 있다는 보고가 있으므로 이 약과 ACE저해제를 병용투여하는 경우 이러한 상호작용을 염두에 두어야 한다.
4) 아스피린: 아스피린과의 병용이 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심혈관계 혈전방응의 위험을 감소시킬 수 있다는 일관된 증거는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 병용에 의해 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있으므로 두 약물의 병용은 일반적으로 권장되지 않는다.
5) 이뇨제(루로세미드 등): 비스테로이드성 소염제들은 이뇨제의 활동을 저해하는 경향이 있다. 임상시험 및 시판후 조사 결과 이 약의 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 일부 환자에서 루로세미드 및 치자치게 이뇨제의 나트륨노배설 효과가 감소할 수 있음이 확인되었다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 병용투여하는 동안 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 한다. 루로세미드 및 칼륨지류형 이뇨제와 병용시에 혈장 칼륨 농도가 증가할 수 있으므로 혈장 칼륨 농도를 검사하는 것이 중요하다. 또한 치자치게 이뇨제와 병용투여시 상호 작용이 감소될 수 있다.
6) 리튬: 비스테로이드성 소염진통제는 신장작용에 프로스타글란딘 합성억제에 의해 혈장 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신글리아린제를 감소시킬 수 있다. 따라서 비스테로이드성 소염진통제와 리튬제의 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 병용하는 경우에는 그 약작용을 감강하는 등 신중히 투여한다.
7) 메토트렉세이트: 비스테로이드성 소염진통제와의 병용투여로 메토트렉세이트의 독성이 증가될 수 있으므로 두 약물을 병용하여서는 경우 그 약작용을 감강하는 등 신중히 투여한다.
8) 다국산과 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 병용하는 경우에는 그 약작용을 감강하는 등 신중히 투여한다.
9) 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈에 대해 와파린과 비스테로이드성 소염제들은 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우와 비해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다. 항응고제와 병용투여시 그 작용을 증강시키므로 병용하는 용량을 감소시킬 필요가 있다.
10) 비스테로이드성 소염제의 신프로스타글린인에 대한 효과로 인해 사이클로스포린의 신독성이 증가할 수 있다.
11) 케톤뇨증 환관제와 비스테로이드성 소염제의 병용으로 인한 것으로 추정되는 경련 발작의 예가 매우 드물게 보고된 바 있다.
7. 임부에 대한 투여
1) 이 약을 임부에게 투여한 임상자료는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 임신 말기에 이 약을 투여 시 태아의 독성을 조기에 표 폐쇄시킬 수 있다.
2) 컷드에 대한 실험적 비스테로이드성 소염진통제는 프로스타글란딘 합성을 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 난산의 발생 빈도를 증가시키고, 분만을 지연시키며 세개의 생존출생 감소시켰다.
3) 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임신할 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여한다.
8. 고령자에 대한 투여
고령자는 이상반응이 나타나기 쉬우므로 소량에서 투여를 시작하여 필요한 최소량으로 투여하고 이상반응 발현에 특히 유의하면서 환자의 상태를 관찰하는 등 신중히 투여한다.
9. 작용상의 주의
1) 석도에 장류시 불화하여 석도궤양을 일으킬 수 있으므로 다량의 물과 함께 투여하며 특히 취침 직전의 투여에 유의한다. 이 약은 씹어서 복용하지 않도록 하며, 골육식 하지 않는다.
2) 위장장애를 줄이기 위해 식사후에는 음식물, 제산제, 정박비 등제 등과 함께 복용하거나, 용량을 줄여서 복용한다.
3) 이 약은 흡음과 둔한 감각을 야기할 수 있으므로 빠른 반사능(운전, 기계조작등)을 요하는 활동의 경우 주의를 요한다.
10. 과량투여시의 처치
1) 중후와 증상: 과량 투여에 대한 정보가 부족하여 전형적인 임상 증상은 확립되어 있지 않다.
2) 처치: 이 약은 신장에서 빠르게 가수분해되어 2－[3－(trifluoromethyl)－phenyl] amino-3－pyridinecarboxylic acid를 생성하므로, 일반적으로 모든 비스테로이드성 소염진통제의 경우와같이 과량 복용 시 다음과 같은 처치를 한다.
① 구토, 구내용물의 흡인, 위세척, 활성탄 또는 필요에 따라 염류 해제를 투여한다.
② 지혈법, 신부전, 경련, 위장장애, 호흡억제에는 대증요법을 실시한다. 강제이뇨, 혈액 투석 같은 특별한 처치는 비스테로이드성 소염제의 높은 단백결합율과 광범위한 대사로 인해 제거에 유용하지 않다.
11. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

【저 장 방 법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)
【포 장 단 위】 지사포장단위
※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 통한 제제입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기간)이 경과되었거나 변형, 폐열 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약점을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 첨부문서 작성일자후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화: 02-869-0181에서 확인 할 수 있음.
※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청으로 연락하시고의약품중독상담 및 정보는 "이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)" 의약품 정보 참조

문서작성년월일: 2010. 05. 26

■ 제조의뢰자: 한국메달리(주)
경기도 화성시 둔대면 중리 713-2
■ 제 조 자: (주)테라켄이텍스
경기도 안산시 단원구 초지동 649-1
■ 단 매 자: 초약약품공업(주)
경기도 안산시 단원구 목내동 487