

마이칼디정

분류번호 : 321

【치료약물 및 그 분량】 1정(1,305mg)중

구연산칼슘(칼슘으로서 240mg) (USP)	1,139mg
콜레칼시페롤(비타민D로서 400 IU) (KPC)	4mg
사이노코발라민 (KP)	0.5mg
폴산(USP)	0.25mg

【성상】 항갈색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 D의 보급
 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다
 - 뼈, 이의 발육발달, 구루병의 예방
3. 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

【용법·용량】

12세이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

- (1) 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3) 12개월 미만의 영아
 - 4) 신결석 환자
 - 5) 중증의 신부전 환자
- (2) 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사의 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
 - 3) 일부, 수유부
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장장애(신장장애) 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 강심배당체를 투여중인 환자
- (3) 부작용
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저열, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 구토, 피부발진
 - 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 4) 장기간투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- (4) 일반적주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- (5) 상호작용
 - 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여(함께 복용)하지 않는다.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
- (6) 일부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여
 - 1) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- (7) 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 물 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해, 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1 ~ 30℃)보관

【사용기간】

제조일로부터 36개월

【포장단위】

자사포장단위

- * 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 검토제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인 하실 수 있습니다.
- * 의약품들 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)