

썬버쿨 키드 크림

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

덱스판테놀(USP)	10mg
토코페롤아세테이트(KP)	10mg
디펜히드라민(KP)	10mg
글리시리진산이칼륨(KP)	5mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	2mg

【성상】 백색의 크림제입니다.

【약리작용】

썬버쿨 키드 크림의 성분인 덱스판테놀과 토코페롤아세테이트는 비타민으로서 피부를 부드럽고 촉촉하게 해주며 혈행을 원활하게 하여 증상을 빠르게 회복하는데 도움을 줍니다. 글리시리진산이칼륨은 생약 감초 유래 성분으로 염증을 억제하고 가려움을 진정시키는 작용을 해주며 항히스타민제인 디펜히드라민이 가려움을 멈추어 줍니다. 47가지 성분의 적절한 배합으로 만들어진 썬버쿨 키드 크림은 아이들뿐만 아니라 온 가족의 가려움증, 두드러기, 벌레물림, 짓무름 등에 사용할 수 있는 순한 제제입니다.

【효능·효과】 가려움, 피부염, 습진, 두드러기, 땀띠, 동상, 벌레물림, 짓무름

【용법·용량】 1일 수회 환부(질환 부위)에 적당량을 바릅니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람(부위)에는 이 약을 사용하지 마십시오.
생후 1개월 미만의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
3) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상[예, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등]이 나타난 적이 있는 환자
4) 숨쉬(숨기 참)거나 염증이 심한 환자
5) 6세미만의 영·유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우
2) 5~6일간 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
3) 다음의 경우에는 가능한 빨리 의사에게 진찰을 받으십시오.
(1) 대량(약 10g 이상) 삼켰을 때
(2) 헝기증(어지럼), 구역질, 권태감(노곤함), 호흡 이상 등이 있을 때
- 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지시·감독하에 사용하십시오.
3) 어린이나 고령자(노인)가 본 제품을 경구로 복용한 경우, 조금 핏은 정도로는 영향이 없습니다. 단 많이 먹으면 졸음이 오는 경우가 있습니다.
4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 마십시오.
5) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 눈에 들어간 경우는 물로 씻으십시오. 증상이 심한 경우(충혈이나 아픔이 계속되거나, 눈물이 멈추지 않는 경우 등)에는 안(눈)과의사의 진료를 받으십시오
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
3) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오염(잘못 사용에 따른 사고 발생)이나 약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 사용기한 내의 제품일지라도 품질 유지를 위해 개봉 후 는 가능한 빠르게 사용하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 15g

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2016년 12월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자



GREEN CROSS
충북 음성군 금왕읍 무국로65번길 26 TEL.031260-9300
소비자 상담실 TEL. 080-260-0033