



눈의 피로 • 충혈개선제

아이클리어

점안액

일반의약품 / 분류번호 : 01310

※ 첨부문서를 읽을 것, 첨부문서를 보관할 것

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

아미노카프로산(KP)	10mg
나파졸린염산염(KP)	0.02mg
네오스티그민메틸황산염(KP)	0.02mg
클로르페니라민말레산염(KP)	0.1mg
첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물(KP)	0.005mg
첨가제 : 에데트산나트륨수화물, 붕산, L-멘톨, D-보르네올, 프로필렌글리콜, 주사용수	

【성 상】 무색 투명한 플라스틱 용기에 든 무색 투명한 점안액

【효능·효과】 눈의 피로, 결막충혈, 수영 후 눈의 불쾌감 또는 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때, 자외선 및 기타광선에 의한 안염(설안염)(눈염증 : 눈(Snow)에 의한 눈(Eye)의 염증), 안검염(눈꺼풀염)(눈꺼풀의 진무름), 하드콘택트렌즈를 끼고 있을 때의 불쾌감, 눈의 가려움, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등)

【용법·용량】 1회 2~3방울, 1일 5~6회 점안(눈에 넣음)한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 눈의 통증이 심한 환자
- 2) 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상(예를 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 녹내장 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 이상반응

이 약의 투여에 의해 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 충혈을 일으킬 수 있으므로 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 이 약의 투여에 의해 눈의 침침함이 개선되지 않을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.
- 3) 수일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.

4) 잘못하여 의복 등에 착색된 경우에는 물로 세척하여 제거한다.

4. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 점안용으로만 사용한다.
- 2) 소프트콘택트렌즈의 장착액으로 또한 소프트콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 않는다.
- 3) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 진균 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(어지러움, 흐림)될 수 있으므로 주의한다. 또한 혼탁(어지러움, 흐림)된 것은 사용하지 않는다.
- 4) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
- 5) 사용기한을 초과한 것은 투여하지 않고 일단 개봉한 것은 가능한 한 빨리 사용한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 15mL/병

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시거나 화일약품(주) (02-564-2722)로 문의하시기 바랍니다.

제조의뢰자 : 화일약품(주) / 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 156

제조사 : 삼천당제약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71

작성년월일 : 2009. 04. 17

개정년월일 : 2017. 05. 22

ECO1705.11

DB-17-05