

간세포 보호 및 재생을 돕는 밀크시슬엑스 350mg 함유 헤파라이프 연질 캡슐 350mg HEPALIFE

【성분·함량】 1캡슐 중

밀크시슬엑스(생규) 350mg

(실리마린으로서 196mg)

첨가제(타르색소): 청색1호, 적색40호

【성상】 황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】 다음 질환의 보조 치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

【용법·용량】 1일 1회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. : 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 일반적 주의

1) 지방 과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자 2) 이 약의 과민증 환자 3) 12세 이하의 소아

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. : 임신부, 수유부

6. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. : 1) 드물게 위통 또는 설사 2) 알레르기 반응

7. 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 지키십시오. 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오.

3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하
여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오. 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못
사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【포장 단위】 60, 120캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【소비자 상담실】 02)3463-7111

【반품 및 교환처】 02)3463-7111

· 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.

· 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

· 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

· 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

· 첨부문서 개정일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일 2013. 09. 06

HPS01-130906-03

【제조의뢰자】 (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58(초지동)

최대용제약 계열사

【제조사】 (주)알피 Corp

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7