



[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 은행엽건조엑스(생규) 120.0mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 1호알루미늄레이크, 황색4호알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탈크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 주 효능·효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

[용법·용량]

1. 성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림): 은행엽건조엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다.(복용한다.)
- 2) 기질성 뇌기능 장애: 은행엽건조엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구투여한다.(복용한다.)

2. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프루로몬, 와파린)), 항혈소판제(예:클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))을 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
- 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것

- 1) 수술이 예정된 자
 - 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
 - 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
- 어지러움
 - 가려움증
- ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

[포장단위] 100정(PTP), 200정(100정/PTP x2)

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[제조외국 및 판매] (주)경보제약 / 충청남도 아산시 실옥로 174

[제조사] (주)씨엠지제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패, 오염 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. [소비자상담실 : 02-365-2312]
- ※ 이 제품 설명서 작성일자(2021년 12월 9일)이후 변경된 내용은 홈페이지(<http://www.kbpharma.co.kr>) 또는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 제품설명서를 주의깊게 읽어야 하며, 제품설명서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 정확한 사용기한은 케이스를 참조하여 주시고 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 하십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 하십시오.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제신청: 한국의약품안전관리원 홈페이지(<https://karp.drugsafe.or.kr>) 또는 전화(1644-6223, 14-3330)

작성일자 : 2021년 12월 9일
105 · 090619

[제조외국 및 판매]

경보제약  종근당홀딩스 가족회사

충청남도 아산시 실옥로 174