



강력한 소화제 판코타제정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 판크레아틴(USP)175mg
(전분당화력 250단위/일 이상, 단백소화력 1,500단위/일 이상, 지방소화력 100단위/일 이상)
[동물유래 : 판크레아틴(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 췌장(이자))
우담즙건조엑스(생구) 25mg
(콜린산(으)로서 11.25 밀리그램)
[동물유래 : 우담즙건조엑스(기원동물 : 소, 사용부위 : 담즙(쓸개즙))
디메티콘(NF) 25mg
셀룰라제(별규) 50mg
(섬유소당화력 13단위/일 이상)
- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 글리세린모노스테아레이트, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성아산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 피마자유, 히프로멜로오스, 히프로멜로오스프탈레이트

[성상] 장방형의 장용피를 한 연녹색의 필름코팅정(얇 : PCT)

[효능 · 효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체할, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

[용법 · 용량] 만 15세 이상 및 성인 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당시 이 첨부문서를 소지할 것.
2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 10정/PTP, 100정/병, 500정/병

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 및 QR코드를 참조하십시오.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약품안전관리원에 피해 구제 신청을 할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 작성 연월일 : 2020. 10. 19



제조사
한국신텍스제약(주)
KOREA SYNTAX PHARMACEUTICAL
전북 익산시 삼기면 산단오름길 106



제조의뢰자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282