

※ 의약품을 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
 ※ 의약품은 처방된 증상 · 환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

생약성분이 함유된 종합감기약

두리콜 에프캡슐

Duricol F Caps.

일반의약품

분류번호:해열·진통·소염제(01140)



감기는 일반적으로 상부 호흡 기도에 발생하는 급성 바이러스성 감염질환으로서 재채기, 콧물, 코막힘, 오한, 피로감, 두통, 인후(목구멍)통 등이 주증상으로 나타나며 이차적으로 다른 합병증(예: 기관지염, 폐렴, 편도염, 축농증, 중이(가운데 귀)염 등)으로 진전되기도 합니다.

두리콜에프캡슐은 감초 같은 생약과 함께 비타민, 감기의 복합적인 증상상 개선을 위한 각종 의약품성분이 함유되어 일반적인 비염증상 및 두통 등을 동반하는 감기의 전반적인 증상상에 대해 효과가 우수합니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아세트아미노펜(KP)	200.0mg
카페인무수물(KP)	12.5mg
티아민질산염(KP)	4.0mg
구아이페네신(KP)	40.0mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	7.5mg
감초엑스산(5→1)(벌규)	30.0mg

【성상】 갈색의 가루가 들어있는 상하단 백색의 경질캡슐제

【용법 · 용량】

15세 이상 : 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

15세 미만 ~ 7세 초과 : 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

소아(7세 이하) : 복용금지

【효능 · 효과】

감기의 증상상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【사용상 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제들이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영 · 유아(갓난아기) 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 심장 또는 신장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
- 6) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 9) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
- 10) 부종(부기)이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본제(이 약)의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나거나

복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것

- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것
 - 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것
5. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것
- 1) 용법 용량을 잘 지킬 것
 - 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것
진해거담약, 다른감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
 - 3) 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것
이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.
 - 4) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것
 - 5) 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 2세 미만의 영 · 유아(갓난아기)는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 2세 미만 영 · 유아(갓난아기)에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의깊게 모니터링해야 한다.
6. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것
- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배도곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
 - 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것
 - 3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
 - 4) 장기 연용(계속사용)하지 말 것
 - 5) 장기간 사용시 위장관에 대한 부작용, 특히 출혈궤양 및 천공(푼림)이 일어날 수 있다.
 - 6) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고 되어있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
- 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축(손발)이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
- 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포(물집) 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
- 천식이 나타난 경우
 - 7) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
 - 8) 칼륨 함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로로메치아지드)와 병용(함께 사용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것
7. 보관 및 취급상의 주의
- 1) 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
 - 3) 오용(잘못사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장 단위】 자사 포장단위

【저장 방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 : 02-869-0181에서 확인 할 수 있음.

※ 내용외 부작용이 나타나 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청으로 연락하시고 의약품 용어 설명 및 정보는 "온라인의약도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보 참조"

제조발매업

조당약품공업(주)

경기도 안산시 단원구 별망로 381

문서작성년월일 : 2010. 09. 27

문서개정년월일 : 2015. 01. 14