

간세포 보호를 돕는

맥스리버

원질캡슐

밀크시슬열매건조엑스 350mg 함유

【원료의약품의 분량】1캡슐 [1,170mg]중

▶ 유효성분

밀크시슬열매건조엑스(생규) 350.0mg(실리마린으로서 196.0 mg)

▶ 첨가제(타르색소) : 카카오색소

▶ 기타첨가제 : 농글리세린, 비결정성소르비톨액, 레시틴, 산화티탄, 아자경화유, 폴리소르베이트80, 히드록시프로필 옥수수전분, 카라기난, 콩기름, 향남

【성상】황갈색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】다음 질환의 보조 치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

【용법·용량】1일 1회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자 2) 이 약의 과민증 환자 3) 12세 이하의 소아 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 임신, 수유부 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 드물게 위통 또는 설사 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 지킬 것

2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것

3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기 복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것

4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【포장 단위】60, 120캡슐

【저장방법】기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】제조일로부터 24개월

【소비자 상담실(반품 및 교환처)】043)881-6333

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품의 기타 자세한 정보는 본사(043)881-6333으로 문의하시거나 또는 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 년월일 : 2020.08.10.

【판매원】(주)경보제약 (주)종근당홀딩스 가족회사

【제조의뢰자】한솔신약(주) 충청북도 음성군 금왕읍 청평길 2-11

【제조원】코스맥스파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

MAXLIVER