

간세포 보호 및 재생을 돕는 밀크시슬엑스 350mg 함유

리버존

연질캡슐



【성분·함량】 1캡슐 중

밀크시슬엑스(KHP)(실리마린으로서 196.0mg) 350.0mg

첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호

첨가제(식물유래성분) : 대두유

첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(건강한 소, 가족의 안쪽부위)

【성상】

황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

【용법·용량】 1일 1회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

【학술/개발부】 02-928-0661

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자 2015. 03. 06

제조의뢰자 삼익제약(주) / 인천광역시 부평구 청안로 13

제 조 자 **Prime 한국프라임제약**

전북 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

판 매 원 **종 군 당** 계열회사 **경보제약**

본사·공장 : 충청남도 아산시 실옥로 174(실옥동 345-6)

서울사무소 : 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로3가 368)