

잇몸병 통증엔 아로마·에프 캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

제피아스코르브산(KPC).....	155mg
(아스코르브산으로서 150mg)	
리소짐염산염(KPC).....	30mg(역가)
카르바조크롬(KPC).....	2mg
토코페롤아세테이트 2배산(KPC).....	10mg
(dl- α -토코페롤아세테이트로서 5mg)	
첨가제(타르색소) : 황색 203호, 황색 5호	

【성상】 연분홍색의 분말이 든 상 · 하부 황색의 경질캡슐제(알 : TG ARM-F)

【효능 · 효과】 치은염(잇몸염) · 치조(이들)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐) · 부기 · 출혈 · 통증)의 완화

【용법 · 용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 부작용(이상반응)

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은 반점), 가려움, 안(눈)충혈, 구내염(입안염)등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상양(불에 덴 듯한 모양)의 수종등의 중증(심한 증상)의 증상이 전신(온몸)의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증(심한 증상)의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온($\sim 30^{\circ}\text{C}$)보관

【포장단위】 20, 60, 120캡슐

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조사



태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

☎ 소비자상담전화 080-300-8282

☎ <http://www.taiguk.co.kr>

첨부문서 작성 연월일 : 2014. 10. 21