



Fe 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

HEMOQUEEN GOLD Cap.

일반의약품
분류번호 : 322

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

빈혈은 남녀노소 고르게 발생하는 질환이며, 여성의 경우 임신과 출산시 태아와 태반형성, 분만시 출혈등으로 인해 정상인보다 4배의 철분이 필요하기 때문에 임신부에 있어 철분제의 공급은 필수적인 요건으로 대두되어 왔습니다. 특히 태아의 건강까지 고려해야 하는 임신부의 경우 철분제의 성분이 무엇보다도 중요하게 요구되고 있는데, **헤모퀸골드캡슐**은 전분을 가수분해하여 얻은 저분자 polysaccharide와 철분(Fe)을 결합시켜 만든 PIC(Polysaccharide iron complex)를 주성분으로 하고 있습니다. 이 성분은 우리 몸안에 있는 저장철인 ferritin과 매우 유사하여 몸 안에서 흡수되기 쉽고, 장관점막을 자극하기 쉬운 이온형태가 아닌 비이온상태로 흡수되기 때문에 빈혈제의 대표적인 부작용인 위장관계 부작용이 낮아 임신부, 노인, 소화성 궤양환자들도 복용하기 좋습니다.

또한 기형아 예방과 뇌발육에 필수적인 폴산 및 헤모글로빈 생성에 필수적인 조혈비타민인 시아노코발라민이 새롭게 보강되어 한층 강화된 빈혈 예방 및 치료제입니다.

● 제품명 : 헤모퀸골드캡슐

● 원료약품 및 그 분량 : 1캡슐 중

폴리사카리드철착염(KP)(철(Fe)로서 150 mg) 326.1 mg
시아노코발라민 1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 25 µg) 25 mg
폴산(KP) 1 mg

● 성상

갈색의 분말이 충전된 상 · 하부 적갈색의 경질캡슐제

● 효능 · 효과

철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

● 용법 · 용량

성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐을 복용한다.

● 사용상의 주의사항

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
- 4) 비철결핍성빈혈(예 : 비타민 B₁₂ 결핍에 의한 거대적아구성빈혈) 환자
- 5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 경구용 테트라사이클린계 제제
- 3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

녹차, 홍차등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용 중, 복용전후에는 피할 것.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자



경남제약(주)
Kyung Nam Pharm.Co.,Ltd.

- 4) 신장애(신장장애) 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부, 수유부
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)

**6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상
담시 가능한 이 첨부 문서를 소지할 것**

- 1) 때때로 흥반(붉은 반점), 피부질환, 가려움, 전신권태, 기관지에 의한 호흡곤란 등의
알레르기 증상이 나타나는 경우
- 2) 두드러기, 가려움, 햇빛에 의한 피부 과민반응
- 3) 복부(배부분) · 위통증, 위 경련
- 4) 구토, 설사
- 5) 열, 혼수
- 6) 구역, 식욕부진, 체중감소, 부종(부기), 복통(배아픔), 설사, 변비, 흑변(검게 변함), 위부(상복
부)불쾌감
- 7) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응
이 나타날 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 복부(배부분)통증, 구토, 구역, 설사, 흑변(검게 변함), 토혈(혈액구
토), 저혈압, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기), 빈맥(빠른맥), 대사성 산증,
고지혈증, 탈수, 졸음, 창백, 권태, 발작, 속, 혼수

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우에는 의사 또는 약사
와 상의할 것.
- 3) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 한다. 빈혈은 혈액손실
과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 한 이러한 원인들이 먼
저 치료되어야 한다.
- 4) 이 약에 함유된 폴산은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만
신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B₁₂제
제와 병용(함께 복용)한다. 다만, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경
우에 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므
로 주의할 것.
- 5) 아스코르브산(비타민C) 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가
될 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫
아) 보관할 것.
- 3) 오(잘못 사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

● **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● **포장단위** : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● **제조사** : **경남제약(주)** 충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 49



※ 기타주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.
 3. PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐에
포장물이 있는지 꼭 확인 하시고 복용하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기
바랍니다.(소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr)
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래
위원회고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관 「<http://drug.mfds.go.kr>」
→ 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.