



테르비쿨 크림

무좀은 곰팡이의 일종인 백선균이 피부각질층에 기생하여 발생하는 가장 흔한 피부진균(곰팡이)감염증으로서 수포(물집), 농포(고름물집), 가려움증, 통증 등의 참기 어려운 다양한 증상을 수반하며, 심한 경우 각화(각질화) 증 및 안설(비늘, 껍질) 등이 나타나기도 하는 만성적이고 재발적인 소양(가려움)성 질환입니다.

테르비쿨크림은 무좀균에 우수한 살진균(곰팡이) 작용을 나타내는 테르비나핀에 국소마취 효과가 있는 리도카인, 가려움과 염증 완화 효과가 있는 글리시리진산이칼륨, 청량감을 주는 멘톨을 첨가한 국내 최초의 테르비나핀 복합 항진균(곰팡이)제입니다. 따라서 기존 테르비나핀 제제의 강력한 무좀균 치료효과 뿐만 아니라 무좀에 수반되는 심한 가려움증, 통증까지도 효과적으로 완화시켜줍니다.

【성분·함량】(1g 중)

테르비나핀염산염(Terbinafine HCl)(EP)	10mg
리도카인(Lidocaine)(KP)	20mg
글리시리진산이칼륨(Dipotassium Glycyrrhizinate)(KP)	5mg
l-멘톨(l-Menthol)(KP)	10mg
보존제: 파라옥시벤조산메틸(KP)	1mg
보존제: 파라옥시벤조산프로필(KP)	1mg

【성 상】 흰색의 크림제

【약리작용 및 특성】

1. 테르비쿨크림은 국내 최초 출시된 테르비나핀 복합항진균(곰팡이)제로서(무좀균) 및 그(증상)까지 치료합니다.
2. 테르비나핀(terbinafine)은 진균(곰팡이)의 세포막에서 스쿠알렌에폭시다제(squalene epoxidase)의 작용을 차단하여 진균(곰팡이)세포막 손상에 의한 살진균 작용을 나타내므로 난치성 피부진균감염증에 우수한 치료효과를 발휘합니다.
3. 테르비쿨크림은 3종의 증상치료제인 리도카인, 글리시리진산이칼륨, 멘톨을 함유하여 무좀에 수반되는 심한 가려움증, 통증까지도 효과적으로 완화시켜줍니다.
4. 테르비쿨크림은 피부에 도포 시(바를 시) 피부 자극감이 없고 끈적이지 않으며 멘톨을 함유하여 청량감을 더해 줍니다.

【효능·효과】

피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 무좀, 완선(사타구니 백선), 백선

【용법·용량】

1일1회, 적당량을 환부(질환 부위)에 바르십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 부적, 가려움, 붓기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유·소아

2. 다음 부위에는 사용하지 마십시오.

- 1) 눈이나 눈 주위, 점막(구강(입안), 비강(코안), 질 등), 음낭, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습윤(습기 참), 짓무름, 갈라짐이나 외상(상처)이 심한 환부(질환 부위)
- 4) 손톱, 두피

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단하십시오.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 약에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 본인 또는 가족이 알레르기체질인 사람

- 4) '습진' 인지 '무좀, 완선(사타구니 백선), 백선' 인지 확실하지 않은 사람(음낭에 가려움 및 짓무름 등의 증상이 있는 경우는 습진등의 다른 원인에 의한 경우가 많습니다.)
 5) 환부(질한 부위)가 안면(얼굴)또는 광범위한 사람
 6) 환부(질한 부위)가 화농(꺾음)으로 되어있는 사람
5. 다음의 경우는 즉시 사용을 중지하고, 이 설명서와 함께 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 1) 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우

관계부위	증상
피부	발진 및 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움, 붓기, 자극감, 열감, 인비늘, 낙설(비듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 짓무름, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐

- 2) 2주일 정도 사용하더라도 증상이 좋아지지 않는 경우나 본 약제의 사용에 의해 증상이 악화된 경우
6. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
- 1) 정해진 용법 및 용량을 엄수하십시오.
 - 2) 환부(질한 부위)나 그 주위가 더러워진 채로 사용하지 마십시오.
 - 3) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 마십시오.
 - 4) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 찬 물 또는 미지근한 물로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받으십시오.
 - 5) 이 약은 외용에만 사용하십시오.
 - 6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있습니다.
7. 저장상의 주의사항
- 1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀봉하여 보관하십시오.
 - 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 3) 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.(오용(잘못 사용)의 원인이 되거나 품질이 바뀌는 경우가 있습니다.)
 - 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 그리고 사용기한 내이더라도 개봉 후에는 최대한 빨리 사용하십시오.(품질유지를 위해).

【저장방법 및 사용기한】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 외부 용기에 표기

【포장단위】 자사포장단위(외부포장 표기)

〈보관시 주의사항〉

여름철 차량 내부처럼 온도가 30℃ 이상 상승하는 장소에 보관시 용기가 팽창할 수 있으니 **직사광선 등을 피해 보관**에 주의하십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준" 에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**
 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 개정년월일 : 2015.09.30