

KGMP
우수의약품지정업체

I-02

태 승 원

[대승기탕엑스과립]

일반의약품
분류번호: 239

【원료약품 및 그분량】 1회용량(3.0g)중

대황(KP)	5.00g
후박(KP)	2.50g
지실(KP)	2.50g
망초(생규)	2.50g
	이상 건조엑스로서 0.60g

동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)

【성 상】 갈색의 과립제

【효능 · 효과】 상한(傷寒) 이증(異症)에 고열, 변비, 복부팽만감

【용법 · 용량】 보통 성인 1회 1회용량(3.0g)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 총혈작용에 의해 유 · 조산(조기 분만)의 위험이 있다.)
- 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황 중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아(젖먹이)에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물 복용을 금하거나 수유를 중단한다.)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한의사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
- 1주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 자극성 완화제는 장기간 계속 복용시 약물물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법 · 용량에 특히 주의할 것.
- 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500g, 90포, 120포

【소비자상담실】 080) 597-1020

문서개정일 : 201705

- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서는 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



(주)아이월드제약
인천광역시 남동구 합박외로 316(논현동)
www.i-pharm.kr

