

네오졸 특허공법 적용

효과 빠른
수면유도제

쿨드림

(디펜히드라민염산염) 연질캡슐

일반의약품

분류번호 112

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품의 분량] 1캡슐 중

유효성분 : 디펜히드라민염산염 (KP) 50 mg

첨가제 (타르색소) : 청색 1호

첨가제 (동물유래성분) : 젤라틴 (소, 가축)

기타 첨가제 : 글리세린, 솔비톨스페탈글리세린블렌드, 폴리에틸렌글리콜400

[성상] 무색 투명한 액상의 내용물을 함유한 연청록색의 불룩한 타원형 연질캡슐입니다.

[효능·효과] 일시적 불면증의 완화

[용법·용량]

성인 : 1일 1회 디펜히드라민염산염으로서 50 mg(1캡슐)을 취침 전 경구투여합니다. [복용합니다.]

개인에 따라 디펜히드라민염산염으로서 50 mg(1캡슐) 복용 시 과도한 진정작용이 나타날 경우 25 mg(0.5캡슐)을 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증이 있는 사람
- 2) 천식발작, 폐기종, 만성기관지염에 의한 호흡곤란 환자
- 3) 녹내장 환자
- 4) 전립선(전립샘)비대 등 하부 요로 폐색(당해서 막힘)성 질환 환자
- 5) 협착(좁아짐)성 소화성 궤양 또는 위문(십이지장) 폐색(당해서 막힘) 환자
- 6) 15세 미만의 소아
- 7) 간질 등의 경련성 질환 환자
- 8) 크롬친화성세포종 환자
- 9) 수유부
- 10) 일상적으로 불면인 환자
- 11) 불면증의 진단을 받은 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약과 동일한 성분을 함유하고 있는 다른 제제
- 2) 다른 최면진정제, MAO 저해제(메제), 감기약, 해열진통제, 진해(기침을 그치게 함)제(가래약), 항히스탐(민)제를 함유하고 있는 내복약(비염(코염)용 내복약, 열미약, 알러지용약)

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 연용(계속 복용)하거나 장기복용하지 않습니다.
- 2) 졸음을 유발할 수 있으므로 이 약을 복용한 때부터 복용 다음날까지 졸음이 계속되고 나른함을 느끼는 경우에는 이러한 증상이 사라질 때까지 운전 또는 기계조작을 하지 마십시오.
- 3) 이 약을 복용할 때에는 음주를 하지 마십시오.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 중증(심한 증상) 근무력증(근육무력증) 환자
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 고령자(노인)
- 4) 본인 또는 가족이 알러지 체질인 사람
- 5) 약에 의해 알러지 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람(이 약은 임부에 대한 사용경험이 부족하여 안전성·유효성이 확립되어 있지 않으므로 임부에 투여가 바람직하지 않습니다)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 복용 후 다음 증상이 나타나는 경우

신체부위	증상
피부	발진, 발적[충혈되어 붉어짐], 가려움
소화기	구갈[목마름], 위통, 오심[구역·구토, 식욕부진, 설사]
정신신경계	어지러움, 두통, 기상시의 두중감[머리 무거움], 활동중의 졸음, 불쾌감, 신경과민, 일시적인 의식장애(주의력의 저하, 잠이 들게는 증상, 판단력의 저하, 말·행동의 이상 등)
기타	심계항진[두근거림], 권태감, 배뇨[소변을 놓]곤란, 시야혼란, 폐색(녹)내장

- 2) 2~3회 복용하여도 증상이 나아지지 않는 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항.

- 1) 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 불면증은 심한 질병의 한 증상일 수도 있으므로 이 약을 투여한 후 2주 이상 불면증이 지속될 때에는 의사와 상담하십시오.

7. 저장상의 주의사항.

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용[잘못 사용]에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10캡슐

※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품은 햇빛을 받는 경우 변색되므로 반드시 차광하시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2018년 9월 8일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

※ 포장 개봉방법 및 유의사항



1. 일부분을 강하게 눌러 호일로부터 캡슐을 꺼냅니다.
2. 이 제품은 어린이보호용 안전용기(포장이므로 개봉이 다소 어렵거나, 개봉시 강한 충격으로 캡슐의 모양이 변형될 수 있습니다.

제조의처 및 판매처

GC녹십자

(주)녹십자

충주 동원로 100-1 녹십자빌딩 2층 TEL.033200-9000

소사읍 상남로 TEL. 030-260-0033

제조사

(주)알피바이오

경기도 성남시 분당구 백정대길 35-7

설명-10-1617-9