



천연생약 혈액순환 개선제 긴코센정120밀리그램 (은행엽엑스)

일반의약품
분류번호:219

긴코센정 120밀리그램(은행엽엑스)은 혈소판 응집 PAF(Platelet Activatin Factor)의 작용을 강력히 억제하여 항혈전(혈관 막힘)작용, 혈관부종(부기) 억제작용 및 혈유동학적 개선작용을 나타내어 뇌 및 말초의 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 또한 유리기를 포착하여 제거하는 작용이 강력하므로 유리기로 인한 세포막손상, 특히 혈관과 신경세포가 손상되어 나타나는 순환장애 증상을 개선시켜 줍니다. 긴코센정 120밀리그램(은행엽엑스)은 허혈상태에서도 glucose의 이용율을 증가시켜 에너지 대사 기능 장애로 인한 뇌세포의 손상을 막아주며, 알츠하이머성 치매환자 50%의 지적능력 및 행동능력, 사회행동력을 향상시켜 줍니다.

원료약품 및 그 분량 1정 중

은행엽엑스(생규).....120mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호 알루미늄레이크

성상 녹색의 원형 필름코팅정(TG120)

효능·효과

1.주 효능효과

- 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애

용법·용량

1.성인

- 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽 엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여(복용)한다.
- 기질성 뇌기능 장애 : 은행엽 엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구 투여(복용)한다.

2.연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

*본 의약품은 1정 중 은행엽엑스 120mg이 함유되어 있으므로 적절히 계산하여 복용하시면 됩니다.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 200정((10정X10)X2), 240정((10정X12)X2)/PTP

사용상의 주의사항

1.다음 환자에는 투여하지 말 것

- 이 약에 과민증 환자
- 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2.부작용(이상반응)

- 드물게 가벼운 위장관(위창자) 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 가려움증

3.일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

4.임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

5.소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

6.저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사일광(햇빛)을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변해·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 02. 06

제조·판매자
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282