

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중  
히드록소코발라민아세트산염(KP)...522 μg  
(히드록소코발라민으로서 500 μg)  
인산피리독살(KPC).....25 mg  
티아민다실피드(KPC).....13 mg  
참가제(크레아틴): 적색4호, 청색1호, 황색203호

【효능 및 효과】

-다음 경우의 비타민 B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub>의 보급: 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시  
-이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, 각기, 눈의 피로

【용법 및 용량】 만 8세이상 및 성인: 1일 1회, 1회 2캡슐 또는 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【성상】 어두운 적색의 결정 또는 기부가 소량 섞여 있는 미황색(연노랑)의 과립 및 분말이 든 상·하 갈색의 결정캡슐제

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것  
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자  
2) 만 3개월 미만의 젖먹이
2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.  
1) 만 3세 미만의 젖먹이  
2) 의사의 처방을 받고 있는 환자
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상급시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.  
1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 묽은변, 식욕부진, 복부(배)부분팽만감  
2) 피로감을 1일 500 mg-2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.  
3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B<sub>6</sub>를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있다.  
4) 무발적으로 과량복용 한 경우  
5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

고단위 · 복합비타민

활비에이 캡슐



4. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 뒤흔 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【수신자부담금객상담실】 080-988-8888

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30 °C) 보관

【제 조 자】 조아제약(주) <http://www.choa.co.kr>

본사: 서울특별시 영등포구 당산로2길 12

공장: 경상남도 함안군 함안면 평정로 318

※기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오. ※본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다. ※본 표시사항의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의 깊게 읽어주십시오. ※의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오. ※표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.

Perf.0

