

※사용 전에 사용설명서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

분류번호: 02310



잇몸 발적, 부기, 출혈, 고름

멘타칸 캡슐

잇몸질환 치료제

잇몸질환에는 치조농루(치주염)와 치은염이 있습니다. 이러한 잇몸질환은 여러 가지 원인에 의해 치아를 고정·유지·보호시켜 주는 치아주위조직(잇몸, 치근막, 치조골 등)에 염증이 발생하여 잇솔질을 할 때 출혈이 나타나거나 잇몸이 발적되고 입냄새 등의 증상이 나타나는 치은염으로 시작되어 부기, 출혈, 고름으로 이어져 나중에는 치아의 뿌리(치근)인 하부조직까지 염증상태가 확산되며, 심하면 치아가 흔들리고 빠져버리기도 하는 치주염을 일으킵니다. 이와 같은 잇몸질환은 잇몸에 대한 직접적인 자극(치석, 치태 등)이나 구강내 세균 및 전신적인 원인(비타민의 부족, 내분비 이상, 대사 이상 등)에 의해 발생하는 것으로 알려져 있습니다.

멘타칸 캡슐은 잇몸의 증상을 정상화시키는 비타민 2종과 염증을 억제하는 리소짐 및 혈관을 강화하고 지혈작용을 하는 카르바조크롬을 적절히 배합한 잇몸질환 치료제입니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(406mg) 중

염화리소짐(KPC).....	30mg(약가)
카르바조크롬(KPC).....	2mg
토코페롤아세테이트 50%(KPC).....	10mg
(토코페롤아세테이트로서 5.0 IU)	
제페아스코르빈산(KPC).....	156.3mg
(아스코르브산으로서 150mg)	

염화리소짐(담 : 난백), 스테아르산마그네슘(소 : 우지)

[성상]

얇은 주황색 가루가 든 상·하부 담청색의 경질캡슐

[효능·효과]

치은염, 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

[용법·용량]

성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고 : 매일 세안 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발 될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 지금까지 이 약에 의한 과민 증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람

2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열 진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 본인, 양친 또는 형제들이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관혈통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람

3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 어린이(14세 이하)

4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람

5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자

6) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람

7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 부작용

1) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부접막안증후군), 리얼 증후군(중독성 표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 흉반, 가려움, 안종혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진, 발적, 화상등의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

2) 유아에서 이 약에 함유된 염화리소짐을 처음으로 복용했을 때, 속(아나필락시)이 나타났다는 보고가 있으므로 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다(3세 미만의 용법이 있는 내용액제, 시럽제에 한함.).

5. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

1) 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 다음 약물과는 동시에 복용하지 말 것

3) 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제, 항히스타민제

4) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것

5) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세미만의 유아에는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

6. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것

1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담 할 것

(1) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우

(2) 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 (3) 천식이 나타난 경우

3) 바르비탈계 약물, 심관계 항응고제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트 아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전, 조작을 하지 말 것

5) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것

6) 장기 연용하지 말 것

7. 보관 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것

2) 적시일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것

3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10캡슐, 120캡슐, 240캡슐

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변색 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 (02)3473-6365로 하시기 바랍니다.

※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭 (<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」→ 「의약품 등 정보」를 참조하세요.

• 제조자 : 정제제약(주)---경기도 화성시 암남면 대안리 1106-4

• 제조외화자 : (주)넥스핀코리아---충북 진천군 문백면 정월리 112-3

• 판매자 : 광동제약(주)---경기도 평택시 오목동 440-2