



필수아미노산 + 비타민 복합처방

마이파워^정

※ 첨부문서를 읽을 것, 첨부문서를 보관할 것

【원료약품 및 그 분량】1정 중

L-류신(KP) 17mg, L-메티오닌(KP) 15mg, L-발린(KP) 15mg,
L-이소류신(KP) 15mg, L-트레오닌(KP) 10mg, L-페닐알라닌 (KP)
10mg, L-트립토판(KP) 5mg, L-리신염산염(KP) 18.75mg,
L-아르기닌염산염(KP) 10mg, 티아민질산염(KP) 5mg, 토코페
롤숙시네이트칼슘(KP) 2.5mg, 리보플라빈(KP) 2mg, 니코틴산
아미드(KP) 15mg, 피리독신염산염(KP) 7.5mg.
동물유래성분 : 유당수화물 기원동물 : 소, 사용부위 : 우유

【성상】

진한 갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후, 위장장애, 영양장애, 발열성
소모성질환, 임신수유기 등의 경우의 영양보급

【용법·용량】

15세이상 청소년 및 성인 : 1회 2정, 1일 1~2회 복용
소아(7세~14세) : 1회 1정, 1일 1~2회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 중증의 신부전환자
- 3) 7세미만 소아
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 (복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부·수유부

3. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변,
- 2) 이 약 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여한다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
가) 레보도파

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 4) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것. 또한 사용기한 내에 있더라도 개봉 후 6개월 이내에 복용할 것(품질유지를 위함)
- 5) 다른 용기에 옮겨 보관하지 말 것.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 120정, 240정

※ 쉬운용어 : 아래 용어 설명을 참조하시기 바랍니다. (가나다 순서)

1. 경구투여한다 : 먹는다, 복용한다, 2. 당내성 : 포도당 내성, 3. 밀전하여 : 뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아, 4. 발적 : 충혈되어 붉어짐, 5. 병용 : 함께 복용(사용), 6. 병중병후 : 병을 앓는 동안이나 회복 후, 7. 유당 : 젖당, 8. 중증 : 심한 증상, 9. 혈전 : 혈관 막힘

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시거나 화일약품(주) (02-564-2722)로 문의하시기 바랍니다.

제조외의자 : 화일약품(주) / 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 156

제조사 : (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

판매원 : 한미메디케어(주) / 서울특별시 송파구 위례성대로2길 5

작성년월일 : 2011년 04월 28일

개정년월일 : 2015년 11월 20일

MPT1511.09

DE-15-11