

육체피로·체력저하·비타민 보급

나노민 연질캡슐

일반의약품 | 분류번호 : 316

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

레티놀팔미테이트(비타민A로서1,000IU)(KP).....	0.588mg
농축콜레칼시페롤(유상형)(비타민D로서100IU)(BP).....	100.00μg
티아민질산염(KP).....	10.00mg
리보플라빈(KP).....	4.00mg
시아노코발라민(KP).....	6.00μg
아스코르브산(KP).....	20.00mg

첨가제(타르색소) : 황색5호 청색1호 적색40호

[성 상] 미황색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 다음의 경우 비타민 A, D, B₁, B₂, C의 보급
 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시 - 발육기 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조감 완화, 야맹증병에 잘 못 보는 증상, 눈의 피로 - 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 건통(어깨통)등), 구순염(입술염), 구각염(입꼬리염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기

[용법·용량] 만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐을 복용

[사용상의 주의사항]

- 1 경고 : 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발한 위험이 있으므로 임신3개월 이내 또는 임신한 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 않는다.(비타민A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 3개월 미만의 영아(갓난아기) 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 1세 미만의 영아(갓난아기) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다. 4) 과수산노증환자(hypercalcemia : 노증에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 5) 임부, 수유부 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(이)자염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질상 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기) - 설사, 묽은변 - 식욕부진, 복부(배부)팽만감
 - 2) 장기간 고용량 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다
5. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여한다. 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선의 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 4) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조용법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체지방률이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 임부, 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여
 - 1) 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다(이 약학조사결과 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000 IU/일 미만으로 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
 - 2) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
7. 임상검사치에의 영향
 - 1) 각종 뇨검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 2) 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다. 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [사용기간] 제조일로부터 24개월. [포장단위] 1연질캡슐(포), 600연질캡슐(포)

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 약약품 용어 설명 및 기타 자세한 약약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시거나 본사 (043)881-6333으로 문의하여 주십시오.
- ※ 약약품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

첨부문서 작성 년월일 2013. 12. 13

제조의뢰자 : 한솔신약(주) 총복 음성군 금왕읍 청평길 2-11(도청리 33-32)
제 조 자 : (주)알피코프 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7