



파베린정 (디시클로민염산염, 파파베린염산염)

【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분 : 디시클로민염산염(KP) 5 mg
파파베린염산염(USP) 15 mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 위통, 복통, 산통, 위산과다, 속쓰림

【용법·용량】

- 성인 : 1회 2정씩 1일 2 ~ 3회
- 8~14세 : 1회 1정씩 1일 2 ~ 3회, 식후 또는 식전(식사때와 식사때 사이에) 복용. 단, 1일 2회 이상 사용시 4시간 이상의 간격을 두고 복용함.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. (경구제 및 주사제에 한함)
이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 심장에 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨(소변을 냄) 장애 환자, 허약자 또는 고령자(노인)
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 2) 이 약을 투여함으로써 구갈(목마름), 변비의 증상이 나타날 수 있다. 또 두통, 안면홍조(얼굴 붉어짐), 눈부심, 배뇨(소변을 냄)장애 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
- 3) 이 약을 투여함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 4) 수화 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 상호작용

스코폴리아엑스를 함유하는 제제 및 다른 위장진통, 진경제와 병용할 때 복용(사용)투여하지 않는다.

6. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영, 유아에게 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 10정/PTP, 500정/병

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조회사】 (주)레고켐制药 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부서류를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부서류를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변태·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품다산 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900

작성일 : 2018. 05. 15 (Rev.1)