

과식, 소화불량, 위산과다, 속쓰림에

맥스타제-S 정

MAXTASE-S Tab.

맥스타제-S정은 합리적으로 배합되어 있는 현대인의 식생활에 알맞게 처방된 종합 위장약으로서 음식물의 소화흡수를 촉진시키고 우수한 효능을 나타내어 불규칙한 식사, 과식, 육식 위주의 식사습관 및 운동부족 또는 스트레스 등 정신적, 육체적 원인에 의한 각종 소화장애를 신속히 개선시켜주는 새로운 처방의 종합소화제입니다.

■약리작용 및 특징

1. **맥스타제-S정**은 디아스타제·프로테아제100 이 들어있어 탄수화물, 지방, 단백질 및 섬유소에 대한 강력한 소화력을 나타내므로 소화불량, 과식, 위체를 신속히 개선시켜 줍니다.
2. **맥스타제-S정**은 제산 성분인 탄산수소나트륨이 배합되어 있어 위장을 보호하고 위산을 중화시키며 위벽에 신속한 보호막을 형성하여 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 신트림 등을 신속히 제거하여 줍니다.
3. **맥스타제-S정**은 건위작용을 발휘하며 장관연동운동 및 위액분비를 촉진하여 위부불쾌감, 위부 팽만감, 식욕부진 등 위장기능을 정상화 시켜줍니다.

■성 상 흰색 타원형의 필름코팅정

■원료약품의 분량 1정중

탄산마그네슘 (Magnesium Carbonate)	(KP)	80mg
스코폴리아엑스 10 배산 (10 % Scopolia Extract Powder)	(KP)	75mg
디아스타제·프로테아제100 (Diasatase-Protease 100)	(KP)	3.75mg
탄산수소나트륨 (Sodium Bicarbonate)	(KP)	250mg

첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 부위: 우유)

■효능·효과

과식, 소화불량, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부불쾌감, 식체(체항), 구역, 구토, 위통, 복통(배앓음), 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감

■용법·용량

성인 및 15세 이상 : 1회 1~2정 1일 3회 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용한다.

■포장단위 자사포장단위

■저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 참조 하십시오.
- * 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

설명서개정연월 2015년 04월

제품문의 (032) 812-8356



제조발매원

영풍제약주식회사

인천광역시 남동구 학박로 333



본 의약품은 정부의 KGMP
(우수약품 관리기준)에
의거하여 엄격한 관리에
의해 생산된 제품입니다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 3) 심장에 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애 환자, 허약자 또는 고령자(노인)
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 자
- 5) 신장장애(신장장애) 환자

3. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
- 2) 이 약을 투여하는 동안 드물게 구갈, 변비의 증상이 나타날 수 있다. 또 두통, 안면홍조(얼굴이 붉어짐), 눈부심, 배뇨장애 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
- 3) 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
- 3) 이 약을 투여함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의할 것.

5. 상호작용

스코폴리아엑스를 함유하는 제제 및 다른 위장진통·진경제(경련완화)와 병용 투여(함께 사용)하지 않는다.

6. 소아에 대한 투여

- 1) 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.