

필수아미노산제(아민산류 복합제) 아미프로틴정

성 성분 · 함량

이 약은 녹색의 장방형 필름코팅정입니다.

이 약 1정 중

L-류신(KP)	17mg
L-메타오닌(KP)	15mg
L-발린(KP)	15mg
L-이소류신(KP)	15mg
L-트레오닌(KP)	10mg
L-페닐알라닌(KP)	10mg
L-트립토판(KP)	5mg
L-리신염산염(KP)	18.75mg
L-아르기닌염산염(KP)	10mg
티아민질산염(KP)	5mg
토코페롤속시네이트칼슘(KP)	2.5mg
리보플라빈(KP)	2mg
니코틴산아미드(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	7.5mg
첨가제(타르색소) : 오파드라이80W41001(그린) (황색203호, 청색1호, 황색5호)	

효능 · 효과

자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후), 위장장애, 영양장애, 발열성소모성질환, 임신 · 수유기 등의 경우의 영양보급

용법 · 용량

15세 이상 청소년 및 성인 : 1회 2정, 1일 1~2회 복용하십시오.
소아(7~14세) : 1회 1정, 1일 1~2회 복용하십시오.

사 용 상 의 주 의 사 항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 중증(심한 증상)의 신부전환자
- 3) 7세 미만 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 · 수유부
- 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. -- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변
- 2) 이 약 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.

- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuridsemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여한다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다.
- 가) 레보도파

6. 임상검사치에의 영향

요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- 4) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것. 또한 사용기한 내에 있더라도 개봉 후 6개월 이내에 복용할 것(품질 유지를 위한)
- 5) 다른 용기에 옮겨 보관하지 말 것.

포 장 단 위

자사포장단위

저 장 방 법

차광기밀용기, 실온(1~30°C)에 보관하십시오.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 첨부문서 최종개정연월일(2013.06.26)이후 변경된 내용은 이지드릭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 개정연월일 : 2013.06.26
P1308-01

제조사 :



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.il-yang.co.kr

제조의회사 :

한솔신약(주)

충청북도 음성군 금왕읍 청령길 2-11