

잇몸질환 치료제

지메톨 jimetol

연질
캡슐

옥수수 불검화 정량 추출물 35mg

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1캡슐 중

옥수수불검화정량추출물(KPC) 35mg

(중 베타-시토스테롤로서 7밀리그램)

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 0.06mg

첨가제(타르색소) : 황색5호

첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(가원동물:소, 사용부위:가죽)

[성상] 황색의 내용물이 든 주황색의 타원형 연질캡슐

[효능 및 효과]

1. 다음 질환에 사용할 수 있다.

치주질환(치주염·치주질환) [치아지주조직질환, 치은염(잇몸염), 치주(치아주위조직)증(유년형 치주염)]

[용법 및 용량]

■ 성인 : 초기량으로는 옥수수의 불검화정량추출물로서 1회 70mg 1일 3회 식전에 경구투여 한다 (먹는다, 복용한다).

■ 유지량으로는 1회 35mg 1일 3회 식전에 투여한다.

■ 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응 환자
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 한다.
- 2) 이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의한다.
- 3) 임부 및 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.)
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 가벼운 완하작용을 일으킬 수 있다.
 - 2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민 반응을 유발할 수 있다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것.
 - 2) 직사광선(직사햇볕)을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 120캡슐, 120캡슐 X 2개입

[제품문의처] 02-3485-0476

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손(오염되거나 손상된)된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 설명서 최종 작성연월일 : 2013.01.07

※ 이 제품설명서 최종 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전청 의약품전자민원창구(<http://ezdrug.kda.go.kr>)의 '의약품등 정보' 란을 통해 확인하실 수 있습니다.

의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

제조의회사 : 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245

제조자: 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕절제길 5

판매자:  BORYUNG
보령제약

경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3