

빠르고 부드러운 변비약~

정부공인
KGMP
적격업체

돌/코/그/린^정

변비

복통
팽만

장
이

20정



조아제약(주) KOSDAQ
CHO-A PHARM CO., LTD. 코스닥상장법인

빠르고 부드러운 변비약~

【원료약품 및 그분량】 1정 중

도큐세이트린트톨(P)	16.75mg
우르스데옥시콜산(KP)	10mg
비사코딜(KP)	5mg

첨가제(타르색소) : 황색 203호, 청색 1호

【효능 및 효과】 변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법 및 용량】 15세이상 : 1회 2정씩 1일 1회 취침시 복용
11세이상 ~ 15세미만 : 1회 1정씩 1일 1회 취침시 복용
7세이상 ~ 11세미만 : 1회 1정씩 1일 1회 취침시 복용
다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【성상】 연두색의 원형 장용성 정제

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 급성 복부질환(중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색 환자 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose

intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당·갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 심한 복통 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 3) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자 3. 부작용 1) 이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. 4. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 소아에게 투여 할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다. 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 10세 이하의 소아에는 투여를 피하는 것이 바람직하다. 4) 1주정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. 5. 소아에 대한 투여 1) 이 약은 7세 미만의 영유아에게 투여하지 않는다. 2. 저장상의 주의사항 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관 한다. 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다. 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【제조자】 조아제약(주) (<http://www.choa.co.kr>) 본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7 공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 466

【수신자 부담 고객상담실】 080-988-8888

※ 기타 상세한 것은 의사, 또는 약사의 지시에 따르십시오.

빠르고 부드러운 변비약~