

헵타마인플러스 연질캡슐

KGMP적격업체 / 일반의약품 / 분류번호 : 391

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

원료약품의 분량 : 1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스(KPC).....	200mg
(실리마린, 실리빈으로 114mg)	
티아민질산염(KP).....	4mg
피리독신염산염(KP).....	4mg
니코틴산아미드(KP).....	12mg
판토텐산칼슘(KP).....	8mg
시아노코발라민(KP).....	1.2 μg
착색제(식약청인정타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호	

성상 : 황갈색의 내용물을 함유한 황녹색의 장방형 연질캡슐

효능·효과 : 다음 질환의 치료 보조 : 만성 간질환, 지방간, 간경변, 중독성 간장질환

용법·용량

성인 1회 1캡슐을 1일 3회 복용한다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 복용시 다음 사항에 주의할 것.
 - 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.
- 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항에 주의할 것.
 - 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 일반적 주의
지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 보관 및 취급상의 주의
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)) 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 말 것.

저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 90, 180캡슐

사용기간 : 제조일로부터 24개월

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 **사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.**

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 080-010-1114로 문의하시거나 또는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)-(정보마당)-(의약품동정보)에서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 개정 년월일 2012. 04. 27

제 조 자 : 동방에프티엘(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 78(상신리904-5)

판 매 원 : **Hanmi 한미메디케어(주)**

서울특별시 송파구 방이동 48-9