

일반의약품 정보 (계속됨)

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 만 7세 이하의 어린이
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[제조사] (주)레고켐제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 작성일자(2019.09.20.(Rev. 1)) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223) ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900

제조번호 :

사용기한 :

일반의약품

효과빠른 종합소화제

베로타정

1000정

(주)레고켐제약
LegoChemPharma

일반의약품 정보

[유효성분]

1정 중

- 디아스타제·프로테아제·셀룰라제(KP) 20 mg
(전분당화력(pH4.5) 278단위이상, 전분호정화력(pH4.5) 640단위이상, 단백소화력(pH3.0) 170단위이상, 섬유소당화력(pH4.5) 2단위이상)
- 리파제(KP) 20 mg (지방소화력(pH6.0) 120단위)
- 우르소데옥시콜산(KP) 10 mg
- 시메티콘파우더(별규) 46.15 mg (시메티콘으로서 30 mg)

[성 상] 녹색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량]

성인 | 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] (연.월.일) 용기 하단 표시일까지

[첨가제]

- 첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색1호
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 경질무수규산, 크로스카르멜로오스나트륨, 포비돈, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 탭크, 산화티탄