

근육경련 및 혈액순환개선 토마스 연질캡슐

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 150.8mg)	250mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 500IU)	500mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호	

【성상】

회백색 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐

【용법·용량】

8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용하십시오.

【효능·효과】

- 노년기의 비타민E의 보급
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화
: 어깨, 목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 중증(심한 증상)의 신부전 환자
- 4) 임부
- 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용전 의사 또는 약사와 상의합니다.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부, 수유부
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장에(신장장애) 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구(복용)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여(함께 복용)하지 않습니다.
- 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【소비자상담실】 080-024-0030

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【판매원】 광동제약(주) 경기도 평택시 모곡동 440-2

【제조원】 (주)동구제약 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

※ 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 최신의약품 정보 : 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 참조

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 작성일(2010년 08월 25일) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

판매원



광동제약(주)

경기도 평택시 모곡동 440-2

제조원



동구제약

경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3