

콘트라스트300

연질
캡슐

일반 의약품
분류번호 : 316

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

콘드로이틴설페이트나트륨 (KPC)	300mg
푸르셀타민 (KPC)	30mg
리보플라빈부티레이트 (KP)	6mg
니코틴산아미드 (KP)	10mg
판토텐산칼슘 (KP)	10mg
피리독살린산염 (KP)	25mg
시아노코발라민 (KP)	30 _{mcg}
도코페놀아세테이트 (KP)	50mg
(비타민D로서 50IU)	
γ-오리자놀 (KPC)	5mg
첨가제 (타르색소) : 황색1호, 황색203호, 황색5호, 적색40호	

【성상】 황색의 내용물이 충전된 적갈색의 정방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민(E, B1, B2, B6)의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
2. 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목걸림, 수족냉증, 수족냉증(손발이 차가움)
3. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨걸림) 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
4. 각기
5. 눈의 피로

【용법·용량】 성인 및 8세 이상의 어린이 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)
 - 1) 1세미만의 영아(갓난아기)
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 고지혈증, 당뇨병, 성고지혈증 및 췌장(이췌)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
3. 이상반응
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. : 위부(상복부)

- 1) 물결감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕 부진, 복부 팽만감
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 지연되거나 양이 적지 않아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민B12를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독살린을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 임신(종산)이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10_{mcg} 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여(복용)하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 과잉분해가 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소하십시오.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용) 투여하지 마십시오. : 1) 레보도파

6. 임상검사치에의 영향 : 요(소변)를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변색·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skpharma.com), 제품상담전화(080-021-3131)를 통해 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '이지드러그(ezdrug.kda.go.kr)'의약품 정보를 참조하십시오.

2011. 11. 28 작성

제조원
SK 동구제약
경기도 화성시 향남읍 생선리 99-3

판매원
SK 케미칼 (에스케이케미칼)
Life Science Bldg.
경기도 안산시 단원구 죽전동 44-3

자세한 문의는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.