

티로케어[®]

「티로트리신 겔」

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1g 중

티로트리신(KP) 1.0mg(역가)
첨가제(보존제) : 염화세틸피리디늄(USP) 0.5mg

■ 성상 : 무색의 투명한 겔

■ 효능 · 효과

감염의 우려가 있거나 감염된 외상(상처), 화상, 굼은 피부감염, 하지(다리)족부궤양에서의 피부진균(곰팡이)감염, 습진에서의 2차감염, 입술포진(물집)

■ 용법 · 용량

감염된 부위에 하루 2~3회 적당량을 바른다.

가벼운 상처나 점막 부위의 감염에는 드레싱이 필요하지 않다. 광범위한 질환 부위 및 심한 삼출성처에는 드레싱이 권장되며 제품을 1~2회 사용시마다 드레싱을 교체하는 것이 권장된다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람(신체 부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 코점막 부위

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약의 조성분과 보존제가 모두 중으로 분비된다고 알려져 있으므로 이 약을 사용하는 동안 수유하거나 수유하는 동안 이 약을 사용하지 않는다.
- 2) 눈에 직접 닿으면 화끈감이 나타날 수 있으므로, 눈 주위에 사용할 경우 이 약이 눈에 직접 닿지 않도록 주의한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

이 약에 포함된 프로필렌글리콜에 과민반응의 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 피부 화끈감 등의 과민반응
- 2) 이 약을 사용한 후 증상이 악화되거나, 일주일 이상 사용하여도 증상의 개선이 없는 경우

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 오남용(잘못사용하거나 많이 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
- 3) 제품 개봉 후 3개월 이내에 사용할 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 25℃ 이하 보관 (유효기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 10g

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2013년 12월 30일

■ 제조의뢰자 : 고려제약 주식회사

■ 제조자 : 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

15-5-8

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 의 · 약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실
080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은
<http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10