

세이네 숨연질캡슐

일반의약품

의약품 분류번호	315 비타민E 및 K제
-------------	------------------

【원료약품의 분량】(1캡슐 중)

토코페롤아세테이트(KP)-----500mg
(비타민E로서 500IU)
산화마그네슘(KP)-----250mg
(마그네슘으로서 150.8mg)
셀레늄함유건조효모(KPC)-----18.5mg
(셀레늄으로서 10μg)

【성상】

미황색의 점조성 내용물이 든 적갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

다음경우의 비타민 E의 보급

- 노년기

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어께 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】

12세이상 및 성인 : 1일 2회 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아
- 3) 중증의 신부전 환자
- 4) 임부
- 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 수유부
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 위장관 질환
- 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 이상반응

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 홍반, 부전수축, 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 구토
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 지방과무하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 한다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - 가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로 부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 080-424-7999

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2. 정해진 권장섭취량, 섭취방법을 준수하여 사용할 것.
3. 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
4. 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛노출이나 고온보관은 삼갈 것.
5. 포장을 개봉하여 섭취 시 가끔 캡셀에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 섭취 시 캡셀에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 섭취할 것.

제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의 할 것

설명서 작성연월일 : 2010. 04. 30

제조원
Hanmi 한미약품(주)
경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

판매원
Hanmi 한미메디케어(주)
서울특별시 송파구 방이동 48-9

※ 제품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 제품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 80 112 1 009826

00982001