

활성비타민 B군, C·E, 셀레늄, 아연

비타제트플러스정

Vita-Z Plus Tab.

【원료약품 및 분량】 1정 중

푸르셀티아민염산염(KP)	27,285mg
아스코르브산과립97%(별규)	618.56mg(아스코르브산으로서 600mg)
리보플라빈부티레이트(KP)	5mg
피리독신염산염(KP)	5mg
시아노코발라민 1000배산(KP)	6mg(시아노코발라민으로서 6μg)
폴산(KP)	0.25mg
비오틴(USP)	22.5μg
니코틴산아미드(KP)	50mg
판토텐산칼슘(KP)	20mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP)	40mg(토코페롤아세테이트로서 20I.U)
푸마르산철(USP)	13.5mg(철로서 4.4mg)
산화아연(KP)	9.33mg(아연으로서 7.5mg)
셀레늄 함유건조효모(KP)	46.3mg(셀레늄으로서 25μg)

첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크

첨가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크

첨가제(타르색소) : 청색2호 알루미늄레이크

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

【성상】 노란색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급
: 육체피로, 임신, 수유기, 병중, 병후의 체력 저하시, 노년기
2. 다음 증상의 완화
: 신경통, 근육통, 관절통[요통, 건통(어깨결림) 등]
3. 각기, 눈의 피로
4. 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
5. 잇몸 출혈, 비출혈(코피) 예방
6. 아연의 보급

【용법·용량】

12세 이상 어린이 및 성인

: 1회 2정을 1일 1회 복용 또는 1회 1정씩 1일 2회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.
- 철 함유 제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관합니다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아(젖먹이)
 - 3) 혈색소증[철대사이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환], 헤모시데린 침착증, 비철결핍성 빈혈
 - 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria : 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장 질환이 있는 환자

5) 심장·순환기계 기능 장애 환자

6) 신 장애(신장장애) 환자

7) 저 단백혈증 환자

8) 위장관질환자

9) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

4. 부작용

1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.

- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.

3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.

8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유허성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여합니다.

3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.

6. 상호작용

1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.

2) 이 약을 투여할 경우에는 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제, 레보도파와 병용투여(함께 복용)하지 않습니다.

3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피합니다.

7. 임상검사치에의 영향

1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.

3) 오(잘못사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60정, 60정×2

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, “소비자 피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(drug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329 (소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2016. 01. 19 (Rev. 4)



제조의뢰 및 판매자
이취 CMG 제약
경기도 서울시 공단(대우2)빌딩 27



제조사
오스틴제약(주)
경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20