



·육체피로 ·활력증강 ·자양강장 ·허약체질

복합유다리버[®] 연질캡슐

분류번호 : 329 (기타의 자양강장변질제)

【성분·함량】 1캡슐 중

인삼30%에탄올엑스(KPC)	50mg
(진세노사이드 Rb1으로서 0.67mg)	
티아민질산염(KP)	5mg
이노시톨(KP)	10mg
타우린(KPC)	300mg
우르소데옥시콜산(KP)	25mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호, 적색40호, 황색203호	

【성 상】 갈색의 내용물이 든 일면 암적색(검붉은색), 일면 황녹색의 장방형 연질캡슐

복합유다리버

【효능·효과】

육체피로, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후), 위장장애, 영양장애, 발열성소모성 질환, 임신수유기의 영양보급, 자양강장, 허약체질

【용법·용량】 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용합니다.

【사용상 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
 - 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 12개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 고지단백혈증, 당뇨병성 고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 구역, 구토, 묽은 변, 발진, 하리(설사)
- 일반적 주의
 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킵니다.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용합니다.
 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
 - 오·남용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기한】 외부포장에 표기

【포장단위】 120캡슐(60캡슐×2)

※만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 “소비자분쟁해결기준”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※본 제품설명서의 최근 개정된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.문인개정년월일 2011, 11, 1
사용기한은 외부포장에 표기

제조의뢰·판매원

유한양행

본사 : 서울시 동작구 노량진로 74

공장 : 충북 청원군 오창읍 연구단지로 219

www.yuhan.co.kr

소비자상담실 : 080-024-1188(수신자요금부담)

제조원 : (주)서흥캐셀/ 경기도 부천시 소사구 송내대로 14