



분류번호: 233 KGMP
일반의약품 적격업체

다이제틴정

조제용 500정

【제조의뢰자】  **Arlico**
알리코제약 | 주
충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

【성분 · 함량】 1정 중

• 유효성분 : 시메티콘(KP)···30mg, 우르소데옥시콜산(KP)···10mg, 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제(전분당화력 278단위 이상, 전분호정화력 640단위 이상, 단백소화력 170단위 이상, 섬유소당화력 2단위 이상)(별규)···20mg, 리파제(지방소화력 120단위)(KP)···20mg • 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호 • 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 텔크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스 【성상】 녹색의 원형필름코팅정 【효능 · 효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감 【용법 · 용량】 만 15세 이상 : 1일 3회, 1회 1~2정, 식후 복용 만 8세이상 ~ 만 15세 미만 : 1일 3회, 1회 1정, 식후 복용 【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 만 7세 이하의 어린이 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 300정, 500정

【학술정보문의】 080-585-0004

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 본 제품은 우수 의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환 가능합니다. ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오. ※ 의약품 용어설명, 의약품 정보, 첨부문서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

【제조자】 (주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

작성연월일: 2025.07.07.
01/202507

【제조번호】
【사용기한】

35X18mm

