

건강한 잇몸을 위한 잇몸질환치료제



일반의약품
KGMP적격업체
분류번호 : 231

이튼돌 플러스 캡슐

Etendoll-Plus Cap.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

리소짐염산염(KPC)	30,0mg(역가)
카르바조크롬(KPC)	2,0mg
토코페롤아세테이트2배산(KPC)	10,0mg
(초산토코페롤로서 5,0IU)	
제피아스코르빈산96%가루(KP)	156,3mg
(아스코르브산으로서 150mg)	
옥수수전분(KP)	100mg
히드록시프로필셀룰로오스(JP)	11,5mg
스테아르산마그네슘(KP)	5,2mg
첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색호	

【성상】 연한 주황색의 내용물이 든 암녹색의 경질캡슐

【효능효과】 치은염(잇몸염), 치조(이들)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

【용법용량】 성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후에 복용한다

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로, 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상양의 수종등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【포장단위】 자사 포장단위 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

■ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(054)552-5381~2로 문의하시기 바랍니다.

개정일자 : 2013.06.24

제조원:



알파제약

경북 문경시 삼일면 신양로단 2길 20