

케라스트 캡슐

Kerast Capsule

일반의약품
분류번호: 325

단백아미노산제제

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(394mg) 중

주성분 : 약용효모(별규)	100mg
주성분 : 케라틴(별규)	20mg
(총아미노산으로서 히스티딘1.22mg, 로이신4.91mg, 리신4.1mg)	
주성분 : 티아민질산염(EP)	60mg
주성분 : 판토텐산칼슘(EP)	60mg
주성분 : L-시스틴(EP)	20mg
주성분 : P-아미노벤조산(USP)	20mg

동물유래성분(기원동물 및 사용부위) : 케라틴(돼지발톱)

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호

【성 상】 연회색 가루의 내용물이 든 상부는 녹색, 하부는 미황색의 불투명한 경질캡슐제

【효능 · 효과】

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 촉진
2. 확산성 탈모의 완화

【용법 · 용량】

성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용

소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 부작용

드물게 위통, 구토 등 위장관 불편감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른 맥), 소양증(가려움증), 두드러기 등이 보고되었으며, 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타날 수 있다.

2. 일반적 주의

- 1) 설폰아미드제제와 동시 복용 시 주의하여야 한다.
- 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로겐 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 않는다.
- 3) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우 의사와 상의한다.

3. 임부, 수유부에 대한 투여

임부, 수유부에 투여할 경우는 의사와 상의한다.

4. 적응상의 주의

- 1) 평균 치료 기간은 3-6개월이고 보통 약 3-4개월 후부터 효과를 나타내며 필요한 경우 투여를 계속하거나 반복 투여할 수 있다.
- 2) 본 제제는 당뇨병환자에 투여할 수도 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 않는다.
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 25℃이하 보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 90캡슐

■ 제조원 : 한국맥널티(주) / 경기도 화성시 동탄면 중리 713-2

■ 판매원 : 케이디파마(주) / 서울시 서초구 서초동 1440-1 국제빌딩 4층

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭 <http://ezdrug.kfda.go.kr> → 「정보마당」 → 「의약품 등 정보」를 참조하시기 바랍니다.

※ 이 문서 작성일자(2010년 5월) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.koreamcnuity.co.kr) 또는 전화(☎031-378-1460)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.