

코감기, 알레르기성 비염에

코스펜[®]정

일반의약품

의 약 품	141
분류번호	항히스타민제

【원료약품의 분량】1정 중

슈도에페드린염산염(USP)	60mg
트리프롤리딘염산염수화물(USP)	2.5mg

【성 상】

흰색의 원형 정제

【효능·효과】

코감기, 알레르기성 및 혈관운동성 비염에 의한 다음 증상의 완화
: 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

【용법·용량】

성인 : 1회 1정
소아(8~14세) : 1회 1/2정
1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약에 과민증 환자
 - 중증(심한 증상)의 간 및 신기능 장애 환자
 - 중증(심한 증상)의 관상 심장 질환 환자
 - 잔뇨 형성을 수반하는 배뇨(소변을 뎀)장애 환자
 - 고혈압 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 2세 이하의 영아(갓난아기)
 - MAO 저해제(억제제)를 투여중인 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 천식 환자
 - 녹내장 환자
 - 고혈압 및 관상동맥(심장동맥)질환 환자
 - 심질환 및 부정맥 환자
 - 당뇨병, 갑상선기능항진증 환자
 - 전립선(전립샘)비대로 인한 배뇨(소변을 뎀)곤란 환자
 - 7세 이하의 소아
- 부작용
 - 중추신경계 : 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한, 경미한(가벼운) 혈압 강하, 시력장애, 산동(동공확대), 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직(굳음), 아테토시스, 간대성 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비가 나타날 수 있다.
 - 과민증 : 피부반응, 일시적인 자극통, 작열감(화끈감)이 나타날 수 있다.
 - 소화기계 : 구갈, 구역, 구토가 나타날 수 있다.
 - 비뇨기계 : 배뇨(소변을 뎀)곤란이 나타날 수 있다.
 - 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 이 약의 투여중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의한다.
 - 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 연용(계속 복용) 전에 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 7세 이하의 소아에게는 필요한 경우 시럽제를 복용하되 용법·용량을 잘 지키고 표시된 연령 이외의 소아에게는 투여하지 않는다.
- 상호작용
혈압강하제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO저해제(억제제), 교감신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네티딘, 브레틸리움 베타나이드, 데브리소퀸, 메칠도파, 교감신경성약(충혈제거제, 식욕 억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제(억제제)와 병용투여(함께 사용)하지 않는다. MAO저해제(억제제)의 긴 작용 시간 때문에 MAO저해제(억제제) 투여 최소 15일후 이 약을 투여한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 안전성이 확립되지 않았으므로 투여하지 않는다.
 - 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는다.
- 소아에 대한 투여
소아에서 특히 부작용이 크게 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 과량투여시의 처치
과량투여시 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용한다. 슈도에페드린 제거에는 투석하도록 한다.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】자사포장단위

【제품문의처】한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
- ※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

- 정해진 용법, 용량을 준수하여 사용할 것.
- 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
- 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 작성연월일 : 2013. 11. 10

제조의뢰자:



한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

제조사:

한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.