

칼슘제
칼비타디정

접착면

칼슘제
칼비타디정

【성분·함량】1정 중

유효성분
 시트르산칼슘(USP)(칼슘으로서 158mg) 750mg
 콜레칼시페롤과립(별규)(비타민D로서 400IU) 4mg
 동물유래성분: 유당수화물(소·우유), 콜레칼시페롤(양·양모), 젤라틴(소·가축)
 기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 시트르산, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 탈크, 클로이드성산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 정방형 정제

【효능·효과】

● 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

● 다음경우의 비타민 D의 보급

- 임신·수유기
- 발육기
- 노년기
- 이약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 뼈, 이의 발육발달 · 구루병의 예방

【용법·용량】 1일 1회, 1회 2정을 식후 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유훈중증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료받고 있는 환자
 - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 5) 심장·순환기계기능 장애 환자

일반의약품

분류번호 321

- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감심배당제를 투여 중인 환자
- 9) 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 삼박동불규칙, 피부발진, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 100정/병, 300정/병

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 본 의약품의 적절한 사용에도 불구하고 부작용 발생시, 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
- 〈이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com에서 확인할 수 있습니다.〉

【제조사】 (주)서울제약 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 124-31
 작성일자 : 2020.04.29