

콧물 몸살
두통 인후통

NeosolTM 특허공법으로 효과빠른

종합감기약 하드콜 연질캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,290mg) 중

아세트아미노펜(KP)	250.0mg
수도에페드린염산염(USP)	30.0mg
클로르페니라민말레산염(KP)	2.0mg
참가제(타르색소) : 황색5호	

【성 상】

미향색 내지 주황색의 액상 내용물이 든 투명한 주황색의 장방형 연질캡슐


【효능 · 효과】

감기의 증상(콧물, 비출혈, 두통, 통증, 재채기, 발열, 인후통)의 완화

【용법 · 용량】 성인 : 1회 2캡슐씩 4시간마다 복용하여 1일 4회를 초과하지 않도록 한다.

6-12세 어린이 : 1회 1캡슐씩 4시간마다 복용하여 1일 4회를 초과하지 않도록 한다.

6세이하 어린이 : 의사의 지시에 따른다.



본 제품은 어린이 보호용 안전포장을 사용하고 있습니다.

복용시

① 가위 등으로 절취선을 따라 지르십시오

② 절취이 인편 화살표부분을 잡고 화살표 방향으로 떼어 낸 후 복용하십시오

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상담할 것. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상 및 위장출혈이 유발 될 수 있음

2. 다음 사람은 복용하지 말 것.

1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등에 부기)을 일으킨 적이 있는 사람

2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

폐기종 또는 만성기관지염과 같은 호흡기계 질환을 가지고 있거나 녹내장, 전립선의 비대로 인해 배뇨곤란, 심장질환, 고혈압, 당뇨병, 갑상선질환을 가지고 있을 경우 의사와 상담한 후 투약 할 것

4. 임신부나 수유부의 경우에는 이 약을 투약하기 전에 의사와 상담할 것

5. 이상반응

1) 신경통, 현기증(어지러움) 또는 불면이 나타나면 사용을 중지하고 의사에게 상담할 것

2) 인후통이 심하여 2일 이상 지속되거나 발열, 발진, 두통, 오심(구역), 구토 등을 동반할 경우 즉시 의사에게 상담할 것. 이는 특히 어린이에게 있어 과도용분을 유발할 수 있다.

3) 이 약은 졸음을 유발 할 수 있으며 알코올, 진정제, 신경안정제 등은 졸음효과를 상승시킨다.

6. 일반적 주의

1) 정해진 용법용량을 따른다.

2) 치료 7일 이내에 증상의 개선이 없거나 발열증상이 나타나면 의사에게 상담할 것

3) 이 약을 복용하는 동안 알코올성 음료는 마시지 말 것

4) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

5) 운전하거나 기계를 작동하고 있을 때는 주의할 것

6) 어떤 증상이 나타나지 않더라도 약물복용에 주의해야 한다.

7. 상호작용

1) 진정제나 신경안정제를 복용하고 있을 경우 이 약을 투여하지 말 것

2) MAOI계 약물을 복용하고 있거나 중단한지 2주 내에는 이 약을 투여하지 말 것

처방받는 약물이 MAOI 약물인지 알 수 없을 경우에는 의사에게 상담할 것

8. 과량을 복용했을 경우에는 즉시 의사와 상담하거나 독극물센터에 상담할 것

9. 복용시 주의사항

1) 이 약의 복용에의 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것

① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등에 부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은 땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우

② 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우

③ 천식이 나타난 경우

④ 황달 또는 전신에 부종, 혈뇨, 단백뇨 등의 증상이 나타난 경우

2) 바르비탈계 약물, 산화제 항 우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 24개월

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

■ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

■ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

■ 설명서 작성일자(2009년 09월) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kdda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

■ 소비자 상담전화 : 080-022-5805(무료전화서비스)

설명서 작성일: 2009. 09 MO1

제조사 :

경기도 화성시 향남읍 상신리 008-8

알앤씨코리약(주)

경기도 화성시 향남읍 상신리 008-10

대용제약(주)

제조외의 및 판매자 :

대용제약(주)

경기도 화성시 향남읍 상신리 001-1

www.mmpfarm.co.kr