

【원료약품 및 분량】 1캡슐(1,150mg)중

카르두스마리아누스엑스(별규)	200mg
티아민질산염(KP)	4mg
피리독신염산염(KP)	4mg
니코틴산아미드(KP)	12mg
판토텐산칼슘(KP)	8mg
시아노코발라민(KP)	1.2μg
첨가제(식약청인정타르색소) : 청색1호, 황색203호, 황색5호	
첨가제(동물유래) : 젤라틴(소, 가축)	

【성상】 황갈색의 내용물을 함유한 황녹색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】 다음 질환의 치료보조 : 만성간질환, 지방간, 간경변, 중독성 간장질환

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐을 1일 3회 복용한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【판 매 자】  **종근당** 개업회사 **경보제약**

충남 아산시 신푼동 345-6



제조번호 : 027001

사용기한 : 2012. 09. 09



일반 의약품
분류번호: 391

90캡슐

간기능 강화, 간질환 개선제

리버텍트골드 200mg
(연질캡슐)

LIVERTECT

간에 이상이 생기면...

- 쉽게 피로를 느끼고 회복이 늦다.
- 식욕이 없거나 음식맛을 잃는다.
- 소화가 안되고 헛배가 부르거나 메스꺼움을 느낀다.
- 음주 후 숙취가 오래 간다.
- 얼굴에 혈색이 없고 자주 어지럽다.
- 황달 증상이 나타나는 경우가 있다.
- 손바닥에 붉은 반점이 생기는 경우가 있다.
- 기미, 습진, 담마진, 소양감 등의 피부질환이 생길 수 있다.



개업회사 Kyongbo Pharm

일반 의약품
분류번호: 391

90캡슐

간기능 강화, 간질환 개선제

리버텍트골드 200mg
(연질캡슐)

LIVERTECT

간에 이상이 생기면...

- 쉽게 피로를 느끼고 회복이 늦다.
- 식욕이 없거나 음식맛을 잃는다.
- 소화가 안되고 헛배가 부르거나 메스꺼움을 느낀다.
- 음주 후 숙취가 오래 간다.
- 얼굴에 혈색이 없고 자주 어지럽다.
- 황달 증상이 나타나는 경우가 있다.
- 손바닥에 붉은 반점이 생기는 경우가 있다.
- 기미, 습진, 담마진, 소양감 등의 피부질환이 생길 수 있다.



개업회사 Kyongbo Pharm

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 복용 시 다음 사항에 주의할 것.
1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.
3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항에 주의할 것.
1) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
4. 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관할 것.
3) 오염을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 말 것.

【제 조 자】 (주)동구제약 경기도 화성시 향남읍 상산리 901-3

【제조외국사】 (주)한국코러스제약 충북 제천시 강제동 253-12

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 내용을 주의깊게 읽어와 하며, 의약품과 함께 보관 하십시오.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.klda.kr>)—정보마당—의약품동 정보를 참조하여 주십시오.

작성연월일 2010. 08. 31